



sc. 3. Pl. 4.



DELLA
COLTURA DE' FIORI

TRATTATO SECONDO.

Con nuove ragioni , osservazioni ,
e sperienze.

*Avantaggio de' Fioristi , de' Fisici , de' Botanici ,
ed Agricoltori.*

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
OF GREAT
BRITAIN
AND IRELAND
VOLUME
LXXV
PART I
1905

DELLA NATURA ; E COLTURA
DE FIORI

FISICAMENTE ESPOSTA
TRATTATI DUE
P E R

IL P. FILIPPO ARENA

DELLA COMPAGNIA DI GESU'

PROFESSOR DI MATEMATICA

TOMO SECONDO.



IN PALERMO , per Angelo Felicella 1768.

37-44-C-23

1944

1944

1944


1944

1944

1944

1944

1944



1944

(VII)

Cap. XXI. *Apologia intorno all' esposto segreto della doppiezza de' fiori.* pag. 213.

Cap. XXII. *Risposta ad altre opposizioni contro la qualità de' fiori da semenza.* 226.

P A R T E III.

Cap. XXIII. *Del raccorre, e conservare i semi, e del Semenzaio.* 242.

Cap. XXIV. *Tempo, e maniera da seminare i semi, e propria lor coltura.* 251.

Cap. XXV. *Quistione fisica intorno all' In-
flusso de' Pianeti sulle Piante, e sul corpo de-
gli Animali.* 265.

Cap. XXVI. *Propagazion delle Piante col
piantar di ramo, collo sbranarle, colle Pro-
pagini, o Margotte, e cogli Innesti.* 288.

Cap. XXVII. *Del cavar da terra, e conservar
le radiche, i bulbi, e tuberì.* 308.

Cap. XXVIII. *Dello zappare, letamare, e
preparar la terra per la nuova piantagio-
ne.* 314.

Cap. XXIX. *Del piantare.* 326.

Cap. XXX. *Del traspiantare.* 332.

Cap. XXXI. *Del governo, che dovrà farsi del-
le Piante.* 347.

Cap. XXXII. *Come abbiano a difendersi le
piante da' venti, dal caldo, dal freddo, dal-
le piogge, e dagli animali nocivi.* 361.

Cap.

(VIII)

Cap. XXXIII. Rimedi contra le formicole, e Gorgogli. pag. 374.

Cap. XXXIV. Artificio per far venire i fiori fuor di stagione, e conservarli vivi, o ravvivarli già morti. 389.

Cap. XXXV. Propongonsi alcuni artifizj, per dare a fiori quel colore, o quell odore, che non han da se. 405.

P A R T E IV.

Coltura particolare di ciascun genere di fiori nobili. pag. 1.

Catalogo primo italiano di tutti i generi di fiori nobili, compresi nel Catalogo seconda dal nome latino. 6.

Catalogo secondo dal nome latino de' sudetti generi di fiori nobili col suo corrispondente Italiano, Siciliano, Franzese, Spagnuolo, Inglese, e Germano. Varietà delle spezie di ciascun Genere, e lor Coltura. 11.



(V)

INDICE DE' CAPITOLI

DEL TRATTATO II.

P A R T E I.

- Cap. I. **S** Celta del Sito per lo Giardino de' fiori; sue buone condizioni, e prima del buon prospetto. pag. 5.
- Cap. II. Della seconda, e terza condizione richiesta per lo Giardino de' fiori. 13.
- Cap. III. Della quarta, e quinta condizione per lo Giardino de' fiori. 17.
- Cap. IV. Del buon Terreno per lo Giardino de' fiori. 27.
- Cap. V. In che consista, ed onde provenga la fertilità della terra. 42.
- Cap. VI. Risolvesi la quistione sulla fertilità della terra. 50.
- Cap. VII. Disegno, e delineazione del Giardino de' fiori. 60.
- Cap. VIII. Come debbasi piantare il Giardino de' fiori sul disegno delineato nel Terreno. 68.

P A R T E II.

- Cap. IX. Teoria del promesso secreto per far venire dalle semenze i fiori doppi, semidoppi, di bei colori, e nuove forme. 72.

Cap.

(VI)

- Cap. X. Difficoltà contra l'esposta Teoria, e lor
soluzione. pag. 88.
- Cap. XI. Confermasi la predetta Teoria cogli
sperimenti. 99.
- Cap. XII. Sperimenti proprj sulla medesima
Teoria. 107.
- Cap. XIII. Altri sperimenti più esatti in con-
ferma dell'esposta Teoria. 117.
- Cap. XIV. Altri sperimenti ne' Garofani. 131.
- Cap. XV. Industrie da praticarsi con certe par-
ticolari spezie di piante, per aver buoni fio-
ri dalle lor semenze. 144.
- Cap. XVI. Ristretto delle date istruzioni, ed
altre industrie da usarsi, per ottener buoni
fiori dalle semenze. 155.
- Cap. XVII. Utilità che posson ricavarfi dall'ar-
te insegnata, per aver buoni, e copiosi frut-
ti, e per ottener ne' fiori, ne' frutti, e nelle
piante nuovi mostri di terza spezie. 163.
- Cap. XVIII. Quistione se si dieno nelle piante i
mostri totali risultanti da due spezie diffe-
renti? 175.
- Cap. XIX. Confermasi la realtà de' mostri di
terza spezie, particolarmente ne' generi de-
gli Agrumi. 193.
- Cap. XX. Metodo pratico per far sortire dalle
semenze nuovi mostri di fiori, o frutti. 203.
- Cap. 1



INTRODUZIONE.



A materia del presente Trattato sarà divisa in quattro Parti, nelle quali, senza lasciar cosa d'importanza intorno alla coltura de' fiori, tutto l'utile, e 'l necessario sarà compreso. Nella prima Parte suggerirò l'idea d'un ottimo giardino, proprio per fiori, e di tutto punto fornito, dandone eziandio alcuni disegni, delineati in rame nella Tavola , , acciocchè servir possano d'esemplare. Nella seconda Parte parlerò della preparazion delle semenze; e qui esporrò il promesso secreto, per far venire da quelle i fiori doppi, e semidoppi, di bei colori, e nuove forme. Nella terza tratterò della coltura del Giardino de' fiori in generale. Nella quarta poi dirò la coltura particolare di ciascun genere di fiori nobili, registrati a Catalogo per ordine d'Alfabeto.

Verrà quindi il terzo Tomo delle immagini de' fiori, egate separatamente per maggior comodità. Ho giudicati sempre manchevoli que' libri de' Botanici, e de' Fioristi, che hanno meramente descritte le piante, ed i fiori,

ri, senza metter sotto la vista delineate le lor figure; giacchè per quanto squisite, e chiare sieno le descrizioni, che ce ne fanno, pur riesce malagevole, a riconoscerle poi sul prato, ed a discernere da più altre lor similissime; nè solo i principianti, ma pure tal volta i provetti, ne restan dubbiosi, senza saperle accertatamente riconoscere. Meritano eterna lode le fatiche del Sig. Gio: Guglielmo Weinmanno di Ratisbona, per la sua Opera Botanica, compresa in quattro gran volumi, intitolata: *Phytanthoza Iconographia*; cioè Imagini di rami di piante, e fiori, ove delle piante i fiori nella sua giusta grandezza e figura ritrae, dipinti a colori del tutto naturali, e vivacissimi: di questi mi son io valuto per originali, eccettuatine alcuni; e non pochi, che ivi non trovansi, e gli ho ritratti dallo stesso fior naturale.

Molti sono stati gli Scrittori, che han trattato della coltura de' fiori, ed il primo a scriverne in Roma 1633 fu il P. Giov. Batt. Ferrari, già sufficientemente lodato nella Introduzione al Tratt. 1. per lo merito, che fece; da poter servire di buona guida a' sussistenti Scrittori. Dopo lui scrisse un compendio sul medesimo argomento F. Agostino Mandirola dell' Ord. Min. Conv. di S. Francesco di Castel Fidardo, che intitola: *Manuale de' Giardinieri*, Venezia 1684. Di poi D. Paolo Bartolomeo Clarici più copiosamente, che ogn'altro, scrisse l' *Istoria, e Coltura delle Pianta, che sono pel fiore più ragguardevoli*, Opera postuma in Venezia 1724, e stimabilissima per gli ottimi ammaestramenti, che raccolse principalmente dal Ferrari, e per la ricchezza della sua erudizione. De' Franzesi, che io so, il Sig. Luigi Liger. *Tom. 1. Le Jardinier Fleuriste Parigi* 1704, il quale tratta distesamente questo argomento. Il P. D'Ardenne Prete dell'Orat. il quale scrive un prolisso *Trattato de' Ranuncoli*, Parigi 1746, e cita altri autori della

la sua nazione. Il Sig. Abb. Pluche eccellente autore dello *Spettacolo della Natura*, Tom. 3. Dial. 5. Il P. Renato Rapini insigne Poeta della Compagnia di Gesù: *Hortorum lib. 1. Et Disputat. De universa cultura hortensis disciplina*. Il P. Giacomo Vanierio altro eccellente Poeta della medesima Compagnia, il qual, sebbene tratti di tutta l'Agricoltura fruttuosa, e sol di passaggio tocca alcuna cosa de' fiori; pure i documenti della coltura del *Predio rustico*, ch'è il titolo del famoso suo libro, sono in gran parte applicabili alla coltura de' fiori: anzi egli nel principio del libro non vuol, che dall'orto esclusi non vengano i fiori, anche per le loro interessanti utilità, tra le quali annovera la pia offerta, e grata a Dio, che se ne può far su gli Altari, per adornarli.

*Non tamen omnigenis inimicus floribus, illos
Ejicies, quorum facilis cultura, nec usus
Nullus erit, quales Viola, nigrumque Papaver;
Et Risa, supposita quæ si calet igne, caduci
Solamen tibi floris aquam stillabit odora,
Liliaque, & Calthas, & biantem flore decoro
Narcissum, Clytemque serēs; festisque diebus
Serta parans, donis superos placabis inemptis:
In tenues hominum curas descendere gaudent.
Cœlicola, tantumque boni pietate Coloni,
Quantum opera, quantum largis viget imbribus herba.*

Da tutti sceglieremo il più utile, che ci parrà, aggiugnendovi quel di più, che avrem da per noi sperimentato; ed ove mai ci mancherà la propria esperienza, per sicurezza maggiore ci rimetteremo al più comune, e più saggio sentimento.

Di più avrem la mira, d'istruir più tosto la mente del dilettante Fiorista, che la mano del rozzo Giardinier; ciò, che farem, trattando la presente materia filosoficamente, dando di tutto le sue ragioni fisiche,

e rintracciando, per quanto si potrà, le vere cagioni naturali di quegli effetti, che dalla coltura pretendonfi. Quando degli effetti si san le cause, e sene fanno assegnar le ragioni; allora la mente, già ben' istruita, può assai meglio regolar la mano con minor pericolo di fallare; dacche al variar delle circostanze, sa ella variare i mezzi, per iscegliere i più opportuni. Accade sovente nell' Agricoltura, che ciò, che in un luogo, in un tempo, in una circostanza riusciva bene, in altra di poi riesca male; e chi non sa guidarsi colla ragione, ancorchè pratico del suo mestiere, corre rischio, d'andar fallito sulla sua sperienza. Ragione, e sperienza son due sorelle, che non bisogna mai scompagnare, poichè l'una serve di scorta all' altra; e noi coll'ajuto d' entrambe speriam portare a qualche maggior grado di perfezione non solamente la coltura de' fiori, ma pur tutta l' Agricoltura, alla quale son tutte applicabili le utili cose, che si diranno.



TRATTATO SECONDO

La Coltura de' Fiori.

P A R T E P R I M A

C A P O I.

Scelta del sito per lo Giardino de' fiori; sue buone condizioni; e prima del buon prospetto.

11



Hi può fare scelta ne' suor terreni, per dar sito comodo; e vantaggio- so al giardino de' fiori, scelga un tratto di terreno; il quale abbia le seguenti buone qualità: 1. che sia solatio più tosto, che ombroso: 2. che sia più tosto piano, ed insieme alquanto inclinato all' orizzonte: 3. che non sia esposto a' venti impetuosi; o in altra guisa nocevoli, ma sia solamente scoperto da' venti salutari: 4. che abbia vicina l'acqua, e che sia ella di buona qualità per innaffiare: 5. che sia vicino all' abitazione: 6. che sia di buona terra: queste sei laudevoli condizioni anderò d' una in una ora esponendo, e comentando.

2. Il sito del giardino de' fiori debb' essere più to- sto solatio, che ombroso, però moderatamente tale, e non eccessivamente; cioè che sia esposto al Sole per la metà, o per la maggior parte della giornata; e non af- fatto per tutta. E' ben vero, che i raggi solari son co- me

me lo spirito delle piante, che le vivifica, e le fa vegetare; ma è pur vero, che il calore quando eccede, o nella intensità, o nella continuazione, abbrucia, e scotta le tenere piante, o almeno le incomoda tanto, che le fa languire. Non senza tal riguardo la Divina Provvidenza le vicende ordinò del dì, e della notte, della State, e dell' Inverno, del sereno, e del nuvolo, del lume, e delle ombre; acciocchè l'azion de' raggi solari venga frequentemente interrotta, e temperata col refrigerio de' giorni freddi, e delle ore ombrose: allora è, che le piante, e gli animali la sete ristorano col nuovo umido, che succian da terra, e allora pure col respiro delle aure fresche dalla patita languidezza rinfrescansi.

3. Per le nostre piante poi, che allevansi ne' giardini, habbiamo di più de' particolari motivi, per tenerle alquanto cautelate, e difese dal Sol cocente, i quali non militano per quelle del campo; per queste v'è la giusta provvidenza, di farle nascere spesse fra loro, e folte di maniera, che l'una cuopra l'altra colla sua ombra, e così l'umido, e 'l fresco unitamente fra lor conservano; ma quelle de' nostri giardini van piantate larghe tanto fra se, che le radici dell'una non abbiano a mendicare alimento dal terreno dell'altra, acciocchè così vengan più robuste, come le pretendiamo.

4. Per secondo motivo, le piante, che nascono in luogo aprico, portano il gambo corto, ed al contrario quelle a bacio lo portan lungo, nè cessan mai d'andare in alto, finchè non iscuoprano il Sole, quasi avide di vagheggiarlo, o quasi ambiziose d'esser dal Sole vagheggiate, o più tosto, a parlar serio, per ragion fisica vanno in alto, perchè in tali siti ombrosi abbonda più il nitro, l'umido, e l'alimento, che le fa crescere; ed all'opposto scarpeggia ne' luoghi, solati; sebbene quivi sia u-

ali-

alimento più cotto, più denso, e più sostanzioso; perciocchè il calor del Sole scioglie, e fa svaporar la parte acquosa, e resta sol nel corpo della pianta la parte più spessa, e fissa: siccome altresì il calore affretta la pianta, e la fa presto maturare; ma l'ombra, e la frescura ne trattiene la maturazione, e maggior tempo concede al di lei aumento: e quindi avvien, che le piante a bacio più alte s'organo, e facciansi più fronzute, benchè riescano di legname più fiacca, e più porosa; ed all'opposto quelle all'aprico, umili, e terragnole si mantengano, ma riescono di corpo più sano, e sodo.

5. Supposto ciò, noi, che alleviam le piante per lo unico fine della lor bella comparsa, vogliam la pianta con giusta proporzione alta, e fronzuta; massime il fiore, vogliam, che venga di gambo competentemente lungo. Un fior nano, oltre il mal garbo, per cui si rende men grato all'occhio in sulla stessa pianta, colto di poi, appena truova uso per adornamento delle caratte: quivi acciocchè i fiori possano mettersi in buona prospettiva, senza che l'uno cuopra la vista dell'altro, che gli sta dietro, uopo è, che sieno per la maggior parte di lungo stelo, e che ciascuno possa arrivar giù col piede a toccar l'acqua del vaso per sostentarli. Finalmente per terzo motivo non è da ometterli la maggior fatica, di dover adacquare più frequentemente le piante, e la maggior difficoltà, che v'è, di trovar ora opportuna per adacquarle, la qual non debb'essere alcuna delle ore calde, come diremo: laonde non è da scegliersi per lo nostro giardino un sito al calor del Sole continuamente esposto.

6. Al contrario per altre ragioni più poderose delle riferite, non è da eleggersi un sito totalmente a bacio, che sarebbe il pessimo tra tutti, talmente ombroso, che non goda del Sole almeno almeno per una ter-

PARTE I. CAPO I.

za parte del giorno, specialmente nell' Inverno : Son certo dalla lunga esperienza, che de' due mali, o che il giardino sia eccessivamente soggetto alla sferza del Sole, o che gli manchi il convenevol fomento de' raggi, ed abbia il Sole a desiderare; questo secondo sia sempre un maggior male del primo. Ne' luoghi ombrosi la pianta se ne va tutta in rigoglio di rami, e foglie, inutilmente alta, e fronzuta, come si è spiegato; ma insieme riesce gracile, e fiacca tanto, che ogni vento dimenandola, la maltratta, e molto peggio malmena i fiori di gambo smoderatamente lungo: fiacchi, e piccoli riescon pure i fiori, screate, e smunte le sementi; ma più d'ogn' altro grave detrimento patiscono le radici, le quali, o si putrefanno, prima di germogliare, o germogliate, presto infermano a morte. Io chiamo i giardini a bacio vere sepolture delle piante; poichè quivi non solo perdonsi gli annuali proventi, ma pur co' frutti vi si consuma il capitale.

7. In tali terreni sozzi, umidi, e freddi sotterra vi si generano vermini, che le radici, rodendo, consumano, e sopra terra vi si genera muschio, e muffa, le quali nocivissime produzioni, oltre che furan per se il più utile nutrimento, tutta di più colla loro spessezza occupano del terreno la superficie, e con ciò impediscono la permeazione all'aria esterna, la qual serve loro di vita, e di respiro; ed insieme vi trattengono sotto chiusi, e ferrati i vapori, che vi dovrebbero esalare: quindi del terreno impedita la traspirazione, i trattenuti vapori vi fermentano, e le radici inevitabilmente vi si corrompono.

8. Procurate dunque d' evitare i due estremi nella situazione del vostro giardino; e nel caso che non sarà in vostra balla, l' evitare uno de' due mali, attenetevi al sito aprico, dove le radici più intere, e sode si man-

tengono, ed i fiori, benchè di gambo corto, pur vi riescon più sani, e sinceri. Per pari ragione fra l' aurea mediocrità de' due siti, inclinate più tosto ad appigliarvi ad un sito, che abbia più del solatio, che del bacio, come vi ho ammonito.

9. Però qui debbo aggiugnere due necessarie avvertenze; la prima è, che il detto sin' ora intendasi di un clima temperato, come il nostro di Palermo, e di questo clima per ordinario parlerò in avvenire, lasciando al prudente Fiorista l'arbitrio, di variar le istruzioni giusta la diversità, ed esigenza del proprio clima: quindi se 'l clima sarà più caldo, bisognerà inclinar sempre più al sito fresco, ed ombroso, e se sarà più freddo, bisognerà inclinar sempre più al sito aprico. La seconda è, che per le diverse nature delle piante, non si conviene a tutte il grado medesimo del calore, o del freddo; e però la postura più vantaggiosa, che si può dare al giardino, è quella, in cui sienvi tre prospetti, uno caldo, che guarda l' Ostro, uno temperato, che guarda il Levante, o il Ponente, ed uno freddo, rivolto a Tramontana; purchè quivi le piante godano nell' Inverno, per alcune ore almeno il fomento de' raggi solari, i quali, tutto che obliqui, sempre però son benefici, e necessarj. Per aver tal sorte ottima di situazione, non vi ha più a proposito di un rialto, simile a collinetta, il qual vada insensibilmente forgendo dalla base sino alla vetta con pochissimo pendio, fatto così o dalla Natura, o anche dall' industria, colla quale può agevolmente darsi al terreno quella, che pur basta, piccola declività, che si pretende.

10. Non è credibile il buon effetto, che fa, la declività del terreno col prospetto al Settentrione, per quelle piante, che godono della frescura, ovvero in que' luoghi, ove il calore per tutte le piante gentili fols' eccessivo: l' ho io provato in questo giardino del Real Palazzo, esposto quasi continuamente a' raggi, così diretti,

come riflessi, ribattuti dalle alte fabbriche del Palazzo, ed esposto altresì a' venti meridionali, che qui arrivano caldissimi, e sono a' fiori di gravissimo nocumento. Or io non potendo dare altro riparo, pensai di dar sito alquanto in pendente alla terra stessa di ciascun ajuolo, inclinandone il prospetto verso la parte di Tramontana; ed ho veduto con reiterate pruove, che le piante a questa parte situate si son mantenute molto meglio, rispetto alle altre, colle quali non usavasi la stessa precauzione, ed i lor fiori più belli, e vegeti mi riuscivano. La ragion si è, come fanno i Fisici, che la percossa di un corpo, sia de' raggi, o del vento, o di che che sia, quand' ella cada obliqua, riesce molto più debole della percossa perpendicolare; e questa obliquità de' raggi è la principal cagione, per cui la Terra nell' Inverno si raffredda, e gela; perchè declinando il Sole dal nostro vertice in ver la parte Australe, i suoi raggi, obliquamente cadendo in sulla superficie, sotterra non penetrano, come i perpendicolari, per riscaldarla, ma per la maggior parte se ne tornano in aria vigorosamente riflessuti. E per la ragion medesima noi con istudiato artificio abbiam procurato di conciliare alle nostre ajuole quasi un secondo Inverno, inclinandone a Borea la superficie per riparo del Sole, e de' caldi venti meridionali.

11. La medesima industria ci vien suggerita nello Spettacolo della Natura, per usarsi al contrario ne' paesi freddi, ove sia pernizioso il prospetto Settentrionale, dicendosi nel *Dial.* 6., *Tim.* 3. 2. Le porche, così assestate, diconsi porche a costa. Voi vedete, che le medesime dalla parte di Tramontana sono elevate, e vanno a poco a poco declinando verso la parte di Mezzogiorno. Un' tal positura è sempre giovevole. Se la terra è troppo umida, troppo vorace, e sopra tutto dominata da venti freddi, non solo è utile, ma quasi necessario, situar le porche a costa. Questa figura essendo uni-

for-

forme per tutta la lunghezza del quadro, non è disgraziato all'occhio. L'acqua, che scola necessariamente nel viale, mantien più asciutta la porca. Il pendio del terreno presenta al Sole la sua superficie in modo tale, che i di lui raggi l'investono quasi a perpendicolo: sicchè il lor riverbero vien ad esser più gagliardo, ed il calore più attivo. Evvi poi un altro vantaggio, che forse è maggiore degli altri due: conciossiachè il gelo, ed il vento settentrionale, percotendo nella schiena di quel terreno declive, si rompono, nè possono fare gran danno a' legumi, che si ritrovano per di dietro al coperto, e quasi sicuri da' loro insulti. L'arte in tal caso imita perfettamente la Natura; imperocchè ancor ella ha guernito di tratto in tratto il suo grande ortale di colli, e di piagge; affinchè alcune piante, che senza l'ajuto di gran calore non maturerebbono quasi mai, ricevano di petto i raggi del Sole, ed in virtù del lor poderoso riflesso crescan più presto. »

12. E qui cercherà taluno il nostro sentimento, per saper, qual sia per lo giardino il prospetto più vantaggioso; perocchè gli Autori non son fra se totalmente concordi; e sebbene convengano in dare, per lo più cattivo, il prospetto di Tramontana, e per mediocre il rivolto a Ponente; dividonsi però i lor pareri intorno al prospetto del Levante; o del Mezzodì, volendo alcuni, che sia l'ottimo di tutti quello al Levante, ed altri preferiscono a questo medesimo il rivolto al mezzogiorno. Sta a favor del Levante il P. Rapini:

Principio tellus vortio querenda parando est

Ecum ad Solem.

Siegue la stessa opinione il Sig. Liger Tom. 1, c. 1 *Jardinier fleuriste*, adducendo come per ragione, che il Sole al suo primo nascere ravviva i fiori di tal maniera, che stando essi bagnati di rugiada, col calor de' raggi pigliano un aumento molto maggiore, che in qualunque altra situazione. Ma

quando questa ragione fosse comprovata dalla sperienza; come farebbe uopo, militerebbe ancora per la situazion meridionale, la qual pur gode del Sol nascente. Certo è, che il prospetto Orientale è da preferirsi all' Occidentale, almeno per la maggior comodità di poter meglio la sera adacquare le piante, alle quali nuoce il freddo dell' acqua, mentre ancora son calde dal Sol di Ponente; ma che poi debba pur preferirsi al meridionale, nol consentono comunemente gli altri Autori, tra quali è il P. Vannierio nel luogo, da citarsi sulla fine di questo capo.

Nec Boreas affliget olas, si colle sub alto

Molliter ad tepidas ager inclinabitur Austror.

Vi è ancora il Signor Pluche *Spett. de Nat. Diab. 6.* a Un sito, die' egli, che guardi a Mezzogiorno, è sempre migliore di qualunque altro, purchè il terreno, che prendesi a coltivare, non sia eccessivamente magro, e sottile; stantechè allora sentendo la sferza del Sole, verrebbe ben presto ad infievolirsi. Ma dove il vostr' orto non possa guardare a Mezzogiorno, è sempre meglio esporlo al Levante, che al Ponente. L' aspetto della Tramontana è il peggior d' ogn' altro, nè le piante vi faranno mai prova, quando non siano gagliardamente ajutate da un ottimo fondo di terra. 2.

13. Il mio sentimento è, che debbasi dar la preferenza ora al Levante, ed ora al Mezzogiorno, conportano le circostanze del clima, e delle qualità de' venti ne' differenti paesi: in un clima caldo, come questo qui di Palermo, ed ove i venti Australi sono nocivi alle gentili piante, come qui, che son caldissimi, ed impetuosi, sta meglio il giardino riparato dall' Ostro, ed esposto al Levante, o anche al Grecale, che qui spirar soavissimo, e salutare: là ove però trattisi di un clima freddo, ed i venti Australi non sien così nocevoli, ma più tosto nocevoli sieno i venti Orientali, come in molte Città mediterranee di questo Regno, ove soffia-

no.

no tempestosi; quivi a dirittura si cerchi per lo giardino un sito rivolto al Mezzodi, che sarà l'ottimo infra tutti; perchè le piante staran meglio riparate dal gelido Borea, e riceveran dal tiepido Ostro il necessario fomento.

C A P O II.

*Della seconda, e terza condizione, richiesta
per lo Giardino de' fiori.*

F4.

A Vendo soddisfatto alla prima condizione per lo buon sito del Giardino, dico brevemente della seconda, che 'l sito debb' esser dolcemente inclinato all'Orizzonte, e non totalmente a livello: perchè se l'acqua non ha il suo competente pendio, non vi può scorrer liberamente; e se sia costretta a morir nel giardino, e molto peggio a morir nelle ajuole de' fiori, presto vedrete le piante perdere il sano buon colore, ch'è il verde scuro, e di mortal pallore ricoprirsì. Non vi ha cosa più facile a corrompersi, quanto l'acqua stagnante, e la sua corruzione tira seco infallibilmente il corrompimento, e la morte de' vegetabili, che se ne nutriscono. Se alle biade, ed a tutte le piante rustiche ne' luoghi piani, e ne' fondi, grave nocimento apportan le piogge dirotte, per più giorni continuate; molto maggiore sarà il detrimento, che le piante a fiore, gentili, e delicate, ne riceveranno: il perchè fa di mestieri, che 'l terreno abbia sufficiente pendenza, per dar libero il corso all'acqua, che sarà superflua, dopochè le piante ne avran bevuto a sazietà. Che se 'l terreno non sarà in pendente, bisognerà ridurvelo coll'industria; ciò che si potrà far in due maniere; o portando terra colla carretta, ed aggiugnendo

la a quella parte, che si vorrà più alta, oppure scavando tanto le strade intorno ai ripartimenti, finchè le ajuto vengano sollevate all' altezza almeno di un mezzo piede sul livello delle medesime strade; e questa terra, acciocchè non ricada, verrà sostenuta da un muricciuolo, da un riparo di mattoni, da un cordone di Bosso, o che che altro sia, che intornia i ripartimenti, e forma il disegno del Perterra. Questa qui è stata l'ordinaria industria, che ho fatta praticar con buona riuscita negli orticelli di casa, chiusi fra quattro mura, acciocchè l'acqua superflua de' ripartimenti abbia lo scolo nelle strade, le quali, o son di terra bibula, e l'assorbiranno; o se no, bisognerà dare sfogo alle acque delle strade fuori del giardino, o scavarvi almeno una morte, ove vadano a percolare.

15. Erà la terza condizione, che 'l giardino non sia in luogo esposto a venti impetuosi, o in altra guisa nocivi, e che sia insieme scoperto da' salutari. In ogni paese sono i suoi venti furiosi, e maligni, ed altri soavi, e salutevoli, secondo la diversa postura, e combinazione de' monti, e delle valli, de' Mari, e del Continente, d'ond'essi spirano, e per onde passano: gl'impetuosi tutto scompigliano, e frangono rami, foglie, fiori, e malmenano tanto il combattuto cesto dell'erba, che lo rendono inutile alla fioritura. Non è però sì grave il danneggiamento, se scorra il vento liberamente senza incontro di ostacolo, che 'l suo diritto corso impedisca; perchè in tal caso la pianta, cedendo all' impeto, umiliassi, e piega tutta da una banda, e così l'urto declina; ma se la furia del vento s'imbatta in qualche argine, che l'obblighi a retrocedere, e ad aggirarsi a maniera di turbine, come suole accadere in certi piccoli giardinetti intornati di alte mura; allora il cesto, dalle contrarie agitazioni sbattuto per ogni verso, ne resta come pesto, e sperperato.

So.

16. Son di poi in'altra maniera nocevoli i venti, o troppo caldi, o troppo freddi, o i veggenti da contrade false, sulfuree, e paludose, i quali come nuocono al respiro degli animali, così danneggiano altresì le piante, cui pur compete dell'aria il vital respiro. L'aria, che spirano i venti, s'ella è troppo calda, ne affanna il respiro, asciuga l'umido radicale, e fa languir le piante; s'ella è troppo fredda, ne affoga il respiro, inceppa il moto de' fluidi, e le piante col suo gelo assidera: e s'ella è infetta di cattivi vapori, le ammorbida, ed uccide. Sembra strano forse a taluno, che l'aria infetta abbia pur della possanza su i corpi legnosi, ed insensati, come l'ha su i corpi degli animali, per ammorbarli; ma ella è cosa certa per isperienza, ed autenticata dall'autorità di tutt' i Scrittori d'Agricoltura: l'avverton essi con gran premura, di non piantar orto, o giardino, né a comprar podere, vicino a paludi, o in altri luoghi d'aria trista, e perniziosa: ne cito due, che van per mille, Varrone, gran Maestro delle cose rustiche: *L. 1. de Re rust. c. 2. Quae salubriora sunt, illa fructuosiora.* Et c. 4. *Ubi salubritas non est, cultura non aliud est, atque alea domini vita, ac rei familiaris.* L'altro è il P. Rapini, che canta così sul principio del libro primo:

*Principio tellus, horto, quarenda, parando est
Eoum ad Solem, Et Caelo subjecta salubri;
Cui non vicino collis de rure propinquus
Immineat, fumosque palus obducit inertes.
Nam Caelo in primis flores latantur aperto,
Nec possunt tardos stagnorum ferre vapores.*

17. Esclusi dal giardino i venti maligni, e tempestosi, vi ha uopo de' salutari, e piacevoli. Le trachee, che son piccioli vasi spirali nella tessura de' vegetabili, non son per altro uso, che per ricever l'aria, e tramandarla con una specie d'inspirazione, e respirazione: or questo uso mostra la necessità, che hanno le piante, niente man-

co degli animali, dell'elemento dell'aria salubre per la lor conservazione, la qual necessità ci contestan pure gli effetti, e la sperienza; e però vien prescritto, come una delle cose importanti, che 'l giardino sia ventilato, ed esposto all'aria, ed a' venti più salutari. Per più anni ho io costantemente osservato, che le piante de' fiori riescon molto meglio condizionate all'aria libera in campi aperti, che in luoghi chiusi, ove si desidera la necessaria ventilatura; e posso parimente affermar, che de' due mali, dovendosi scegliere il minore, debbasi preferire un sito dominato da' venti, ancorchè impetuosi, a qualunque altro, cui manchi la prescritta ventilazione. Come l'acqua morta, e non battuta, così l'aria inerte, e non agitata da venti, si guasta, e corrompe, e genera nel terreno, e nelle piante la corruzione. L'agitazion del vento mantiene asciutta la superficie del suolo, ed impedisce, che sopra vi si propaghino sozzure di muffa, e muschio, e vermini sotto alla superficie, i quali generi nocivissimi regnan nell'umido; e però là ove manchi all'aria il moto, vi regneranno le maligne stirpi, niente manco, che ne' terreni a bacio, come si è già divisato.

18. Ho fatto di più un'altra osservazione, ben degna da notarsi: ho provato con replicate sperienze, che le piante d'ogni genere patiscono grave nocumento, non solamente stando piantate, come ogn'un sa, sotto alberi, pergole, o altro, che le ingombri, e lor impedisca il Cielo perpendicolare; ma eziandio senza tale impedimento, piantate meramente vicine, e prossime alle alte spalliere, o fabbriche; queste tali piante o non nascono, o presto muojono, o mal rendono il fiore, e 'l frutto desiderato. Il cattivo effetto non si può ad altra cagione attribuire, che a difetto dell'aer libero, e all'impedita ventilazione, ancorchè sia laterale da una sola banda l'impedimento. Quindi prescrive il Rapini, a metter mano alla scure, per tagliar tutti all'intorno quegli alberi
che

che fanno ingombro al Sole, ed argine al moto libero de' venti.

*Ipse mihi validam quasrens per tesqua bipennem
Limitem agat lasum, & longè nemus omne repellat
Villicus, omne nemus, nocet omnis floribus umbra.*

Se non che qui appresso altre più efficaci riprove risciteremo della fecondità, che vien dall'aere, nell'agitar, che faremo, la quistione intorno alla stessa fecondità, in che mai ella consista, e qual sia la vera causa, che madi ubertosa rende la terra. Con ciò verrà meglio confermata la condizione prescritta per un buon giardino, che sia ventilato, e rivolto a venti più salutari, acciocchè possa continuamente ricevere influssi sempre nuovi, co' nuovi cangiamenti di quell'aere, che tanto contribuisce al suo fecondamento.

C A P O III.

*Della quarta, e quinta condizione per lo
giardino de' fiori.*

19. **V**Uole la quarta condizione, che 'l giardino abbia il comodo dell'acqua vicina. Ove manchi l'acqua non si può aver giardino, e però dice Varrone *L. 1, c. 1: Sine aqua omnis arida, ac misera agricultura, sine successu, ac bono eventu, frustratio est, non cultura.* Senz'acqua non posson farsi al più, che i soli fiori d'Inverno, e questi piantati solamente nel terreno, non già ne' tetti, i quali fa uopo soveramente adacquare: L'acqua dovrebb'esser di fontana per riguardo alla maggior comodità, e la fontana nel centro del Giardino, per averla più vicina, e ne' grandi giardini dovrebb'esservi in ogni quarto, o ripartimento la sua particolar fontana per lo medesimo riguardo della maggior vicinanza, e comodità, questo è 'l

peccato più frequente de' Giardinieri, che trascuran d'innaffiare a suo tempo quelle piante, che ne han bisogno, massime ne' tempi estivi, quando un sol giorno di Sole basta, per farle languire, o morire, allorchè le incontra sitibonde; e perciò a levare ogni scusa alla loro insingardagine, sarà ben fatto, che in ogni cantone stia pronta l'acqua, acciocchè non abbia a costar loro, che poca fatica, l'innaffiamento. Ove non siavi acqua viva di fontana, siavi almeno un pozzo, e la maniera facile da potersi attinger l'acqua con qualche macchina Idraulica, qual'è la Tromba. Ma in difetto di pozzo bisognerà ricorrere all'industria di fabbricare, o cisterna, o stagno d'acqui da un lato del giardino, ed in quello far colare da' tetti, dal cortile, o dalle strade vicine le piogge, che cadono nell'Inverno.

20. Gli Autori trattanti d'Agricoltura cercano fra la varietà delle acque, di fonte, di fiume, di pozzo, di stagno, e di cisterna, qual sia la più proficua, ed a qual debbasi dare 'l primato per la sua maggiore utilità; e per la comodità dell'innaffiamento? Tutti convengono, a dar l'infimo luogo all'acqua di pozzo, non solo per la fatica, di doverla tirar su a forza di braccia, o di macchina, il quale incomodo è pur comune per ordinario all'acqua di stagno, e di cisterna, ma perchè chiusa nel cupo fondo del pozzo non gode dell'aria libera, che di particelle feconde l'impregna, e di più suol mantenersi molto fredda, ed il freddo, applicato repentinamente alla pianta, nel mentre ch'ella trovasi calda, le nuoce, come nuoce a' nostri corpi, e ne altera il temperamento. Quindi per riparo dell'uno, e dell'altro inconveniente l'acqua cavata dal pozzo, dovrà versarsi dentro una pila, e quivi si lascerà riposare per qualche giorno, prima di farne uso, e così sarà utile senza pericolo di nocimento. 2. La peggior di tutte (dice lo Spett. della Nat. *Dial. 6.*) è quella.

quella di pozzo; perchè essendo comunemente fredd^{is}sima, è pur capace di far morire le radici. Gli Ortolani non l'adoperan mai, senz' averla prima tenuta esposta per qualche tempo all' aria. 2

21. L' Autore medesimo loda molto l' acqua di cisterna, ma non si fa carico, ch' ella patisce presso a poco i due medesimi inconvenienti, ora condannati nell' acqua di pozzo; cioè ch' ella suol esser fredda, e del beneficio dell' aria libera vien fraudata. Con tutto ciò per le altre lodi, che le convengono, a quella de' pozzi con giusto merito devesi preferire. Ella è acqua venuta immediatamente dalla pioggia, la qual riesca la più proficua per comun sentimento, ed è lungamente dimorata nell' aria, e dall' aria vien in terra di molte particole nutritive imbevuta: a tal che il Cel. Boerhaave potè chiamar la pioggia con giusta proprietà, ranno, o lisciva dell' Atmosfera: *Tom. 1 Chymia, Tract. Aqu. pag. 598*: perciocchè come il ranno scioglie, e porta seco i sali, e tutto ciò, che ha il fuoco attenuato, e reso solubile, nelle ceneri; così fa l' acqua della pioggia, che solve, assorbe, e seco strascina giù dall' aria, quanto di grasso, e di nutritivo v' era salito colle sì varie esalazioni, che van sù continuamente dalla terra. Ella è per me cosa certa, e provata, che la pianta, nutrita d' acqua piovana, riesca più vigorosa, e fertile, che un' altra, cui le si nega l' acqua del Cielo. Ella pure, prima di colare nella cisterna, strascina seco della polvere, del nitro, e del limaccio, che risiede sù i tetti, o sul terreno, per onde scorre, e via più s' impingua, e riesca via più nutritiva. Per le medesime ragioni l' acqua delle piogge conservata in uno stagno, debbe riuscir molto più feconda; sì perchè gode del beneficio dell' aria aperta, e sì perchè ch' raccolta da' terreni, per onde scorre per un più lungo tratto di via, trasporta seco una maggior quantità

di sali, di nitro, e di materie stemperate, grasse, ed impinguantì.

22. Ma ciò non offante acqua con acqua comparando, e tutte considerando le circostanze, e le utilità, io son di parere, che a tutte debba preferirsi l'acqua viva di fiume, o di fontana. E' da eccettuarfi solamente la pioggia, come ora diceva, perchè vien immediatamente dal Cielo, ed è il latte più connaturale, destinato da Dio alla nutrizione de' vegetabili; e si vede sensibilmente, che dopo quella le piante tutte si ravvivano meglio, che non facciano cento inacquamenti. Ma l'acqua del Cielo non è sempre a nostra disposizione, come quella di viva fonte, o di fiume, la qual abbiain sempre in nostra balla, e nel maggior uopo, quando fa la maggior bisogna in tempo di siccità; e l'abbiam pronta, senza lo stento di doverla cavar su a forza di braccia, come dagli stagni, e dalle cisterne, e l'abbiam sempre con noi vicina, per derivarla in ogni parte del giardino, e per maggior comodità possiam moltiplicarla in più spendenti di piccole fontane in ogni suo compartimento.

23. Dietro a questo gran pregio vien l'altro, che ella può esser fecondante al pari, e più ancora dell'acqua di stagno, e di cisterna, tanto comunemente lodata: perocchè l'acqua di fiume, o di fonte, è l' secondo latte da Dio destinato al sostentamento de' vegetabili, da somministrarsi coll' umana industria, come succedaneo alla pioggia, quand' essa manchi; e però è da persuadersi, che quest' acqua tenga il secondo posto in grado di fecondità: molto più, che s' ella tal fecondità da per se non avesse, la se le potrebbe agevolmente conciliare, come a quella degli stagni, e cisterne. Sarebbe il caso di conciliarla, quando la sorgente dell' acqua fosse immediatamente vicina; ed allora, tenendo raccolta quell' acqua in uno stagno, o peschiera, (come si fa sempre
ne'

ne' giardini, ed è necessario per averne copia; e potere ad un tratto, ed in poco di tempo tutto adacquare il terreno), quell' acqua, dico, ivi stagnante, ed esposta a' venti, s' impregnerà de' benefici influssi dell' aere; e di quelle polveri, e spazzature, che i venti vi porteranno. Ma nelle acque de' fonti, e de' fiumi, che per ordinario vengon da lontano, non si ha, che desiderare; giacchè godon lungamente dell' aria, e seco menan tutta quella sostanza pingue, che cala giù da' colli, e dalle valli.

24. Ma per sentirne ancora sopra di ciò i sentimenti altrui, riferisco qui le parole medesime di due insigni Autori. Il Sig. Pulche, *Spec. Nat. dial. 6*, dice così. « Benchè quest' acqua di fonte, riposata, e calefatta dall' aria, divenga attissima, ad ajutar la circolazione del succhio nelle piante; tuttavia non farei men capitale dell' acqua di fiume: poichè ricevendo ella continuamente de' sali volatili, e partecipando dell' altre influenze dell' aria, non può far di meno, di non apportare alle medesime piante un notabile giovamento. » Il P. Ferrari, Corifeo de' Fioristi, assegnando pur le sue ragioni fisiche, così ragiona delle differenti acque, delle quali sin ora si è fatto il parallelo: *Lib. 3, c. 2*. « Le acque de' pozzi più cupi si schivino, per quanto sia possibile, che come lungi dal Sole, e da quello non riscaldate, nè assottigliate, rimanendosi nella loro freddezza pertinacemente, non fomentano le piante col nutrimento, ma col freddo l' annazzano. Sicchè se non vorrai aver acqua più salutare, prima di spargervi quella del pozzo, tienla all' aria, o, se è lecito, al Sole, perchè intepidisca. Fra le acque la migliore, e più profittevole, per innaffiare, è tanto quella, che scorre, la quale con quel moto, e dibattimento si assottiglia, e riscalda, quanto la piovana, che raccogliasi nelle cisterne; come quella, che piena di vapori di fuoco, e d'aria,

che

che hanno del vitale, a maraviglia conferisce alla naturale fecondità degli orti. Per cagione di una cotal temperatura di questi elementi le piogge riescono più giovevoli a' campi; dove le acque morte sono al tutto nocive, come quelle, che per la putrida grossezza loro malagevolmente penetrano, e per la puzza, e corruzione sono più atte a generare vermi, che a nutrir fiori. ~

25. Quest'ultimo sentimento del P. Ferrari per le acque morte suscita un dubbio, che sarà pregio dell'opera il risolverlo. S'egli per acque morte intende certe acque crasse, putride, limacciose, che riseggon lungamente nelle pozzanghere, e ne' pantani; è cosa verissima, che son nocive, come nocivo è similmente quel corrotto limaccio, in cui riseggono; perchè hanno assai del sulfureo, come lo mostra il grave puzzo di zolfo, ch'escalano, assai volatile, e penetrante. Ma se voglia pure fra le acque morte comprender tutte le altre acque stagnanti, che in qualche moderato grado male olezzano, e son di cattivo sapore, qual suol esser quella de' laghi, degli stagni, e delle peschiere, la qual, per bere, saria nocevole; secondo quest'altro sentimento io sto per contra, ed intendo, che alle piante meglio convengasi un acqua impura, torbida, e crassa, che ha moderatamente del corrotto, e del puzzolente, che non un acqua limpida, e pura, la quale a noi, e agli animali si conviene più utilmente, che alle piante.

26. Ma dirà taluno, che attesa la gran simiglianza, che vi ha tra il corpo, e gli organi delle piante, e degli animali per la loro nutrizione, da noi medesimi asserita nel primo Trattato, può presumersi, che 'l cibo, e 'l poto medesimo, che riesce a questi utile, o dannoso, tal pure riesca per quelle; nella guisa medesima, che noi poco fa detto abbiamo, che quell'aria, la qual riesce per noi cattiva, riesca parimente morbosa per lo

re-

respiro de' vegetabili. Di questo parere altresì par, che debbano esser tutti coloro, i quali hanno attribuito forse un pò troppo alla scambievole similitudine tra le piante, e gli animali, sino a volerla ridurre quasi a perfetta egualità: così Campannelle, presso l' Ardena citato pag. 75: Animali immobili chiama le piante: *Animalia immobilia*: L. 3, c. 14, *de sensu rerum*: così Placone, Animali fissi per le radici: *Animalia radicibus connexa*: *Platonis Philosophus Ficin.* pag. 620, col. 2: anzi l' Sig. Quintinie, *Reflexions sur l'Agriculi.* c. 7, pag. 300, concede loro anche il moto progressivo, mentre van serpeggiando sotterra colle radici, che sono i lor piedi. Ma più vicino al nostro proposito il P. Vanierio, soavemente cantando, fa la vita degli alberi, la lor testura, e complessione, eccettochè più semplice, similissima alla nostra; e però, dic' egli, quel nutrimento, che sarà utile per gli uni, come utile per gli altri, la natura verissimilmente ha destinato.

Arborci fetus, hominisque senillima vita est...

Namque sui semper natura simillima textus,

Simpliciore quidem, sed non diversa sequuto

Plantarum vitam, pecudumque, virumque tuctur.

Prod. Rust. L. 5, pag. 147, & 150.

27. Ma vana è la pretesa di una total parità di complessione nelle piante, e negli animali, se neppur si dà ella fra pianta, e pianta, nè fra specie, e specie d'animali. Di quanto differenti cibi si pascolano gli animali di tutte le diverse specie? e così le piante di quanto diversi alimenti? e quello, che agli uni è mortal veleno, non è sovente per gli altri salutare, e vital nutrimento? Così pure dicasi del poto delle due differenti acque per le piante, e per gli animali, di cui era la controversia. L'acqua fermentata, e corrotta, purchè la corruzione non sia strabocchevole; benchè per noi sia velenosa, ella è per altri animali, che quivi guizzano,

c vi-

e vivono felicemente, e per le piante la più salutare, che siavi, ed è proprio come un brodo consumato, che non è sola bevanda, ma insieme cibo sostanzioso; e per lo contrario l'acqua limpida, e pura è come un brodo sciocco, che ha poco del nutritivo. Tutto questo si conoscerà molto meglio nel seguente Capo, ove proverem, che quel terreno è più fecondo, il qual contiene maggior quantità di sostanze sottilizzate dalla fermentazione, e dissoluzione de' corpi, specialmente vegetabili; e direm, che di tali particole, sciolte nell'acqua, si nutrice, e compone il corpo della pianta. Ma se l'acqua è torbida, e guasta, ella ha patito della fermentazione per quelle materie corrutibili, che vi son cadute dentro dall'aria, o portatevi da' venti, o seco via dalla corrente strascinate; e però tali sostanze assottigliate, dopo lunga macerazione daranno alla pianta il suo proprio pabolo, e la terra, con tal sorta d'acqua innaffiata, diverrà sensibilmente più feconda.

28. La quinta prerogativa del nostro giardino debb' esser la vicinanza all'abitazione, per tre motivi non poco interessanti: uno è, per averlo sotto all'occhio, e goderne; l'altro è, per meglio governarlo, e custodirlo; ed il terzo, per aver il comodo, ove poter ripostare le radici, i bulbi, le semenze, ed ove tenere i vasi, gli strumenti, e gli attrezzi necessarj alla coltivazione. E' invidiabile la buona sorte di coloro, i quali tengono in Città, ed in casa propria un orticello in sito proprio, per allevarvi i fiori: hanno quivi sotto a' suoi occhi la lor delizia, la distrazione, ed il divertimento, ed hanno il piacere, di poter coltivare colle proprie mani certe piante più favorite, o di far certe cure più maestrevoli, e delicate, che schivano una mano imperita, e rusticana.

29. Ho io sempre consigliato a que' Signori, che meco si consultavano, per far orti di fiori, che non li

faceſſero nelle lor magnifiche Ville , ove ſien lontane dalla Città ; ed ho lor ſuggerito , che più toſto piantino in quel ſito , che ornato voglion di fiori , un giardino di frutta , o un orto di erbaggi , ben diſegnato ovvero un bel perterra di mero boſſo : perchè ſe ogni giardino , per ben conſervarſi , e fruttare , ha biſogno dell'occhio , e della mano del padrone , o d' altro , che in ſua vece ne viva , come eſſo medefimo intereſſato ; molto maggiormente un giardino di fiori ha tal biſogno ; dacchè per la ſperienza , che ne ho , ſenza la continua cura , ed aſſiſtenza del padrone , tutto in poco , e fiori , e radiche , e giardino vi ſi perderà . La gente ruſtica , avvezza ſempre a lavori groſſolani , mal ſi accomoda alle delicatezze , e minuzie , che richiede la buona coltivatura de' fiori ; ed o perchè non le ſa , non le adopera , o ſe ne attedia , e le traſcura . Coſì pure , avidi comunemente i villani di cavar frutti , e non fiori da lor travagli , di mal talento impiegan l' attenzione , ed i ſudori a coltivar ciò , che non amano ; e però ſe 'l padrone non ſarà ben aſſiduo ad iſtruirli , e ad eſiger la pratica de' documenti , non paſſerà guari di tempo , che vedrà con ſua pena , andare ogni coſa deteriorando ſino al totale diſtruggimento .

30. Un altro male partoriſce la lontananza del giardino , ed è 'l più frequente ; cioè che 'l padrone aſſente biſogna fidarſi del giardiniero ; e queſti , benchè in tutt' altro ſia provato fedele , però in materia di fiori non lo ſarà ſicuramente ; e di fiori , e di radiche , e di tutt' altro di tal genere lo frauderà . Parlo ancor qui ſulla ſperienza di quaſi tutti que' , che ho provati , o conoſciuti . Ancorchè per la fedeltà ſi poſſa lor conſegnare in mano un teſoro , pure non par , che ſien liberi , quando lor dianſi in potere radiche , e fiori ; e poi ſempre ſceleggono il meglio per ſe , ed a noi laſciano il più vile , e 'l putrido . Hanno beniffimo i ſuoi luſinghevoli motivi , e

vani pretesti, a prevaricar così facilmente; sì perchè nella loro idea son cose di poca stima le piante a fiore, e però lusingansi, che sia quello un furto di lieve conto; quasi che non costi grave rammarico, e non sia costata grave spesa al padrone la compra de' bulbi, e delle radici, e la lor dispendiosa coltura: sì perchè molto più gli adescia il buon prezzo, con cui le vendono. Ma sopra tutto suol dar loro l'ultimo crollo la pressante suggestione de' Fioristi, e di tutti que', che vanno ansiosamente in cerca di bulbi, radici, e fiori, i quali senza scrupolo anch' essi, quando vi dovrebbero aver rimorso di coscienza, van sollecitando tanto, e poi tanto con lusinghe, e promesse i miseri giardinieri, che finalmente n' espugnano la costanza. Guai per quel giardino, che ha il padrone o lontano, o trascurato.

3^a. Rimane l'ultima condizione, ch'era la scelta del buon terreno; ed essendo questa la dote più importante, merita, che sene parli separatamente nel seguente capo; mentre conchiudo il presente col dolciissimo canto del P-Vanierio, il qual con estrema grazia, e perizia tutte in nove versi comprende del buon sito di un orto le prerogative. *Præd. rust. L. 9, sub init.*

*Delicias, & ruris opes qui præparat hortum,
Arva domo vicina colat: sit commodus aer,
Pinguis humus, facilisque: sine telluris iniquæ
Corrigitur vitium, sed inemendabile Calum est.
Prona per arcolas aqua derivabitur omnes;
Nec Boreas affiget olus, si colle sub alto
Molliter ad sepidos ager inclinabitur Austros.
Nuda sit arboribus tellus: vernantibus herbis.
Una laborantis non officit umbra coloni.*

C A P O IV

*Del buon terreno per lo giardino
de' Fiori.*

32. **U**N fondo di buon terreno è 'l principal fondamento di un buon giardino, e senza di questo niente giovano tutte le altre profittevoli prerogative: bisogna, che il fondo sia fertile di sua natura; perchè a farvelo per arte, o non si ci riesce, o costar dee molta spesa, e fatica: in vano sempre ci affatichiamo, se la Natura ci sia ritrosa; e poco profitassi coll' arte, e coll' industria, se la Natura col suo ajuto non ci sia propizia. La buona qualità del terreno può ben supplire al difetto di tutt' eziandio le altre ricercate doti, ma tutte queste insieme il difetto di quella non posson mica supplire: quindi la principal cura dee mettersi in cercar terreno, che sia fecondo, e tal, qual conviene alle nostre piante.

33. Ma se per mala sorte il suolo destinato al giardino sia di cattiva terra; potrà ripararsi con due rimedj, i quali, come che riescano sempre amari, e dispensiosi, pur non costeran troppo a riguardo della qualità di queste piante, le quali non profundan per lo più le radici; e però sarà facile 'l rimedio, di far trasportare altronde la buona terra, e con un piede di altezza ne avremo a sufficienza, e con due piedi a soprabbondanza. Potrà darsi un secondo rimedio, di acconciare quel medesimo terreno, quando non sia enormemente tristo, e di correggerlo in quel, che pecca, secondo l'arte, che da qui a poco suggerirò. Che se questi due rimedj riusciranno tutta via difficili, aggiungo il terzo, il qual tutto ripara, ed è di abbandonar l'impegno, e

piantar quivi tutt' altro, che si potrà, ma non giardino di fiori, per non andar vanamente cozzando contra Natura.

34. Alle piante a fiore, come son esse gentili, così convien quasi universalmente una terra, che pur sia gentile, tenera, e leggiera: sarà tale, quando avrà le tre doti seguenti, alle quali riduconsi tutte quelle buone qualità, che vi desiderano, e che prescrivono i Fioristi; cioè che sia sottile, sciolta, e mediocrementegrassa. Quindi vien esclusa primo la terra cretosa, aspra, e forte; perchè sarà solamente sottile, e forse ancor grassa, ma non già sciolta: secondo, la ghiaiosa, petrosa, arenosa; perchè non sarà nè grassa, nè sottile, benchè sia sciolta: terzo, la gessosa, e smorta; perchè non sarà sufficientemente grassa. La sottigliezza fa, ch'ella meglio si accosti, e adatti al contatto di tutte le radici, fin de' capillari, e più sottili, come cara madre, che stringesi al petto la prole, e le applica in bocca le poppe, per allattarla; oltre di che nella terra sottile truovasi attenuato già l'alimento, qual richiedesi per la nutrizione. La scioltezza della terra fa, che le tenere radici senza patir violenza possano agevolmente per tutto insinuarsi, e sfendersi ampiamente, per tirar da ogni banda, e fin da lontano abbondevole sostentamento: v'è di più, che la terra ciolta essendo rada, e porosa, lascia libero il passo alle ignee particole, che vibra il Sole, e all'acqua, e all'aria, le quali penetrando fino alle più basse radici, vi arrecan sempre nuovo alimento; e poichè il terreno è bibulo, non è facile, che si aggravi d'acqua, e si corrompa, e corrompa le piante; come quando è denso, e cretoso, l'acqua, che stagna, tutto guasta nelle gran piogge dell'Inverno. La terra sciolta è pure stimabile, perciocchè più agevolmente lavorasi, e lasciassi più agevolmente maneggiare, zappare, e sinuovere intorno alle piante con quella delicatezza, che

fi richiede, per non rompere, o maltrattare le tenerissime radici.

35. Le due riferite doti di sottigliezza, e scioltezza formano una terra leggiera, mobile, e tenera; ed è tanto importante la tenerezza, che al riferir del Padre Ferrari, Catone *De re rust. c. 151*; e *Plinio lib. 17, c. 5*; nella sola tenerezza riposero tutte le doti di un buon terreno: 2 Che se, dice il Ferrari *L. 1, c. 6*, vogliamo con un solo vocabulo di molta forza, descrivere un ottimo terreno al piantar de' fiori, con Catone lo chiameremo tenerissimo: essendo che in questa sola parola, al parere anche di Plinio, contengasi tutto ciò, che in quello può richiederfi, e desiderarsi. Questa sorte di terreno è di temperamento fertile, agevole al coltivarfi, nè umido troppo, nè troppo assetato. 2

36. Ma il P. Ferrari giudica, che pur tutte contenga le buone qualità quel terreno, il qual sia mezzanamente grasso, ed è questa appunto la terza qualità da noi prescritta. Dic' egli: 2 Il terreno, confacevole ai fiori, sarà quello, che nè magro, nè grasso sia, ma dell' uno, e dell' altro con una mediocrità uguale temperato. 2 e dopo aver data ragione di tal richiesta mediocrità, e del vizio de' due estremi di troppo grasso, e di troppo magro, (la qual ragione, noi altrove apporteremo) soggiugne la ragione, che qui cerchiamo, della sua fertilità: 2 Ma per qual cagione divien' ella così fertile, e a pro' de' fiori veramente d' oro, questa mediocrità della terra? Certamente perchè la spessezza, e radezza, l' umidità, e siccità, la gravezza, e leggerezza, qualità tra di loro contrarie, con un coral temperamento ritengono come collegate, che le parti della terra più alte alle basse moderatamente corrispondano Questa sorte di terra sommamente lodata da Teofrasto *De causis plantarum L. 2, c. 6*, sarà di sua natura assai sciolta, e come sfarinata, per cui si disten-

do

dono le radici agevolmente, e penetra più addentro il Sole insieme; e la pioggia; lieve, che non opprimerà la pianta; umida, che la nodrirà. Ma benchè paja, che la sola parola di terra tenera, o mediotremente grassa, contenga il significato di tutte le doti, che forman la terra fertile; con tutto ciò per maggior chiarezza si son' esse spiegate da noi, ad esempio d' altri, più specificamente, ridotte a tre, cioè di terra sottile, di terra sciolta, di terra mezzanamente grassa.

37. Queste doti, trovansi quasi sempre unite nella terra d' ortaggio, ed in ciò convengon tutt' i Fioristi, che la terra, tratta dagli orti, sia pe' fiori la più proficua. Io però direi del mio, ch' ella è la migliore, per empierne i vasi; perchè suol esserè alquanto più grassa, e più sciolta, qual si richiede pe' vasi di creta, dove per l'angustia del luogo non ha la pianta, onde attrarrè tanto alimento, quanto ne vien somministrato nell'ampiezza del terreno; e però fa mestiere, provvederla di una terra più pingue, e sostanziosa; e fa uopo altresì, che in quelle strettezze la terra sia più rada, e più leggiera, altrimenti una terra rozza, e più robusta, spessandosi troppo, al frequente innaffiar del vaso, si farà dura, ed impenetrabile alla tenerezza delle radici, e la pianta correrà pericolo di morirvi, come affogata.

38. Ma parlando de' fiori, che si hanno a piantare in sul terreno, ho io provata un' altra terra di merito più distinto, ed è quella di un terreno salvatico, il qual sia stato per alcuni anni a riposo, rozzo, ed incolto, ancorchè di sua natura non sia la miglior terra del mondo, ma sia solo di mediocre bontà. Un terreno salvatico, massime quando abbia da se le prescritte conditioni, arriva a partorir prodigj di piante alte, e fronzute, di fiori grandi, e belli a maraviglia, e di radici grosse, intere, ed in più rampolli moltiplicate, per la ragion fisica, che altrove ne darò.

Quan.

39. Quando poi 'l nostro terreno non abbia da se le prefate buone qualità, ma pur non sia totalmente cattivo, potrà correggerli secondo l' arte col suo rimedio contrario. Certo è, che non sarà punto correggevole il vizio, se lo tien nelle viscere, come lo ha la terra falsa, ed amara, o d' altra simile malignità intrinseca; ma se sia meramente sfruttata, o magra; potrà rendersi feconda, e competentemente pingue con del concime, che vi si mescoli; la ghiaiosa, e grossiera, potrà temperarsi con una buona dose di terra vischiosa, e sottile; e la cretosa, la dura, ed aspra coll' arenosa, colla sciolta, e colla tenera. La medesima terra d' ortaggio sopra lodata non sempre tien le sue buone dori con moderata, e giusta proporzione distribuite; e però ammette anch' ella spesso la sua emenda, e per ordinario pecca di grassezza, la qual modera la terra magra. Quindi dovrà il Fiorista saper riconoscere la buona, e fertile terra dalla cattiva, ed infeconda da' contrassegni, che ne suggeriscono gli Autori dell' Agricoltura.

40. Il più ovvio, e sicuro distintivo della qualità d' un terreno son le medesime sue produzioni: andatelo a vedere in sulla Primavera; se lo troverete per ogni parte assai pieno d' erbe d' ogni sorta, e tutte alte, folte, robuste; questo è segno infallibile, che quel terreno sarà ottimo; giacchè se privo di coltura, come qui lo supponghiamo, o senza una special coltivatura, alleva così bene ogni specie di piante, avvegnachè salvatiche; è sicuro, che colla diligente coltura nutrirà anche meglio le domestiche. Ma se mai troverete rade fra lor le piante, e per la maggior parte basse, gracili, e mal colorite di un verde pallido; questo è sodo argomento, che quel suolo non sia da se fecondo; nè tampoco l' arte, e la coltura, benchè squisita, potrà mai farlo fruttar tanto, quanto quel primo, che ha per do-

te di natura in se stesso i principj della fertilità . Quindi 'l Vanierio dar volendo gl' indizj d' un terreno ferace , appena altro ne assegna , contento di questo solo .
L. 5 , pag. 4.

*... Rara fruges , virgultaque passim
Nec procera satiss , neque succo plena , docebunt ;
Si quod inest sirra vitium .*

*Es pag. 6. Hunc eme , quum modicis meliorem sumptibus , agrum ,
Efficias ; ubi cuncta vigent , ubi grandis felix
Prigenerat virgulta solum ; folioque tenaci
Luxurians hyemi vix arbor cedit , & alta
Sub nive servat adhuc rami fronden is honorem ;
Pinguis ubi se terra , brevi reparet a quiete ,
Restituit , passimque sinus facunda virentes
Graminibus tegit insuffs , facilisque moveri ,
Nec pluvium tenet humorem , neque finditur aestu .*

41. Son buoni altresì , per conoscer la qualità della terra , gl' indizj , che si han dal colore , dall' odore , e dal tatto ; ma pur questi non sempre son certi argomenti o della sua fertilità , o della sua sterilezza : laonde del colore , il qual si ha per uno de' migliori indicanti , avvertisce saviamente Columella , a non fidarsene tanto , come di testimonio infallibile ; dandosi talora un buon terreno , sotto un mal colorito , ed un buon colorito sopra un mal terreno ; appunto come , spiega egli , dal mantello , o sia dal color del pelo de' Cavalli , de' Buoi , e di altri animali , non si ha sempre indizio sicuro della lor robustezza ; poichè in ogni sorta de' tanti varj colori trovansi delle bestie fortissime . *Non ergo color , tanquam certus auctor , testis est bonitatis arborum , Et ideo frumentarius ager , idest pinguis , magis aliis qualitatibus examinandus est . Nam ut ferissimae pecudes diverses , ac peno innumerabiles , sic etiam robustissima terra plurimos , Et varios coleres ferre sunt .* L. 2 , pag. 45. Le. de rust.

42. Intorno dunque al colore della terra , per quan-

to ricavo da' sentimenti degli Autori di Agricoltura, e dalle proprie osservazioni, parmi, che la fertilità ne' terreni vada di grado in grado aumentando quasi colla medesima proporzione, ed ordine, con cui va il lor colore degradando di chiarezza dal bianco al fosco, e nero. Il terreno bianco per comune consentimento, come il peggior di tutti, vien ripudiato; così il cinericio, il bianchiccio, e smorto, giusta il grado della bianchezza, più, o meno sogliono esser magri, fiacchi, e sterili, e tali son le terre già sopra riprovate, ghiaiose, gessose, e molte delle argillose. Al contrario le terre fosche, brune, nerice vengono universalmente le più lodate, come le più fertili per la grassezza: laonde Virgilio le commenda come ottime pe' seminati.

*Nigra fere, & presso pinguis sub vomere terra
Optima frumentis . . . Georg. 2, v. 203.*

43. Sene hanno da eccettuar le fortemente nere, o che al perfetto nero si accostano; perchè sono grandemente sulfuree, qual è il carbon di terra, che s'infiama, ed accende, per essere tutto zolfo. Quindi le terre de' colori intermedj tra il bianco, e 'l nericante soglion godere di una fertilità intermedia, e graduatamente maggiore, quanto più del fosco van partecipando: così un terreno, che ha del rosso, o del giallo chiaro, vien condannato più tosto di sterilità, benchè tal volta se ne potrà trovare alcuno buono; ed un altro, che ha del rossigno, del biondo del giallognolo scuro, vien commendato per la sua maggior fecondità. Se 'l terreno, che ha del nero, è l'ottimo, e quello, che ha del bianco, suol essere 'l peggior; anche in forza d'argomento s'inferisce, che le terre; quanto più, o meno partecipan dell' uno, o dell' altro de' due contrarj colori, tanto più, o meno debbono aver del fertile, o dello sterile. Conchiudo questo paragrafo colla pesantè autorità del Sig. de la Quintinie, chiarissimo diret-

T. II,

E

to-

tore de' giardini Reali di Ludovico XIV, il qual; dopo una lunga, e circospetta sperienza, ci assicura, che la principal bontà d'una terra è, che sia ella di color grigio, che tira al nero; e che vi sien pur terreni rossastri, i quali rendon molto bene il frutto; ma che non ha egli veduto mai di que' terreni, che fossero al tempo medesimo, e molto bianchi, e molto buoni. *La principale qualità d'une terre est, qu' elle soit d'un gris noirâtre, qu'il y en a'ce pendant de rougeâtres qui sont fort bien, e qu'il n'en a' jamais vû qui fussent en même-tems est fort blanches, & fort bonnes. Part. 1, c. 3, art. 1, presso d' Ardene, Part. 2 pag. 41.*

44. Or qui viene ad alcuno la curiosità, di sapere 'l vero motivo della suddetta connessione tra il color bianco, e la sterilità, e tra il nericcio, e la fertilità. Per quanto da noi si vede, possono esser due i motivi; l'uno è, perchè la materia principale, onde nutrivonsi le piante, ella è la parte grassa, sottile, e solubile, che sta fram mescolata nella terra; e tal materia suol farsi, e suol venire in buona parte della macerazione, e corruzione de' corpi, già secchi, e guasti de' medesimi vegetabili, come dipoi diremo: ma i corpi, assottigliati, e sciolti già dalla corruzione, soglion per ordinario pigliar un colore, che tira al fosco, al bruno, al nero, quasi mai al chiaro, e al bianco; e per ciò una terra, che ha del nero, e del fosco, ha pur del grasso, fatto di tal materia distrutta, che la rende fertile; ed un'altra, che abbia del bianco, non contenendo copia di tal materia pingue, farà magra, e sterile. Serva d'esempio un terreno di bosco antico; voi lo troverete sensibilmente nero, e grandemente pingue, e fecondo; ed onde mai? Se non dalla gran quantità dell'erbe, virgulti, e foglie d'alberi, e di piante, che son caccate sul terreno, ed infracidite vi si accumulano ogn' anno, ed in nera polvere convertite, lo fecondano.

L'al-

45. L'altra ragione, onde viene al nero la fertilità, è stata leggermente accennata dall'ingegnosa Madama la Marchesa du Châtelet presso il fuoco, stampata dietro a quelle, che riportarono il premio dall'Accademia delle scienze nel 1739. Dic' ella così: *C'est la facilité avec laquelle le noir s'échauffe, qui rend les terres noires bien meilleures que les terres blanches.... les corps blancs composés de particules très compactes, & très serrées, cèdent plus difficilement à l'action du feu, dont ils réfléchissent presque toute la lumière qu'ils reçoivent*. Cioè, ella è la facilità, colla quale il nero si riscalda, che rende le terre nere molto migliori delle terre bianche... i corpi bianchi composti di particole durissime, e densissime cedon più difficilmente all'azione del fuoco, laonde rifletton pressochè tutto il lume, ch'esse ricevono.

46. Ma quel poco, che qui ne dice Madama, non basta per tutti; a capirne a fondo la dottrina: e però è da sapere, che i corpi bianchi hanno la facoltà di farsi investire.

La natura di non abbattono in dietro: i neri al contrario lasciansi da quello agevolmente penetrare, e quasi tutto lo assorbono: ma il lume non è altro, se non puro fuoco fortissimo il quale immerso nelle loro interiora, prontamente le agita, e le riscalda; ciò, che non può far ne' corpi bianchi, ne' quali non potendo insinuarsi, non può troppo agitarli, e riscaldarli. Il fenomeno è certo presso i Filosofi, ed il bianco è bianco, perciocchè rimanda in gran copia, e con vigore la luce agli occhi; ed il nero è nero, perchè scarso, e debole la rimanda, e di spesse ombre interrotta: quindi avvien, che la carta bianca, esposta al Sole nel punto del foco di una lente caustica, o di uno specchio ustorio, a grave stento, ed assai tardi, o non mai concepisce 'l fuoco; ma la carta medesima, tinta di nero, in un istante lo concepisce: Co-

al pur se sia esposto al Sole un Cane, o un Gatto, macchiato di bianco, e nero, o se voi mettiatelo al Sole due panni, o che che altro sia, uno bianco, e l'altro nero; applicando la mano ora sopra il bianco, ed ora sopra il nero, proverete nel bianco un grado di calore assai debole, e nel nero un grado sensibilmente molto maggiore.

47. Stabilito questo punto, che un suolo di terra nera vien più riscaldato da' raggi del Sole, resta a spiegare, come i raggi quel suolo rendan fecondo col penetrarlo, e riscaldarlo? Ed ecco il come, in tre maniere: la prima è colla rarefazione, che induce ne' pori delle radici della pianta il calore, e colla sua agitazione, promovendo il fluido nutritore, per farvelo insinuare, ed ajutando i medesimi pori già dilatati a fucciar più copiosamente il nutrimento: la seconda è colla preparazion del medesimo fluido; poichè penetrando sotterra il fuoco Solare, colla sua attività incide, affottiglia, e cuoce la sostanza nutritiva, e rendela più disposta a passare in alimento: la terza è coll' aumento della medesima sostanza nutritiva, che fa il fuoco solare, il quale intendendo io, che penetrando sotterra, quivi smorzato, cioè estinto il suo velocissimo moto, ed impantato fra gli altri elementi, ed in piccole masse impastato, si trasmuta in nuova materia d' alimento; e così renda esso il terreno più grasso, e più fecondo coll' aggiunta di quella nuova materia, che va il fuoco stesso continuamente somministrando; come lo dirò meglio da qui a poco, nell' assegnar, che farò, la causa costituente la fertilità.

48. Avuto l' indizio dal colore, si può aver quell' altro dell' odore, indicante anch' esso la probità, o pravità del terreno; e per averlo più sensibile, ed anche per non lasciarsi ingannare, come accade tal volta, dall' esteriore apparenza del colore suddetto, che può esser buo-

buono nella sola superficie di un terreno intrinsecamente cattivo; perciò consulta il Vanierio, che si scavi in quel suolo una profonda buca, dalla quale, e dalla terra di fresco cavata escirà più forte, e più sensibile esalazione; la qual, se riuscirà grata all'odorato, s'abbia sicuramente per buona quella terra; ma se ingrato, e grave odor n' esalerà, s'abbia per rea, da ripudiarsi, perchè tal terra con quel suo alito corrotto le piante, e le frutta sicuramente ammorberrà; appunto come una nutrice morbosa trasmette ne' teneri allievi col latte infetto la medesima sua infezione.

Sed ne prima soli facies imponat, ab alto

Eruc: nam veluti, quibus est obnoxia, morbos

Egra parens cum lacte suis transmittit alumnis;

Sic humus ingratos non nunquam expirat odores

Quos referunt tristi fruges, Et poma sapore. L. 1, pag. 6.

49. Conferma il P. Ferrari colla sua autorità il buon indizio, ch' egli è, della probità della terra il buon odore; e per saper distinguere il buono dal cattivo, ne piglia da Plinio il contrassegno, dicendo *L. 1, c. 6. 2*. Che la buona terra all'odore sarà soave. Cotale odore, essendo come un alito amico, e sociale di quelle prime qualità, che concorrono ad un'ottima complessione de' corpi, sarà indizio d' un'ottima temperatura nella terra. Laonde a Marco Tullio *L. 3 de Orat.* Uomo avveduto non meno, che eloquente, erano via più grati gli unguenti, che sapeffero di terra, che di Zafferano. Quest' oracolo ci viene come raddoppiato da Plinio *L. 17, c. 3*, che afferma, la terra molto bene potersi conoscere dall' odore. Or a chi ricercasse, qual sia quest' odore nella terra, a cui, com' egli dice, niun' altra soavità può paragonarsi, risponde, esser simile a quello, che recar suole un' antica selva, qualor si taglia, e diceppa, per ridurla a lavoreccio.

50. Dal grato sapore cavasi medesimamente la bon-

tà del terreno , sciogliendone un poco nell' acqua , ed assaggiando l' acqua, dopochè sarà precipitata la parte ponderosa , e sarà l'acqua schiarita ; potrà tenersi per vera, e buona quella terra , che avrà del dolce ; ma sarà reprobata , se avrà dell' amaro , del falso , dell' acido , del sulfureo , o di altro sapor greve , e disgustoso .

*Salsa autem tellus , Et quæ perhibetur amara ,
Frugibus infelix . . . Virg. Georg. 2.*

2. Sarà buona , torna a dire il Ferrari , la terra , che al gusto ancora avrà del dolce , se ne farai paragone , togliendo da quella parte del campo , che ti dispiacerà ; e bagnandola con acqua in un vaso , la colerai a guisa di un vino feccioso . . . Una certa dolcezza languida , e fiacca è segnale di una grassezza debole . . . Laonde se la terra sarà mezzanamente dolce , sarà insieme con buona temperatura mezzanamente grassa . 2

51. Al tatto pure mostrasi la buona qualità della terra , s' ella è morbida , sciolta , sottile , viscosetta , è leggera di peso : ed al contrario non è da pregiarsi , quando sia ponderosa , tenace , grossolana , densa , e dura ; ciò che conferma così il Ferrarini . . . La buona terra si tocca molle , e lieve , mentre è asciutta : bagnata , se si maneggi , sarà alquanto viscosa . . . La mediocrità dell' umore cagiona nel terreno morbidezza , siccome ancora la moderata leggerezza è un effetto di calore temperato ; e la grassezza mediocre si conosce altresì da un poco di viscosità nel maneggiare . . . Se , a guisa di cera , viscoso riesca il terreno , nel maneggiarlo difficile , sarà nocivolissimo a' fiori ; attesochè quella cretosa tenacità non può agevolmente attrarsi dalla virtù nutritiva delle piante , e stringendole troppo , in un certo modo le strangola . 2 La pruova , che fassi della terra col tatto delle mani , più generalmente approvata , e consigliata da' più celebri maestri , Columella lib. 2 , C. 2 , p. 46. e Palladio L. 7 , tit. 5. *De qualitate terrarum* , dice

ce il P. d'Ardeue, che si fa così: piglisi nelle mani un pugno di terra leggermente umettata, e si stringa: s'ella se ne scappa da ogni banda per gl'interitiz delle dita, e tutta si fende, si slega, e si scompagina; ciò dinota, che sia secca, e magra; ma s'ella se ne resta continua, unita, e formata in un sol corpo, in virtù più tosto della natural sua propria uliginè, e grassèzza, che per effetto della straniera umidità; allora potremo star contenti di tal sorta di terra, che farà seconda.

52. Il detto fin'ora non solo è sufficiente, per sapere, qual sia il buon terreno per lo giardino de' fiori, ma pur sembra eccedente a riguardo di un tal giardino, da cui non si ricava poi altro frutto alla fin fine, che di mera delizia; però non sarà stimato eccessivo, e superfluo, se si riguarda il fine, al quale ho sempre avuta la mira in questa mia Opera; ed è, di dare istruzioni tale, coll'occasione della coltura de' fiori, che sia giovevole per ogni altro giardino, e per ogni altro uso in tutta l'Agricoltura. Chi non vede, quanto importi la scelta di un buon terreno, prima di metterlo in esercizio? Qua vuole Plinio *L. 17, Hist. c. 2*, che sia diretta tutta la nostra vigilanza, a saper conoscere del suolo, e dell'aere la natura, e le qualità: *Ad soli naturam, loci ingenium, & Celi cujusque mores, dirigendam solertiam*: perchè, soggiung' egli acutamente, nella Natura consiste la massima parte della coltura: *In Natura enim colendi maxima portio est*. Quindi essendo cosa importantissima la scelta di un buon fondo di terra, non contento de' segnali già dati, ne aggiungo altri due, che hanno alquanto del filosofico, e fan conoscer del terreno più intrinsecamente la buona, o rea qualità, per meglio assicurarcene.

53. Sono ambidue proposti dal Ferrari pag. 77, tratti da grandi Autori, e l'primo da Columella *L. 2, c. 2*, e da Palladio *L. 1, tit. 5*, e vien da lui esposto così:
 2 Per un antico ammaestramento potrai far paragone di que-

questa mediocrità di terreno in tal maniera. Cava una fossa; indi riempila con la terra istessa, che ne traesti. Se ven' avanza, sarà terra grassa; come quella che dal calore, ed umidità dell' aere, quasi lievitata, si gonfia: all' incontro se nè manca, sarà magra, venendo come calcata dal peso della freddezza, e della siccità; se uguaglia sarà mediocre, uguagliandosi le qualità estreme, siccome di temperatura, così di sito. Non ne ho fatto io sperimento, ma credo bene, che debba così succedere, non solo per la fede, che si può prestare a' citati Autori, ma pur per la ragionevolezza: perciocchè una terra uliginosa contiene insieme raccolti, e sali, e olio, e zolfo, e nitro, i quali formando una materia porosa, toll' aria, che fra lor s' insinua, possono agevolmente eccitarsi all' urto scambievole, e alla fermentazione, la qual porta in seguito la dilatazione, e della terra il gonfiamento. Ma se la terra non contiene di tal sostanza fermentante, non sarà, che sola, e soda arena, o mera terra asciutta, e secca, inabile a fermentare.

§ 4. Questo sperimento è lodevole ancora, perchè con un sol fosso, che si scavi, si fanno in uno tre sperimenti, cioè l' ora detto della maggior espansione, che acquista la terra, s' ella è pingue; il sopra diviso del grato odore, che manda; ed un altro importantissimo, proposto dal P. Rapini. Ognuno sa, e vedè nelle scoscese, e spaccature de' monti, che tutto il globo della Terra vien composto di varj strati, o fuoli di generi diversi, l' uno sovrapposto all' altro, e fra di lor paralleli: or è frequente il caso, che la superficie d' un campo sia coperta d' uno strato leggiere di buona terra, ma poi sotto di quella stia nascosto il vizio, cioè qualche strato di tuffo, d' argilla, di ghiaja, o d' altra sorta perniziosa; e però il Rapini vuol, che 'l padrone si pazienti, a fare scavar più buche profonde in diversi luoghi, acciocchè non lo inganni la buona apparenza super-

fiziale , come più volte è accaduto .

Ne pigeat scrobibus fundum explorare sub altis :

Quosdam saepe soli facies externa fefellit ;

Intus enim vitium viridis sub gramine gleba

Aut topbas scaber, aut urens argilla latebat. L. 1, pag. 2.

55. Il secondo segnale , o sperimento vien tratto dal libro d' Agricoltura , scritto dal' Imperador Costantino Pogonato *lib. 12 , c. 3 . 3* Potrai , dice il P. Ferrari, finalmente farne un' altro paragone con l' acqua . Il terreno infuso nell' acqua chiara , se in molto fango si risolverà , darà segno di buona natura , confacevole agl' erti : se in molta acquosità , lo mestrerà infecondo . 2 Ed è ben chiara la ragione ; perchè l' acqua scioglie l' uligine , che contiene la terra pingue ; e l' uligine , da se crassa , e viscosa , rende quella terra simile a fango , e fa quell' acqua parimente crassa , e viscosa ; ma quando non vi ha uligine da risolvere , la mescolanza si riduce in mera terra sabbiosa , ed in semplice acquosità . Questo medesimo sperimento più oltre , in maniera più filosofica , e propriamente chimica , continuato , ci farà scoprir meglio assai la qualità intrinseca della Terra , e potrà praticarsi nella guisa appunto , che farò già per riferire nel seguente Capo .



C A P O V.

In che consista, ed onde provenga la fertilità della terra.

56. **E'** qui luogo proprio, per trattar la quistione intorno alla causa fisica della fertilità; in che mai ella consista è Quistione utilissima per lo regolamento degli Agricoltori, e per lo bisogno, che ho, di rischiarar meglio, e via più confermare le cose già dette, ed altre da dirsi. Ma per ciò fare con maggior sicurezza, d'accertare il vero, tolgo per guida il Signor Giovanni Adam Kulbel, il qual modernamente ha trattata con molta lode questa materia in una brieve Dissertazione sulla causa della fertilità, per la quale con giusto merito riportò il premio della sua erudita Accademia: *Dissertatio: Quenam sit causa fertilitatis terrarum? Quæstio ab Academia scientiarum Burdegali-francica, 1739. proposita, eaque premium nummi aurci constitutum obtinuit D. Johannes Adam Kulbel Medicus Regius.*

57. Egli assume a provar, che la fertilità della terra consista in certa porzion di sostanza terrea, sottile, e solubile dall' acqua; e che tal sostanza sia il proprio alimento, onde si nutrisce la pianta, ed onde se ne forma la massa del suo corpo; e che però quel terreno sia più fertile, che di questa una maggior copia contiene, e quello sia più sterile, che n' è affatto senza, o che più ne scarfeggia, ciò che pruova egli col seguente sperimento. Pigliò terra notoriamente feconda da per se senza soccorfo di concime, o d' altro ajuto, ma pingue di sua natura; ed infusala in vaso d' acqua calda, quivi la sciolse, e lavò, come per farne lisciva. L' acqua ne venne di color bruno scarico, e la feltrò per carta straccia:

cià: tornò con acqua calda a far ranno più volte colla medesima terra, finchè l'acqua ne uscì limpida, e la terra, mancata di mole, ne restò arenosa. Tutta quest'acqua fu posta in vasi di vetro sopra un fuoco leggiero, a farla svaporar lentamente, finchè fu ridotta ad una libbra. L'estratto così ristretto, e concentrato, si ridusse a color bruno chiuso, e lasciò in fondo del Recipiente, ed ai lati molta terra sottile, e fortemente attaccata nella volta del vaso; e la superficie del liquore si vide coperta di un sottil velo, qual suol formarsi nelle liscive saline dopo la loro evaporazione. Se poi questo fluido concentrato vadasi dolcemente via più svaporando, sino a seccarlo tutto; ne rimane il magma, cioè la posatura untuosa, e salina, come una specie di loto a color bruno rubicondo. Il medesimo sedimento, se una altra volta sia scolto in acqua, e feltrata l'acqua, si lasci svaporare a fuoco lento, acquista la trasparenza, e piglia un color più grato, ne più depona alcuna porzione di terra, quantunque volte si torni a sciorre, e svaporare.

§ 8. Le medesime operazioni fec' egli sopr' altre varie terre, differenti nel grado della fertilità, e trovava sempre, che quanto era più fertile la terra, tanto era maggiore la quantità della suddetta terrea sottil sostanza, che col ranno dell'acqua calda sen' estraeva: ma le terre fangose, cretacee, arenose, o in altra guisa sterili, a mala pena davano un pochino di tal sostanza, e solea riuscire di leggier peso il magma, che ne rimanea dopo tutta l'evaporazione. Ecco dunque onde cava egli con tutto senno, che la fertilità della terra consista nella divisa porzion terrea, sottile, e solubile, e che dessa ne sia la vera origine. Poichè per un parte è manifesto, che 'l sedimento arenoso, il qual resta dopo fatto il ranno, non può esso da sé passare in alimento, nè si può trasmutare in sostanza della pianta,

come corpo duro, fisso, insolubile, e grossolano: dall' altra parte abbiain la sostanza sottile, solubile, e pastosa, la qual si segrega, e s'incorpora coll' acqua del ran- no; e questa sola è alterabile, e sola si può trasmutare in materia, da formarne il corpo della pianta: per terzo di più osserviam, che la terra, più fertile, che sia, più abbonda di tal sostanza; e l' infecunda poco, o niente ne contiene, e la sua quantità suol corrispondere al grado della fecondità: dunque forz' è conceder, che questa sia la sostanza, la qual secondo rende il terreno, e sia dessa la vera causa fisica della sua fertilità.

59. Ma non cessò egli qui dalle sue lodevoli ricerche, e tirando avanti portò sino al fine l'analisi cominciata. Continua egli a riferir, che quell' estratto del ran- no già concentrato, se in una storta di vetro sia posto a distillare, sen' estrae prima la flemma, la qual conserva un leggiere sapor, e odor di terra, e levata la flemma resta inspessato. Quindi aumentando il fuoco, n' esce un liquore gialliccio di odor empireumatico, o sia igneo, sulfureo, e puzzolente: il fuoco però deve ben moderarsi, aumentandolo a piccioli gradi; altrimenti l'estratto, che immediatamente bolle, sollevasi alla sommità della storta, e sen' esce dal lambicco sotto forma di vischio untuoso, e fosco: ove però sarà finito di bollire, si può il fuoco aumentar, sino a roventar la storta; ed allora dopo la total distillazione resta nel fondo una terra leggiera, spugnosa, e biancheggiante, la qual liscivata con acqua, ed evaporata, lascia una porzioncella di sale fisso, il qual' è medio, come dicono, ovvero neutro di sua natura; perchè non fermenta nè cogli acidi, nè cogli alcalici, ma pure talvolta ha qualche poco di alcalico: suol esser questo sale la quinta, o sesta parte della massa terrea, testè menzionata.

60. Di qua egli inferisce, che nel sugo nutritivo delle piante, oltre l' alimento dell' acqua, s'invia cinque

que, o sei parti di terra sottile, untuosa, ed una parte di sale; però questa proporzione di uno a cinque, o sei, trovasi alquanto varia nelle differenti terre, ma sempre la parte salina dalla terrea vien superata. Le terre magre, e sterili non solamente contengono una parte di sale molto minore, ma pure il sale medesimo vi si trova diverso, e più acido di natura. Nelle diverse terre diversa parimente trovava egli la qualità del sale; poichè in alcune era della natura del nitro, in altre del sale medio, ed in certune avea dell' alcalino: ma di qualunque condizione si fosse stato, sempre osservò in quel sale qualche mistura di sal comune, il qual mai non mancava, e potea riconoscerlo col Microscopio dalla costante figura, che pigliano le sue particelle, tutte formate in piccoli cubi, o siano dadi, esattamente regolari, e per ciò distinguonfi dagli altri sali, che in altre maravigliose figure, ma pur differenti, conformansi.

61. Terminata così l'Analisi della terra sino alla risoluzione di quella ne' primi suoi principj Chimici, died' egli mano a far la simile Analisi colle stesse operazioni filosofiche sopra i vegetabili, per esaminar se il corpo della pianta in quelle medesime sostanze si risolvesse, onde composto la prima Analisi lo mostrava: il perchè macerava egli, e coceva l'erbe in acqua calda, e di quell'acqua, in cui restava sciolta la sostanza dell'erba ne formava l'estratto, il qual riusciva bruno, e simile al già riferito, qual cavato lo avea dalla terra; ed inspessato parimente colla evaporazione, lasciava il simile magma, lubrico, e solubile dall'acqua, e finalmente colla calcinazione dava il sale medesimo, e la stessa terra spugnosa, e leggiera senza notabile differenza dalla soprammenzionata; cosicchè veniva egli a ricavar, che questa era quella medesima terrea solubil sostanza, la qual dal terreno passata era nel corpo della pianta, e da quella pigliava il terreno la sua fertilità.

Quin-

62. Quindi cava per corollario la giusta maniera, come può darfi ajuto con arte ad un suolo sterile, a cui manca la suddetta parte di terra sottile, e solubile, con dargliela di tempo in tempo, soprammettendo in quel terreno delle materie, atte a corrompersi, ed a ridursi in terra sottile, e solubile; come appunto fa il concime, il qual per questa ragione riesce tanto proficuo, a fecondare il terreno, giusta la comune pratica, e sperienza. Di qua pure ha origine la celebre fecondità, che porta seco il Nilo, ne' vasti campi d'Egitto, quando largamente gl'inonda; perchè porta seco le grasse scolature degli sterminati paesi, per onde scorre, ed i campi, che allaga, del pingue sedimento lascia coperti: e però noi abbiain data la preferenza alle acque, per adacquare, di stagno, di fiume, e di cisterna; perchè in quelle cadon dall'aria, e concorron dal terreno molte spazzature di foglie, e di più altre quisquillie, le quali macerate nell'acqua, vi si distruggono, e l'acqua di lor sostanza resta impregnata. Di qua per ultimo cava il lodato Autore la necessità, che abbiamo, di fare star a riposo per qualche anno quel terreno, che ha molto faticato; perchè si truova sfruttato, ed esauito di quella terrea sottil materia, onde son nate le passate sue copiose produzioni: ma se lasciata a riposo, viene a ricuperar la materia consunta colla putrefazione delle radici, e dell'erbe quivi restate, e di tutte quelle altre, che nell'anno del riposo avrà prodotte.

63. Ma pare a me, che quest'ultimo suo corollario patisca una forte difficoltà, ad evitar la quale, uopo è chiamare altronde in ajuto altra nuova materia secondatrice, oltre di quella poca, che l'erbe, e le radici distinte potranno mai somministrare. Ne' nostri campi di Palermo, i quali non son da se soli altro, che mezzaramente fecondi, seminiamo il frumento coll'alternativa, come dicono, di un anno di pieno, ed un anno di

vacante; e per lo caro prezzo, a cui si vendon le paglie, la mietitura si fa con mano bassa, radente il suolo, di modo che pochissima è la stoppia, che vi rimane, e questa medesima fin quasi alle radici, e sino all'ultimo fusto si dà per pascolo al bestiame, senz'altro restarvi, che poca minutaglia. Quindi si lascia il campo a riposo, e da' semi caduti, e dalle radici, che vi si conservano, senz'altro ajuto di letame, da se sola nasce l'erba salvatica con tale abbondanza, e vi cresce così folta, alta, e robusta, che lascia in dubbio, se la massa, e la quantità delle produzioni spontanee nell'anno di riposo ugguagli, o anche superi, quella delle biade nello scorso anno della coltura. Quest'erba medesima si miete parimente con mano bassa, quasi a livello del suolo, e la seccia, o stoppia residua serve un'altra volta di pascolo, come si è detto, e pochissimo è quel, che ne rimane per infracidarvisi, e per servir di materiale alla fabbrica delle novelle biade, le quali tornano a produrvisi bell, e buone, come per lo innanti; e così pure a vicenda l'erbe salvatiche ogni anno, e sempre vi si riproducono. Or se tanta gran quantità di materie vegetabili levansi da quel terreno, e tanto poca ve ne rimane; questa non è per certo materia sufficiente, per dar corpo, e sussistenza a tutta la gran massa delle piante, che vi rinascono: il perchè bisogna ricorrere ad altre fonti, che somministrino altra materia, e la somministrata sia la massima parte; poichè la residua della stoppia, e delle radici, che vi si corrompono, non può esser, che la sua minor porzione.

64. Adunque la detta terrea sottil sostanza, che vien dalla distruzione de' vegetabili, non è causa adeguata della fertilità, ma bensì parziale; perchè uopo ha dell'ajuto d'altre cagioni, le quali vadano di continuo altra nuova sostanza producendo, e somministrando; ciò, che pruovasi, non meno evidentemente con altro argomen-

to, apportato dal medesimo Sig. Kulbel, il qual perciò chiama in soccorso l'aria, e 'l concime. Confessa egli, che tal sostanza estratta dalla terra, non abbia in se verun principio d'inflammagione; ma pur le piante tutte sono infiammabili, e la maggior parte del lor corpo si risolve in fumo, e fuoco; dunque le piante nutrisconsi, e son composte nella maggior parte della lor massa d'altro nutrimento, il quale abbia l'inflammabilità, e la sola porzione, che risolvesi in cenere, e che non può infiammarsi, dev' ella esser al più quella parte terrea, e sottil, che 'l terreno da se potè contribuire; ma tutto il rimanente deve aver sua origine da tutt' altra fonte, come già qualch' una l' istesso Autore spontaneamente ne suggerisce. Cost, dic' egli, il Pino, l' Abete, e cento altre piante; nascon volentieri in luoghi aridi, ed arenosi; eppur contengono una enorme quantità d'olio, e di resina, insignemente infiammabili; e però uopo è, asserir, che la parte incendevole attraggano dall' aria, e l' acquistino insieme dal concime, e dalle quisquillie dell' erbe, che vi si putrefanno. Ma quella terrea sottil materia, che uffizio fa? Ella è, soggiugne, un principio assorbente, il qual serve per tirare a se, ed assorbir le particelle infiammabili, e così poi queste con quella terrea sostanza unite insieme formano il sugo, che serve alla pianta di nutrimento.

65. Ma resta pure un'altra obiezione, la quale par, che levì alla terra quella parte medesima di concorso, ch' ella contribuisce alla produzion delle piante, come provano gli argomenti già prima fatti. L' istesso Kulbel oppone a se prima uno sperimento d'Elmonzio, il quale calcinò buona quantità di terra, e nella terra calcinata piantò alcuni rami di Salcio, ed i rami con solamente adacquareli, vi si abbarbicarono, e prosperamente vi crebbero. Che sostanza mai poteva dare al Salcio la terra già calcinata, nella quale quanto ritrovavasi di

materia solubile, tutto dovea essere stato consunto, e portato via dalla violenza del fuoco, eccetto il mero sale, che resta, dopo la calcinazione? Oppone a se in secondo luogo certi bulbi di fiori, e certe piante, le quali tenute in vaso d'acqua semplice, vi crescono, e vi fioriscono; e però è da creder, che ancora mentre son nel terreno, non piglino da quello alcuna terrea sostanza, ma si alimentino di sola acqua.

66. Però egli risponde primo, che questi sperimenti succedon solamente con alcune piante particolari, le quali son di sostanza spugnosa, e sugosa, che molto si confanno coll'umidità: secondo, l'incremento di tali piante non suol esser troppo grande: terzo, i bulbi, co' quali succede la speranza, contengon assai di polpa, e di midollo; poichè tutto il corpo delle cipolle non è altro, che una massa di materia uliginosa, la qual può benissimo nutrir la pianta: quarto, tali piante, nutrite con sola acqua, nè arrivano a quel grado di perfezione, al qual pervengon piantate nella terra, nè son di sì lunga durata, e la madre senza lasciar prole vi suol perire: finalmente nell'acqua contengonsi ancora alcune sottilissime particole di sostanza terrea, le quali sempre trovansi sciolte in quella; come comprovasi, facendo svaporare a fuoco lento l'acqua limpida, e pura, la quale in fine lascia sempre qualche terrea posatura. Tali sono i sentimenti di questo Autore; ma per la total risoluzione del proposto quesito, aggiungo il seguente Capo.



C A P O VI.

*Risolvesi la quistione sulla fertilità
della terra.*

67. **S**E alcuno qui cercherà il mio sentimento, io porto la medesima opinione, che la terra contribuisca alla nutrizion delle piante qualche cosa del suo; ma spiego, e limito i sensi del Sig. Kulbel così. Primieramente cotal porzione debb' ella esser ben poca, come provano gli addotti argomenti, e può confermarsi questo medesimo con un volgare sperimento. Saranno già dieci, o venti anni, che voi tenuto avete in un testo, e sempre nella medesima terra, un vostro caro alberetto; ed esso non cessa mai ogn' anno di rinovar le foglie, ed i fiori, e grato della coltura, che gli date, vi rende il frutto. Così pure avrete voi nel vostro testo seminate per più anni dell' erbe, e delle piante, le quali ogn' anno crescon alte, fronzute, e folte tanto, che la massa di tutto il lor corpo, di radici, tronco, rami, foglie &c. sarà presso a poco la vigesima parte di tutta la massa della terra, nel vaso contenuta; cosicchè se tutta cotal sostanza escita fosse dalle viscere di quella terra, avrebb' essa dovuto quasi tutta, o in gran parte mancare; oppure se di là escita ne fosse qualche piccola porzione, che sia sensibile, dopo il corso d' anni dieci, o venti dovrebbe già poi vederfi la terra del testo notoriamente diminuita: ma pur dopo tante rinovate produzioni la terra conservasi a un di presso del medesimo peso, e quantità, se sol detraggasi quella parte, che l' acqua, il vento, e l' incuria ne avrà dispersa. Una Quercia nello stato di sua perfezione, vale a dire, nell' età di cent' anni, a calcolo fatto, avrà tirato dal terreno, ed in sua
so.

sostanza convertito in nutrimento da cin ue cento v n-
tiquattro mille libbre; ma un vecchio centenaro, che
la fa nascente, potrà testificar, che la terra, ove sta
piantata, persiste ora dopo cent'anni tal, qual era, qua-
si senza verun notabile mancamento: il calcolo di sì
gran massa è stato fatto dal Signor Bradley della Soc.
Reg. di Londra, presso il P. Regnault *Tom. 3. Trattati. 1.*

68. Però una sperienza più netta è quella di Elmon-
zio, la quale par, che sia la stessa ora riferita da Kul-
bel; ma egli tace alcune circostanze, onde piglia mag-
gior forza l'obiezione; il perchè la riferisco qui, co-
me la descrive il medesimo P. Regnault con tutta la ri-
sposta, che soggiugne questo savio Filosofo, per solver-
la. *Tom. 3. Trattati. 1. pag. 13.*

2. Aritto. Secondo la celebre sperienza di Vanelmon-
zio sembra, che le piante d'acqua sola nutriscansi. Egli
prese dugento libbre di terra seccata al forno, ed avendola
bagnata con l'acqua di pioggia, vi piantò un Salce,
che pesava cinque libbre. Pose e' questa terra in un va-
so, che rinferavala da tutte le parti, e che avea de'
piccoli fori al di sopra, acciò potesse la terra aver dell'
aria, e restar bagnata in tempo di pioggia. In capo a
cinque anni pesava il salce 155 libbre, e la terra, do-
po essere stata novellamente seccata al forno, pesava an-
cora dugento libbre, meno due oncie. Non è egli evi-
dente, che l'acqua sola avea nudrita la pianta?

Eudosso. Signor no: perocchè è egli per primo evi-
dente, che la terra, dopo essere stata posta nel forno,
si trovasse la seconda volta secca, quanto la prima?

Secondo, l'acqua piovana delle parti terrestri con
seco porta; poichè fa della deposizione in fondo a ri-
serbatoi: terzo, la polvere, ed i sali differenti, che l'aria
trasporta, poteano per i piccoli buchi passar con l'aria
nel vaso: quest'esperienza adunque non dimostra, che
l'acqua sola nodrisca le piante. Il letame renderebbe così

seconde le terre, se non somministrasse loro dei sughi? 2

69. Ma la prima risposta del P. Regnault non si può ammetter per buona; perchè la presunzione sta a favor d' Elmonzio, il qual per accertarsi dell' esito del suo sperimento, dovette aver l' accortezza di seccare, come prima, egualmente la terra al calor del forno, o del Sole almeno, nè si ha motivo di aver sospetta la sua attenzione. Così pure le altre due ragioni del P. Regnault colla lor ultima conferma son da se ottime, ma non fanno al caso nostro; perchè qui noi cerchiamo, se la nostra terra, da se sola, alcuna porzione di sua propria sostanza alle piante contribuisca; ovvero se niente dia del suo, e tutto il nutrimento, che dà, le venga altronde, o dall' acqua, ch' era la seconda risposta, o dall' aere, ch' era la terza, o dal letame, o dal Sole, o da simili altre cagioni estrinseche somministrato?

70. Per conciliar qui d'unque senza contradizione le ragioni dell' una banda, che fan la terra da se sola feconda, e le ragioni dell' altra, che fan la terra spogliata d' ogni sostanza nutritiva; dico, che poca è quella porzione di nutrimento, che la terra da se sola contribuisce; ciò, che conciliassi pure collo sperimento di Elmonzio, in cui la terra fu trovata meno due oncie delle libbre dugento; e si concilia egualmente coll' altra pruova de' bulbi, e di alcune altr' erbe acquatiche, o partiali dell' umido, le quali, benchè tenute, e nutrite in un vaso di sola acqua, pure vi crescono, e vi fioriscono; giacchè per la pruova, che anch' io ne ho fatta, riescon le piante così nutrite molto più fiacche delle lor pari, nutrite in sul terreno: con ciò mostrano chiaramente, che lor manchi quella porzion di sostanza più sorda, che se vien dalla terra, e le fa più corpulente. Che poi sia piccola la quantità della predetta materia terrea, lo provano i medesimi sperimenti, e l' analisi fatta dal Signor Kulbel; poichè sfumato, e sec-

cato già tutto l'estratto, che cavassi dal ranno della terra, o da quello delle piante, il residuo riducesi a pochissima mole: ed è pur da levarsi da questa mole quella buona dose, altronde, (come si è accennato, e sarà meglio per dirsi,) dall'acqua, dall'aria, dal Sole &c. nella terra, e nelle piante ingenerata, e introdotta.

71. Ma ecco di nuovo torna molestà l'obiezione per questa medesima piccola quantità. Per piccola, ch'ella sia, dopo innumerevoli produzioni, che sono uscite dal seno della terra dalla Creazione: fin' ora, dovrebbe al di d'oggi tutta trovarsi confusa quella terra sottil, e solubil sostanza, che l'Creatore frammescolò colla parte arenosa nella superficie del terreno: dico nella superficie, perchè questa sola noi coltiviamo, e questa sola par, che possa dare alimento alle piante sino a certa piccola profondità di pochi piedi, cioè fin là, ove penetran le radici.

72. Mi è purata così gagliarda la presente difficoltà, che sono stato in forse, d'abbandonar la divisata opinione, asserendo più tosto, che la terra niente dia del suo, ma sia un mero fondo, una semplice matrice, atta unicamente, ad accogliere in seno i semi delle piante, e ad assorbire, conservare, e digerire l'alimento, che tutto altronde da' fonti estrinseche le vien di continuo partecipato. Con tutto ciò, aderendo più tosto al comune senso, il quale attribuisce alla terra virtù sua propria di dare alimento ai vegetabili, persisto nella medesima opinione; e rispondendo alla noiosa obiezione, sostengo, che Iddio nel crear la terra, non solamente nella superficie, ma in tutta la sua gran mole, dal centro sino alla circonferenza frammescolò abbondantemente di quella tal sorte di terrea sottil materia, che atta fosse a nutrir le piante; e di più talmente ordinò le cause seconde, e l'interna struttura della stessa terra, che dalle sue intime viscere andar dovesse pian piano,

E CON-

e continuamente esalando per via di tenuissimo effluvio la detta sottil materia; ed essendo la superficie della terra arida di sua natura, bibula, sugante, e dotata di virtù attracente, come una spugna, s'inzuppa ella facilmente di quel sugo più crasso, che vien sù esalando da' luoghi sotterranei, e l' più tenue, che cogli aliti vola in alto, ricade poi fatto più denso, e più pesante, o da se solo, o stemperato in un colla rugiada, colla neve, e colla pioggia. Da questa perenne sorgente può benissimo venir tutta col tempo rimpiazzata quella porzion di sostanza, che nella superficie della terra coll' alimento, dato alle piante, si era di già consumata; ed in tal guisa il terreno già struttato dalle copiose produzioni, rinfrancasi col riposo di qualche anno, e ricupera la primiera sua fertilità.

73. Non mi fermo qui, a provar la continua evaporazione, che vien sù incessantemente dalla terra, come cosa da tutti ammessi; e se non mi sviderci pur troppo dal mio sentiero, avrei pure, come provar da buone congetture, che salgano esalazioni alla superficie della terra fin dalle sue viscere più profonde. Basterà, che qui ponghiamo, almeno come mera ipotesi, che tutto il globo Terraqueo sia minato, e penetrato fors' anche da banda a banda dal fuoco sotterraneo; come ne hanno dato indizio certi gran tremuoti, propagati all'istess' ora in regioni lontanissime da una parte di Mondo all' altra; de' quali certamente è cagione originaria, come primo mobile il fuoco. Così nell'anno 16 di Giustino Imperadore tremò quasi tutto l' Orbe della Terra, come riferisce Cedreno, rapportato dal Bottari Lez. 2, ed il medesimo avvenne nel anno 27 del medesimo Imperadore. Il Terremoto del Perù l' anno 1601 si stese per 300 lege di Longitudine, e 70 di Latitudine, al riferir di Fourgnier Hydrogr. lib. 5. Fromondo lib. 4. Meteor. asserisce, che una volta fu scossa tutta l' Asia, e
qua

quasi tutta l'Europa. Del tremuoto finalmente di questi ultimi tempi, che diroccò Lisbona, fu detto, che all'istess' ora siasi sentito per tutta quella parte d'Africa estrema fino all'America; ciò, che non può succeder senza l'azione del fuoco, ond'è l'Orbe sparso per tutto, e profondamente minato.

74. Ammessa cotesta Ipotesi, o più tosto Tesi, dico, che tra i fini più ragionevoli, che potè avere il providissimo Creatore, per voler sotterra tante mine di fuoco, potè avere ancor questo, grandemente importante, e forse anche il più principale, cioè che tutto quel fuoco aggirandosi per ogni verso, e penetrando fin nell'intimo della gran mole, tutta la riscaldasse, e colla sua agitazione la parte più tenue, e sugosa ne staccasse, e seco in alito attenuata la portasse alla superficie della terra, per fecondarla. Egli è certo, che ove son Vulcani, e fuochi sotterranei, ivi è più insigne la fecondità de' terreni: così è nella campagna di Napoli intorno al Vesuvio, così nell'Isola di Lipari vicino a Vulcano, così nella nostra Sicilia, e con ispezialità ne' paesi intorno a Mongibello, fertilissimi, così nell'America ne' regni del Quito, e del Perù, ove son molti, e vastissimi monti, che mandan fiamme, e così in altre tali regioni, insigne-mente ubertose.

75. Ma oghun vede, che l' detto alito, come tenuissimo, qual debb' essere, non può formar, che una massa molto piccola, ancorchè di continuo dentro il lungo giro d'un anno, o di più anni vadasi accumulando: e però sebbene resti conchiuso con molta probabilità, che la terra contribuisca il suo contingente alla nudritura de' vegetanti; con tutto ciò non si può dire altro, che piccola parte vi contribuisca del suo, la qual può ragionevolmente presumersi; che sia la sola parte terrea, che non è, almeno tutta, infiammabile, come non lo è la

è la stessa terra, per l'ugualità di natura, che ne conferma la presunzione.

76. Questo qui dunque è 'l primo titolo, onde la terra può dirsi fertile di sua natura: ma pur ella può esser più, o meno fertile per un secondo titolo, cioè per quella natural virtù, che risiede in essa, ora maggiore, ora minore, di tirare a se, trattenerne, e preparare, non solamente quell' alito, che le vien di sotterra, ma pur quell' altra parte d' alimento infiammabile, che 'l concorso delle altre cause le somministra: e però quella terra sarà da se più fertile, che sarà più bibula, per assorbir tutto, quant' è, l' alimento, più tenace a trattenerlo, e meglio disposta per cuocerlo, e digerirlo. Tal' è appunto la terra, in cui trovansi le tre doti, da noi prescritte, cioè la sottile, sciolta, e mediocrementemente grassa; dacchè l' esser sottile, e sciolta, la rende bibula, l' esser sottile, e mediocrementemente grassa, la fa mezzanamente tenace, e l' esser bibula, sciolta, e mediocrementemente grassa, la tien disposta ad una moderata fermentazione, colla qual si cuoce, assottiglia, e digerisce il sugo nutritore, per andare alla pianta ben preparato.

77. Determinata la prima causa interna della fertilità, consistente in una materia terrea, sottile, solubile, ed assorbente, la quale almeno in qualche sua parte non è infiammabile; rimane a parlar delle cagioni esterne, che forniscono, come si è detto, la massima parte dell' alimento; e son esse l' acqua, l' aria, il Sole, ed il letame con tutte quelle materie, che stan soggette alla putrefazione. Di queste ultime sen' è parlato già sopra, e non è da dubitar, che tutta, quant' è, la lor massa può ben servire di nuovo pabolo, per formarsene altre tante piante, quant' eran le già distrutte; e però se niente di queste materie putrefatte si dis-

per-

perdesse, e tutte un'altra volta tornassero a ricadere in sulla superficie del terreno, non sarebbe necessaria altra sorgente, che nuovo pabolo somministrasse, almeno di tal genere, per supplire al già disperso. Ma non è da dubitar, che se ne perda qualche considerabile porzione. E primieramente quel, che sciolto in vapore, se ne va in aria, non tutto ricade in sul terreno, ma pur ne cade in Mare, ed al Mare altresì ne va quell'altra parte, che le piogge, ed i fiumi dilavano dalla superficie della terra. Or questa, che non è piccola parte, può ben servire di nutrimento alle piante marine, ed ai pesci, ma per noi si ha quasi per affatto perduta; seppur non si voglia dire, ciò, che ha qualche faccia di probabilità, che può sollevarsi in aria la parte almeno più tenue, insieme co' vapori, che s'escaltan dal Mare, e con essi può quella di poi ricadere in pioggia.

78. Di più un'altra considerabil porzione, o che rimanga in terra, o che vada in Mare, si addensa in corpi cotanto duri, che appena più sciolgonfi nella lor primigenia, fortile, solubil materia, onde furon già fatti: così son per ordinario le ossa degli animali, così sono i gusci delle Lumache, e di tutt'i terrestri, o marini Testacei, o Crostacei, de' quali un immensa quantità dal principio del Mondo fin'ora sen'è formata. Formansi da quell'umor vischioso, che mandano, altri per sudore, altri per bava gli animali, che vi stanzian dentro, il qual umore trae certamente sua origine dalla sostanza nutritiva va de' vegetabili, di cui si pascolano; ma questa non torna quasi mai più a sciorirsi, dopo che una volta si fu legata. Trovansi in ogni paese interi, ed intatti i marini Testacei, ch'eransi generati dalla nascita del Mondo fino al Diluvio; e tanto eccessiva è la quantità, che sen'era formata nel detto tempo di circa 2242 anni, che tutta nel Diluvio se ne riempì la terra colla inondazion del

Mare, come ho provato in una digressione, inserita nel mio libretto: *Selecta Problemata ex prima Geometria practica parte 2^a. Panormi 1757.* I Testacei, o Crostacei suddetti non solamente veggonsi in sulla superficie della terra, ma se ne trovano interi, e frequenti strati fin nelle viscere de' monti, e nelle cave più profonde. Da sì gran quantità di Testacei diluviani può arguirsi l'immenso numero, che sen'è potuto accumular nel fondo del Mare dal Diluvio sin'ora nel corso di circa 4720 anni.

79. A sì gran copia di materia vegetabile, che si va indurando in gusci di crostacei, se aggiungasi quella molto più gran quantità, la qual si va coagulando, e fissando in pietre, arena, vetro, metalli, ed altri simili generi, che si van sempre di nuovo formando in tutto il globo Terracqueo, nè par, che si formi d'altro, fuorchè della medesima sostanza, di cui parliamo; viene giornalmente a consumarsi una sì gran massa di tal materia, che bisogna ammettere una perenne sorgente, che la generi di nuovo, e la vada di continuo, e copiosamente somministrando. Ma qual altra sorgente può darsi mai, così propria, e più abbondante, degli elementi dell'acqua, del fuoco, e dell'aria, de' quali si sa, che impastati insieme colla divisata terra, compongon tutt' i corpi sublunari? La parte terrea non infiammabile, che somministran le viscere della stessa terra, serve di assorbente di questi tre elementi, e come di matrice atta, a trattenerli, ed in questa matrice, combinati insieme i tre elementi, si dispongono a trasmutarvisi in materia infiammabile, ed a formarvisi in mille guise, in mille differenti fughì nutritivi di mille differenti piante.

80. Ora sì, che possiam noi capir molto meglio, e la forza, e la soluzione de' premessi argomenti, i quali provano, che la terra, o niente dava del suo, o se cosa contribuiva, dovea in breve rimaner vota, sterile

le, ed affatto inabile, a poter più partorire: ora intendiamo meglio, perchè tanto amino i terreni la ventilazione, per lo nutrimento, che piglian dall'aria; e di qua intenderemo la principal ragione, che daremo a suo luogo, per cui tanto giovino alla coltura de' campi l'aratro, e la zappa; perchè scavando, rivoltando, e sminuzzando la terra, ella si rende meglio pervia all'aria, ed al Sole, e l'una, e l'altro più profondamente la penetra. Così ora può intendersi, come l'acqua sia stata sempre il principale alimento di tutt' i vegetabili; perchè l'acqua non è solamente veicolo degli altri elementi, ma è pur come un latte, che si coagula, ed impasta col fermento delle particole dell'aria, e del fuoco, ed insieme con esse in solide particelle si fissa, e indura. L'acqua è quella, di cui formasi la massima parte della massa dell'alimento; poichè dell'alito terrestre abbiain detto, che, come tenuissimo, non può dar di sé gran copia, e le particelle dell'aria pur tenuissime, e le particole del fuoco immensamente più sottili, addensate, e ristrette in corpo solido, benchè in grandissimo numero unite insieme, appena mai far potranno un pochino di massa sensibile d'alimento; nè par, che servano ad altro l'aria, e 'l fuoco, che di coagulo all'acqua per fissarla in tegmenti, e solide massette nel corpo della pianta.

81. Ora finalmente s'intende, perchè le piante godan tanto del Sole, che se nol veggano, altre marciscono, altre non fruttano, e tutte quante prive del Sole qualche cosa sempre patiscono; perchè 'l Sole è la viva sorgente del fuoco; e fuoco sono i suoi raggi, cioè particole ignee, immensamente sottili, che 'l Sole, perenne fornace di vive fiamme, vibra da sé con incredibile velocità; come ho dimostrato nella prima mia Dissertazione. *De Lumine Solar.* 1754: nè altronde, che dal fuoco, e specialmente dal solare, trae sua origine l'infiammabilità de' vegeta-

bili; perchè impastati, come già sono, d'innunerevoli ignee particole, allorchè dalla violenza di un altro fuoco vien minutamente incisa, agitata, e sciolta la texture del vegetabile, e vien così scomessa l'unione scambievolmente de' quattro elementi, ne scappan fuora copiosissime colla lor nativa violenza elastica le ignee particole, che quivi come fra ceppi trovansi ristrette. E quindi ne deriva quella maggior fecondità, per cui al terreno fosco, e nero abbiain data sopra il bianco la preferenza; per la ragione asseguata, che 'l nero assorbe avidamente i raggi solari, e 'l bianco lor fa ostacolo, e lontano da se li ricaccia. Sembra già ora finalmente risolta la proposta quistione, in che consista la fertilità della terra, e quali ne sieno le sue vere cagioni? Siccome parmi, che siasi detto a bastanza per lo accerto di un ottimo sito, da scegliersi per lo nostro giardino; e però per compimento del presente soggetto men passo alla delineazione dello stesso giardino nel sito già eletto, la quale acciocchè riesca pur bene acconcia, ha bisogno della sua particolare istruzione.

C A P O VII.

Disegno, e delineazione del Giardino de' fiori.

32. **S**E non abbiassi la mira al fine, ed all' uso, a cui dee servire il giardino, da delinearsi, corre il rischio, che 'l perito Disegnatore, se sia affatto ignorante della professione di Fiorista, farà bensì il disegno di un bellissimo Perterra, ma poco a proposito, per piantarvi de' fiori, e niente comodo per coltivarli. S'ei non sia prevenuto da vostra istruzione, vi farà un disegno vaghissimo alla moderna, tirando per tutto il sito del giardino, o separatamente per ogni suo
quar-

quarto, una continuata ramificazione, la qual da un capo all'altro senza interruzione vada serpeggiando in fogliami, palmizj, verbene, e spire contorte, con cento vezzi, rabeschi, ed intrighi di meandri, e ravvolgimenti, i quali daranno bensì un bel vedere all'occhio, quando si tratti di un mero Perterra di Boffo, il quale appigli, e ricrei colla sola vista della sua grata, e disposta verzura. Ma questo, e simili disegni, sebbene sien più capaci di vaghezza, e riescano all'occhio sensibilmente più grati; pur non fanno per lo mestiere de' fiori, i quali avendo in se stessi il bello, ch'è il più brillante del mondo, par, che schivino certi ornamenti de' più squisiti, contenti sol de' più semplici, e de' meramente necessarij ad un decoroso accompagnamento: appunto come ad un bel volto, che da se solo rapisce gli sguardi, sta meglio la semplicità di pochi abbigliamenti, per farne solo spiccare la venustà, che la studiata conciatura, la qual più tosto l'oscurerebbe, e la mostrebbe stucchevolmente affettata.

83. Le suddette ramificazioni, e fogliami per la continuità, propria di un ramo, non ammetton le frequenti interruzioni, che son di bisogno al nostro intento; perchè non lascian libero il cammino, per girar da per tutto intorno intorno alle ajuole; anzi le ramificazioni neppur ammetton le medesime ajuole, ove s'hanno a piantare i fiori, senza rendere sconcio il disegno, o rare le ammettono, e così piccole, che sol di poche piante faran capaci.

84. Laonde ad avere un buon disegno, e proprio per giardino di fiori, dovranno darli al Disegnatore le seguenti avvertenze. Primo, dovrà il disegno consistere di mere ajuole, e strade di maniera tale, che ogni ajuola sia intorniata di strada: e questo è necessario, non solo per poter passeggiare, e girare intorno a ciascun ajuola, e godere d'uno in uno di tutt' i fiori, che vi
stam

stan dentro, ma per poterli comodamente coltivare. Secondo, le ajuole non sien così larghe, che dalla strada non si possa arrivar colla mano, a coltivar la piante, che stan nel centro; e questa medesima sarà le giusta misura delle ajuole più ampie, che un uomo, stando in ginocchio in sulla strada, steso il braccio con tutto il corpo, possa colla mano agevolmente toccare il mezzo, e il centro; la qual misura dal centro ai confini dell'ajuola non è più di circa quattro palmi Siciliani, e poco più di tre Parigini; ma sarà più comodo, che le più grandi ajuole da un canto all' altro non passino i sette palmi di larghezza, sebbene possano ingrandirsi, quanto si voglia, nella lunghezza. E' necessaria questa condizione, acciocchè non sia costretto il coltivatore, a metter piede dentro il ricinto dell'ajuola; perchè farebbe guasto alle piante, e ne calcherebbe il terreno, il qual deve restar sempre morbido, e tenero, come alle piante gentili si convien. Terzo, le strade sien competentemente larghe, per quanto lo permetta il sito.

85. Trattandosi di un orticello piccolo in ricinto assai limitato, i viottoli non potranno farsi meno di un palmo, e mezzo; ma pur a stento vi si potrà passare, senza far danno a' fiori, quando i rami saran cresciuti, e molto stesi nel tempo della fioritura. Così le vie principali, che son anche necessarie, sien capaci, da potervi passare ad un tempo stesso due persone, che vi s'incontrino, cioè, che richiede almeno la larghezza di tre palmi. Se però trattisi di un sito mediocrementemente capace, i viottoli facciano di due palmi almeno, ma meglio di tre, e le strade principali almeno di quattro palmi, o meglio quanto più larghe si potranno. Che se avremo un sito ben grande, ed ampio, potranno darsi 15, 20, e più palmi di larghezza agli stradoni principali, i quali faranno almeno due, che si seghino in croce nel mezzo del giardino, e lo dividano in quarti. Ma ne' maggiori siti, sarà bene aggiugnere

re altri stradoni laterali di uguale, o poco minor larghezza, i quali cingeranno d'ogn' intorno i fianchi del giardino; e se la grandezza del sito lo permetterà, potranno aggiugnervi altri stradoni, che dividano il giardino in più, che quattro ripartimenti, per averlo più comodo a spasseggiarvi dentro, più vario, e vago a vederli, più grandioso, e magnifico. Parlando poi de' viali minori, che corron fra le ajuele, per ordinario non sien più larghi di cinque palmi; altramente il disegno, tra per la spaziosità delle strade, e tra per l'ampiezza delle ajuele, comparirà sparso, e voto, e nella disunione delle parti si perderà quel bello, che la loro unione presenta all'occhio, quando di tutto il disegno si comprenda in una occhiata la buona disposizione delle membra, l'ordine, e la simetria. Non è poi legge inviolabile, che questi viali abbiano a farsi tutti di una stessa larghezza; anzi se torna meglio in acconcio al Disegnatore, che così lo esigano le varie figure del suo disegno, potrà quella inegualità di viali, renderlo anche più vago, e meglio architettato.

86. Date al Disegnatore le suddette avvertenze, devesi ancor dare le misure esatte della lunghezza, e larghezza di tutto il sito, in cui si vuol delineato il giardino, con tutte quelle condizioni, che vi desidera il Padrone, secondo che o il suo capriccio, o le circostanze del luogo dimanderanno. La fontana sta meglio nel centro del giardino, sì per la comodità della maggior vicinanza dell'acqua per tutt' i quarti, e sì perchè gode l'occhio di quella interruzione in mezzo ai larghi, e lunghi stradoni, e ne gode da ogni capo di strada; purchè però la fontana sia bassa, quanto alla vista il libero corso non impedisca. Sta bene altresì in capo allo stradone primario, dirimpetto alla prima entrata, e vi è di acquisto, che non interrompe il diritto passaggio, come l'altra, che sta nel mezzo situata. Ma questa se-

con-

conda, per ovviare alla distanza dell'acqua, che porta incomodo, esigerebbe ne' gran giardini quattro picciole fontane, una in ogni quarto, per sue compagne. Bisogna intorno a ciò spiegare il proprio genio al Disegnatore, acciocchè sappia il luogo, che deve assegnare alle fontane; intorno alle quali sotto al canale stavi una conca, ovvero, pila, affinchè stia sempre piena d'acqua, larga, e profonda tanto, che possa immergersi, e senza indugio tutto ad un tratto riempirsi l'innaffiatore.

87. Bisognerà insieme prevenirlo circa i sedili, i quali son necessarj per lo riposo, e stanno assai bene dirimpetto a capo de' stradoni, o negli angoli esterni de' ripartimenti, o anche meglio nel mezzo della platea intorno alla fontana, rompendo in giro i quattro cantoni de' quarti, per farvi quattro puliti sedili; purchè però le spalliere restino basse, per non dare impedimento alla vista. Parimenti è da farsi la prevenzione, se vi si vogliano de' teatrini, o piramidi con scalinate, per collocarvi più ordini di vasi, ove i fiori, ed i vasi medesimi, se sien vistosi, faccian di se vaga comparsa, mentre quivi, come in aperta scena, più distintamente presentansi all'occhio de' riguardanti: così anche se vi si vogliano de' pilastri, e piedistalli, per mettervi sopra certi vasi nobili, e grandi, che servano per le piante più insigni, per alberetti d'Agrumi, o d'altro genere, i quali, col loro risalto vi fanno spicco, ed amenità. Suole assegnarsi luogo ai pilastri, e piedistalli nella latora di quà, e di là degli stradoni: ma le piramidi, ed i teatrini fan vaga pompa o negli angoli de' compartimenti, o meglio a capo de' stradoni, per far termine alla vista, situati a dirimpetto. Per fine bisogna spiegare la propria mente al Disegnatore, se tutto in giro il giardino vogliasi cinto di muro, o di folta, e larga spalliera di Agrumi, o d'altro genere, che tutto ne chiuda.

da il recinto, e ne impedisca l'ingresso; giacchè in tal caso metterà egli a conto lo spazio, che dovrà occupare il muro, o la spalliera, o anche l'uno, e l'altro, quando si voglia il muro coperto di verdura, la quale aggiugnerà nuova grazia al disegno della platea; e dovrà mettere a conto lo spazio, da darsi allo stradone, il qual va sempre posto per necessità fra la spalliera, e le ajuole della platea.

88. Nel caso di poi, che 'l circuito del terreno sia un Trapezio di figura sconcia, ed irregolare; il Delineatore prima ne caverà quella figura più regolata, e più acconcia, che potrà meglio adattarsi a quel sito; v. g. un Triangolo, un Quadrato, un Parallelogrammo oblungo, un Circolo, un Poligono, un Ovato, o simil cosa, e quivi delinearà il suo giardino. Ne' ritagli poscia, che fuora resteranno esclusi, potrà delinearvi differenti disegni, o per fiori, o per altro uso, a piacer del Fiorista; esempigrazia per un Rosajo, per un rabesco di Bosso, per erbe aromatiche, per orticello Botanico, per semenzajo, per boschetto, il qual però stia nel fianco di Tramontana, acciocchè non dia ombra, e possa insieme riparare i fiori da' venti boreali, ciò, che riuscirà loro di gran profitto: ovvero ne' medesimi squarci di terreno potranno farsi de' Perterra alla moda Inglese, che vi aggiugneranno ornamento.

89. Qual sia ella tal moda, vien così descritta nello Spettacolo della Natura *Tom. 3 Dial. 2.* Molte persone di buon gusto, e specialmente la nazione Inglese, s'attengono all'uso, di corvedar l'ajuole della platea d'un semplice strato di zolla erbosa, senza partirsi mai dalla figura quadrata, o bislunga, col suo piliere nel mezzo. Entro di queste ajuole non si vede altro, che un verde tappeto, cioè a dire un'erbeta morbida, e corta, ch'è separata dal suo cordone, o spalletta per un viale, smaltato di pozzolana, o di matton pesto. Per

guarnimento delle latorà, che forman siepe al verdeggiante tappeto, in vece di piantarvi di qua, e di là de' fioretti, come suol farli comunemente, giudican meglio, inserirvi de' folti cespi, con due cordoni di bosso, separati dall' una parte, e dall' altra per un doppio viottolo sabbinoso . 2.

90. Finalmente chi da una parte vorrà adornato di verdura uno spazio ampio di terreno, e dall' altra o non tiene tanta quantità di piante da fiori, ch' empier lo possano, o gusta soli di poche delle più scelte; potrà nell' interno de' ripartimenti o far tappeti di gramigna, e di verdi erbette alla moda Inglese, o farvi altri disegni, capricciosamente modellati; di rami, di fogliami, di palmizj, di verbene, o farvi qualche intrigo di Labirinto. Quindi poi potrà chiudere in giro i ripartimenti, con due cordoni di Bosso, l' uno distante dall' altro, e quivi fra i due cordoni piantar de' fiori, che vi staranno assai bene, per far grata, e nobil corona intorno a' ripartimenti. Di quest' ultimi disegni parlasi nello Spettacolo della Natura, e sene rapportano alcuni, vagamente delineati; qual' è quello, di là tratto, della nostra figura 4. Tav. 3. Di quegli altri, de' quali abbiam parlato, destinati per soli fiori, vene ha molti, e assai belli nel libro del P. Ferrari: alcuni ancor degni ne contiene la carta del Clarici, in cui espone il progetto, e topografia del gran giardino Sagredo: altri ne apporta il citato Liger, misti di lavori di Bosso, e di ajuole per fiori; ed altri Sebastiano Serlio nella fine del libro quarto della sua famosa Architettura.

91. Noi pure nella Tav. 2. ne mettiamo cinque di vario gusto; acciocchè veduti dal perito Disegnatore, possa egli comprender meglio l' idèa propria per questa sorta di disegni, e colla sua maggior perizia altri più degni ne possa delineare. La fig. 1 è per un Pèrterra misto, alla moda Inglese, il di cui contorno può darfi a
fio-

fiori ; e l' interno spazio può riempirsi di cespi erbosi colla distinzione de' viottoli , coperti di terra colorata . La fig. 2 è di piccolo Perterra in sito oblungo , il qual può servir tutto ad uso di fiori , e può anche farsi misto di fiori , e cespi erbosi , come il precedente . La fig. 3 è un quarto di gran Perterra tutto destinato a piantarvi de' fiori , qual lo delineai per lo nobil giardino del Sig. Principe di Raffadali ; e fra l' uno , e l' altro quarto , che vi si accenna , sta il disegno de' stradoni , lastricati di coti di Mare , o di fiume di colori diversi , giusta l' idea , che qui appresso ne darò . Vi sta in mezzo la fontana , e di rcontro a capo dello stradone la sua scalinata circolare , siccome intorno alla fontana l' angolo rotto , per ampliare la platea del centro , e per farvi il comodo de' sedili . La fig. 4 rappresenta il disegno del giardinetto domestico del Sig. Pincipe di Butera , fatto di Muricciuoli ad altezza di ginocchio per maggior comodità , come fra poco si dirà : per l' angustia del luogo fu fatto un disegno piano , a riguardo che riuscisse capacissimo di molte piante , ma pur è riuscito non poco grato alla vista . La fig. 5 è un quarto di Perterra misto , il di cui giro serve a' fiori , e contiene dentro un intrigato rabesco di Bosso .

92. Delineato già il disegno di tutto il giardino in carta grande , (acciocchè riesca più distinto , con la sua scala de' palmi secondo l' uso ,) l' istesso Disegnatore , o altra persona perita di tal mestiere , dovrà trasportarlo , e delinearlo in sul terreno , il qual già prima dee trovar tutto spianato , ed esattamente uguagliato , e ben preparato nella maniera , che saremo per dire , nel trattar della sua coltura . Acciocchè la delineazione riesca esatta , è necessario , che prima sien descritte con carbone sopra un pavimento ammattonato , o altramente sopra un suolo ugualissimo le figure delle ajuole principali , le più difficili a descriversi ; e sopra di quelle si

faranno i modelli, o di tavola, o di cartone; perchè senza i modelli si perderà tempo, si faticherà molto, e 'l disegno riuscirà sconcio, e sconcertato; ed al contrario col modello alla mano, sarà delineata in un momento la figura, e coll' applicazione del modello medesimo avrem la totale ugualità nella stessa figura più volte replicata, la qual ugualità vien esatta dalla giusta simetria, e senza la guida del modello non è mai facile l'ottenerla. Tirate già tutte queste linee, e compiuta la delinazione per tutta la platea del Giardino; debb' ella segnarsi con fucelli di legno, o cannuce, acciocchè i lineamenti veggansi più distintamente, e non abbiano a scancellarsi colle pedate, o con la pioggia, com' è facile ad avvenire, prima che sia il Berterra interamente piantato.

C A P O VIII.

Come debbasi piantare il giardino de' fiori sul disegno, delineato nel terreno.

93. **S**I può piantare in diverse guise secondo il gusto del Fiorista; cioè i termini, ed i contorni dell'ajuole, già delineate, possono farsi o di fabbrica con sottili muricciuoli, o di mattoni bislungi, fitti in terra, o di cespi, e zolle erbose; o di sbarre di legno, ad olio colorate, o di Bosso, di Mirto, di Timo, Spicanardi, Garofanini Silvestri, e di altre tali erbe, che mantegansi verdi per tutto l'anno.

94. Ne' piccoli giardinetti si può far uso de' mattoni, per lo poco spazio, che occupano; piantati di taglio, purchè sieno di lunghezza per lo meno palmare; acciocchè un mezzo palmo, e più stia fitto, e fermo in terra, e l'aresto, che ne risalta, serva di siepe all'ajuole.

ajuola; e alla terra, che vi sta dentro serva di necessario riparo. Nel caso medesimo di un sito limitato gioverà anche meglio l'uso delle sbarre di Quercia, o di Castagno, che reggon all'umido, e colla pittura ad olio reggeran maggiormente, e si avrà insieme quella maggior leggiadria, la qual non può dare all'occhio la rozzezza de' mattoni, seppur non sieno pulitamente vernicati. ¶ Quando il terreno, (dice il Sig. Pluche *Spettac. della Nat. dial.* 2) che dee servir pe' fiori, è ristretto, in vece di scompartire l'ajuole con siepi di bosso, o di cespì, che ingombrerebbono troppo spazio, e succhierebbono inutilmente l'umor della terra, si separano per via di semplici sbarre, tutte dipinte di verde. Fanno lo stesso spicco, e ci risparmiano per una ventina d'anni la briga, e la spesa, che altramente richiederebbersi a mantenerle. ¶ Acciocchè le sbarre stieno ferme, debbono esser fra lor connesse; ed è pur necessario, che ciascuna sia fortificata con due, o tre piccioli, i quali fermati con chiodi a perpendicolo, ferme terran le sbarre con tutto il peso della terra, che vi sta dentro, la quale, per dovervi star alta, com'è il dovere, e sollevata sul livello delle strade, tien bisogno di sostegno, e di riparo.

95. I cordoni di cespì, e di zolle erbose, di Mirto, di Timo &c., non fanno pe' piccoli giardinetti, ma pe' grandi, ove sia molto spazio da riempire; perchè si dilatano, ed occupano molto terreno, e fraudano alle piante a se vicine il dovuto nutrimento. Il Bosso dee ben preferirsi ad ogni altra sorta di pianta, per far siepe alleajuole; perchè par, che abbia tutte le buone doti desiderabili: primo, conviene a' grandi, e piccoli giardini, potendosi tagliare o alto, e largo, o basso, e stretto, come sarà più in grado: ella è dote particolare del Bosso, per cui è divenuto la delizia de' giardini, che possa modellarsi col taglio delle forbici in tutte le di-

ferenti fogge, e si può esprimer con esso qualsivisia figura, ed ogni suo membro più delicato. Secondo, per quel che ho potuto osservare, non par, che riesca molesto alle vicine piante, quando tengasi basso, e stretto, che non abbia bisogno, se non di poco sostentamento, ed avendo insieme la cura, di risegare ogn'anno, prima di piantarvi i fiori, tutte le radici, che avrà propagate dalla parte interna delle ajuole; acciocchè non tragga nutrimento da questa banda, ma sol dall'altra, ov'è la strada: di tal maniera viene ad evitarsi l'inconveniente, che le radici del Bosso sfruttino il terreno, per lo qual timore altri a torto altr'erbe preferiscono al Bosso, come se le altre di solo vento si nutrissero: Terzo, il suo verde si conserva sempre perenne, sempre grato, e vivace, e la sua pianta sempre vegeta per lunga serie d'anni; ciò, che non hanno per ordinario le altre piante, da far cordone, le quali muojono in pochi anni, e bisogna soventemente rinnovarle, e nessuna forse lo pareggia nella bellezza del verde, e nelle altre sue doti.

96. Del resto volendo far uso di quest'altre piante ne' giardini spaziosi, se ne potran fare larghi cordoni, o più tosto fasce, le quali cingano i quarti del giardino, e girino intorno per tutt' i lati delle vie principali: ed affinchè le fasce spicchino maggiormente, potran chiudersi quinci, e quindi con due filari di Bosso per un più nobile finimento. Ma per genio mio particolare, io farei altro uso di queste fasce, ed in vece di averle belle per la sola verzura, le vorrei bell' e gaje per la verzura, e pe' fiori; e però vi planterei Margaritine, Ranuncoli acquatici, Viole mammoie, Viole doppie, Garofanini silvestri, ed altre simili piante terragnole, che sempre conservano il verde, o per la maggior parte dell'anno, ed insieme smaltano il verde col brillante colorito de' molti fioretti, che producono.

97. Rimane a parlar de' muricciuoli, i quali molto utilmente ancora possono adoperarsi, per corredar leajuole, così ne' piccoli, come ne' gran giardini; e possono farsi ad altezza di ginocchio, quando si vogliano alti; e volendoli bassi, basterà un mezzo piede in circa: gli uni, e gli altri vi fanno spiccar, forse meglio, che il Bosso, la bellezza del disegno, purchè sien fabbricati, e mantenuti con pulitezza. Debbono per ciò intonacarsi di calce anche al di dentro, acciocchè l'umido non trapeli, e non vada a macchiar l'esterna superficie, la qual debb'esser bene stuccata di bianco, senz'altra pittura: al più, che di poche macchie cinericie, per finger marmo. Amo il bianco; sì perchè facilmente può rinnovarsi col latte della calcina, e sì perchè l'verde delle piante col colorito de' fiori piglia dal bianco un maraviglioso risalto. Il piano superiore del muro potrà guernirsi di mattoni vernicati, i quali serviranno di difesa, e di abbellimento: agli angoli poi potranno aggiugnersi delle colonnette, o de' piedistalli, per servir di base a' testi, e vasi nobili, i quali colla loro eminenza, e vaga simmetria, faran corona alla platea, come può vedersi eseguito nella Figura 4. E qui suggerisco, che per avere il comodo, di poter collocare molti vasi di fiori, e quanti sene vogliano, sù per tutto il contorno de' muricciuoli, se questi saran più stretti del piede de' vasi, si faran delle piccole piastre di creta, o di pietra, le quali posate sulla terra dell'ajuola, ed applicate a' muricciuoli, serviranno di soda base. I bassi muretti sopra gli alti hanno il vantaggio della minore spesa, e del maggior dominio dell'occhio; dacchè essendo umili, domina la vista del riguardante sopra tutto il Perterra, godendo più distintamente in un sol colpo d'occhio dell'intero disegno, e di tutte insieme le piante, e i fiori. Però se i muricciuoli non passino l'altezza del ginocchio, resta benissimo alla vista qualche bastevole superio-

riorità, per tutto dominare, e di tutto godere in una semplice occhiata.

98. L'eccesso poi del maggior dispendio per gli alti muricciuoli con guadagno vien compensato da due stimabili lucri, che sene ottengono: ottiensì primieramente, che 'l coltivatore non sia obbligato, a dovere star le intere giornate ora in ginocchio, ed ora disteso faccia per terra con suo grave incomodo; massime ove le ajuole sien larghe, con fatica, e noja, che atterrisce gli stessi Ortolani, per altro avvezzi, a star chini nel mestier loro, ma non mai tanto inclinati, e prostesi al suolo con tutto il corpo, com'è necessario più volte per la coltura de' fiori nelle umili ajuole. Ma via non s'abbia tanto riguardo alla comodità di un villano, condannato dalla vile sua condizione, a servir con grave stento alle delizie de' Grandi; senza il merito d'esserne compatito; però a riguardo de' padroni medesimi è un bel comodo per essi, potersi divertire, a cogliere i fiori, a curar le piante, ed a coltivarle colle proprie mani, senza il detrimento d'inchinarsi; mentre posson far tutto in piedi nelle ajuole, sollevate da terra, ed anche può farlo una Dama, stando agiatamente a sedere. Ottiensì un altro vantaggio a pro delle stesse piante coll'altezza delle ajuole; perchè così esse godon più del Sole, e dell'aria, e son più ventilate, nè v'è pericolo, che si guastino, e corrompano colle piogge dirotte, e continuate dell'Inverno; perchè stando così elevata la terra, l'acqua superfua se ne cala giù, e ne inzuppa il terreno, ove ha la pendenza, e l'ajuola trattien solo per se quell'umido, che le conviene.

99. Chi è Fiorista può giudicar meglio, che ogn'altro, del pregio de' riferiti due vantaggi: ci solo fa per pruova il gran piacere, ch'egli è, avere il comodo di coltivar le piante, e curarle di propria mano, ed

ed il poter ciò fare con agio , senza riceverne detrimento ; e fa egli , che vien anche necessitato frequentemente dalla dolce passione , a faticar colle proprie mani , per certe operazioni più delicate , alle quali mal si adattano , e mai vi riescono le mani villanesche . Tal volta v'è pure altra necessità , di far le ajuole così alte , per tener le piante più sollevate da terra , e tenerle più ventilate , come avviene in certi piccoli orticelli dimessici , a' quali fan uggia le vicine fabbriche ; ed in luoghi così uggiosi , ed umidi non vi ha altro miglior rimedio , che tener le piante all' asciutto , alte da terra , e ventilate : così mi è stato uopo tal volta praticare , e mi è riuscito d'ottenere in un sito cattivo fiori assai buoni da piante , che con tal ajuto riuscivan ora buone , ed ora non del tutto mal condizionate .

100. Questo è quanto appartiene alla formazione delle ajuole : ma pur ci resta a dire qualche cosa delle spalliere , e delle strade . Nessuna spalliera va posta in sito , che ingombri le piante , o che impedisca la veduta libera di tutto intero il giardino ; e però il luogo proprio per le spalliere è il d' intorno per lo circuito esterno della platea . Quivi , quando il terreno sia spazioso , potranno farsi due ordini di spalliere , le quali formino uno stradone alto , ed ombroso ; o potrà farsi un pergolato per riparo del Sole , quando è molesto , e per avere un luogo , ove poter collocare all' ombra vasi di piante tenere , o d' altra condizione , cui si convenga per qualche tempo tener difese dal caldo Sole .

101. Intorno ai generi da piantarsi nelle spalliere ; benchè sia ottimo l' Alloro Regio , il Mirto , il Bosso , e simili spezie , usate per tal' effetto ; pur sembrano a me più proprie per un giardino di fiori quelle spezie , che accoppiano in uno l' amenità della verdura coll' ornamento de' fiori : e quindi metto in primo luogo le spalliere degli Agrumi , ne' quali si gode insieme del ver-

de finissimo, sempre perenne, e de' fiori odorosissimi; che lo smaltan di bianco, e poi anche de' frutti, che l'indorano, ed utilmente lo ingemmano. In secondo luogo metto i Gelsomini, a' quali non manca, che 'l solo pregio delle frutta. Di poi si può dare il terzo luogo agli Oleandri, massime se sieno del fior doppio, il qual se cede alquanto all' odor fortissimo del Gelsomino, spira pure la sua fragranza, e supera il Gelsomino nella grandezza de' fiori, e nel gajo color rosseggiante. Quindi poi vengon le Granadiglie, o sia fior di Passione, i Convolvuli, le Campanelle, i Caprifogli, e più altri, il di cui verde non è perpetuo, ma pur meritano degno posto nelle spalliere per la verzura, e pe' fiori, de' quali fan pompa nel più bel tempo dell'anno.

102. Per ultimo è da aggiugnere, (per quegli arboscelli, frutici, e piante deboli, le quali han bisogno d' appoggio, per sostenersi, inerpicare, e salire in alto,) che 'l legname più opportuno da adoperarsi pe' palancati, che debbon sostener le spalliere di tali piante, son la Quercia, e 'l Castagno, come sopra si è detto pelle sbarre; ed a preservarli meglio dalla putredine, vi si dà prima una incamiciatura di Cerussa, e poi vi si passan due mani di verde con vernice ad olio.

103. Pella nettezza, e pulizia delle strade, (che pur son de' principali ornamenti, suppongo qui, che tutto il terreno, prima che vi sia disegnato il giardino, sia stato già profondamente zappato, o vangato, e poi diligentemente spurgato non solo d' ogni sorta d'erba, ma di tutte affatto le radici, delle quali si può temere che possano ripullulare; ed in questo particolare vi è bisogno di diligenza, massime per le radici della Gramigna, e di simili piante nocive, delle quali ogni minuzolo ritorna subito a germogliare; perchè altrimenti presto quel suolo inerbirà, e si vedrà d' erbe cattive ricoperto, ed alcune di quelle saran sempre mai inestermi-

bi.

bili; e rinascono sì nelle ajuole, come nelle strade, oltrechè fraudano alimento alle piante da coltura, vi fanno sconcia deformità. Son diverse le maniere, che praticansi, per aver pulite, e comode le strade; ed acciocchè il Fiorista ne scelga quella, che va a suo grado, tutte le riferisco qui, prese dal P. Ferrari, coll'aggiunta di una, che io stimo la più degna maniera, ed ei la tralascia.

104. Dic'egli così *L. 1, c. 3*: 2. Dopo di aver nella maniera già detta ricinti di mattoni i compartimenti, si spianeranno i sentieri, che gli circondano, in modo però, che pendano alquanto in quella guisa, e ver quella parte, che i medesimi compartimenti de' fiori. Se brami di approfittarti con la guida dell' antichità, apprendi l' arte di spianare, ed assodare l' aja da grano, ed ufala ne' sentieri, o viottoli, che detto abbiamo, in questo modo. Prendi della creta, o terra, che abbia del cretoso, e tenace, e zappala ben trito, e spargivi della morchia fresca, e non salata, che vi s'impasti. Imbevuta, che l' avrà, di nuovo si tritolì, e pongasi ne' viottoli, rotolandovi sopra un cilindro, o colonnetta per ispianarla, e battendola con la mazzaranga, o magliozzo, che altri lo chiama, ed è un grosso legno, e pesante, piano nel fondo, e sopra colmo, con manico fitto a pendio. Finalmente spargivi sopra di nuovo della morchia, e si lasciala disseccare. In tal maniera i viai spianati, ed assodati, nè si spaccheranno dal caldo, nè lotosi diverranno per le piogge, nè erbe inutili produrranno, nè formiche, o topi vi si annideranno. *Cato de Re rust. c. 129. Varro L. 1, c. 51. Colum. L. 5, c. 6, & L. 2, c. 20. Plin. L. 15, c. 8, & L. 18, c. 29. Pallad. L. 7, tit. 1.* Con nuovo artificio altri adopera calcinaccio, tolto da' casalini, e ben concio col vaglio; e rena di cova, mescolata con ghiaja minuta, o terra magra, e vergine, non mai seminata, qual è,

se la trarrai da cupo; o quella materia, che alcuni chiamano Soda, ed è quel fondaccio di color livido, fatto a granelli, o pallottole, avanzo, e scolatura di calcina, e di cenere, dopo cavatone il sapone. V'ha chi prende della terra magra, e disseccala al coperto, disseccata, la tritola, tritolata, la mescola con sabbione; poi vi getta dell'acqua, o la mette a bagnarsi dalle piogge, bagnata che sia, stendela pe' viali; là dove quella, che dianzi era minutissima polvere, s'indura assai, e poco men che non s'impietra. Questi sentieri in due modi, mettendovi della materia già detta, si spianano, o battendogli, e pestandogli con la già detta mazza-ranga, o riempiendogli rasente la cima de' mattoni; il che dee farsi con andare all'indietro, e tirare a se la materia ugualmente con la mestola, o cucchiara da muratore; perocchè se si facesse altrimenti, co' piedi si calcherebbe, e guasterebbe quella uguaglianza. Di qui avverrà, che la terra, postavi così leggiera, e dal suo stesso peso, e dal penetrare, e premere, che faràn le piogge, a bastanza, ed ugualmente si abbasserà, e diverrà dura. Sonovi di quelli, che ci fanno il pavimento con mattoni bene arrotati, e connessi con calce, perchè impenetrabile sia agli animali insieme, e all'erba. Ma sì fatti pavimenti soggiacciono a gravi incomodi; perocchè dalle piogge, e dalle gelate divengono così stracciolosi, che non vi si può andare senza pericolo di caduta. Oltrechè a lungo andare dall'umidore traggono una cotal muffa, ed immonda lanugine, che richieggono un'opera continua, di che gli vada nettando. Pure di qualunque s'uso siasi il viale, perchè non generi dell'erba, ha bisogno di esser ogn'ora spazzato dalla terra, che suol cadervi di sù i rilevati de' fiori. Quella sorte di lastricato riesce più d'ogn'altra inutile a' Giardini, che si fan con calce, e con rottami di vasi, o con altra terra cotta tritata che comunemen-

te si dice lastrico; perocchè questo di leggieri si guasta, e spezza dal ghiaccio. 2.

105. A' saviissimi sensi del P. Ferrari, a' quali pienamente aderisco, deggio solamente aggiugnere quell'altra maniera, che sta pure in uso, per lastricar le strade, e pare a me per isperienza, che riesca la più durevole, la più comoda, e la più vistosa. Ella è quella di lastricar le strade con picciole coti di Mare, o di fiume, legate insieme con della calce, che ne fa il letto di tali petruzze, che son da se marmoree, viene a farsi un commesso cotanto forte, che può durare un secolo, senza struggerfi: tal lastricato è impenetrabile alle formiche, e ad altri animali, che guastano le strade, nè muschio, nè muffa, nè alcun erba vi può allignar sopra, e sempre mantienfi asciutto, anche immediatamente dopo la pioggia, anzi allora più che mai ne invita al passeggio, perchè lavato dall'acqua, si fa più terso. Per averlo bello, e vistoso, le petruzze, le quali sempre trovansi di più colori, o di due almeno, bianco, e nero, debbono collocarsi a disegno; e se il disegno sarà bene inteso, riusciranno le strade tutte bellissime, e ricamate. Di tali disegni ne metto uno nella Fig. 3, Tav. 3, qual lo delineai per l'orticello del Sig. Principe di Butera, ed è riuscito bellino, e comodo per lo passeggio.

106. Il far così questi lastricati ne' giardinetti di casa, che soglion esser umidi, e poco ventilati, sembrano quasi una necessità, per non averli a sporcar le vesti, ed infangare i piedi, e per potervi ogn'ora comodamente passeggiare. Ne' gran giardini per risparmio della spesa questa sorta di lastricato potrà farsi nella sola croce di mezzo; e per le altre vie men principali, adoperar si potrà una delle sopra riferite maniere. Ma i viottoli, che girano intorno alle ajuole, stimo meglio, che si lascino intatti colla medesima terra, che vi si truova; ciò, che riuscirà bene non solamente per lo risparmio

mio

mio della spesa, e della fatica; ma pur perchè quella terra, s' ella è di buona condizione, potrà servire a buon uso; cioè dopo ch'ella è stata per qualche tempo a riposo, potrà cambiarsi con la terra delle ajuole, quando questa sarà divenuta sterile per lo lungo faticare. Questo è, quanto mi è paruto, di dover suggerire così pella vantaggiosa scelta del sito del giardino, come pella sua convenevole architettura; e però compiuta la prima istruzione, passo alla seconda, che insegna il promesso artificio, per aver buone le semenze da seminare.



PARTE SECONDA

Della Coltura de' Fiori.

C A P O IX.

Teoria del promesso secreto , per far venire dalle semenze i fiori dopi, semidoppi, di bei colori , e nuove forme .

107.



A miniera indeficiente, onde vengono a noi le piante , apertaci dal Creatore, che la cred' inesaurita , per averne, quante più ne vogliamo , son le semenze , che le stesse piante producono nel fiore abbondantissime ; e però chi vorrà il suo giardino , ricco , e pic-

no di fiori , non ha egli a far altro , che preparar bene le sue semenze , seminarle , coltivarle a dovere , e poi avere un poco di pazienza , aspettando , che dieno il fiore a suo tempo , già fatte adulte . Ma ecco le due difficoltà , che incontrano i Fioristi , a prevalersi di una vena sì ricca , che li può far senza dispendio , e con poca fatica d' ogni gener di fiori pienamente doviziosi .

108. La prima , e più possente difficoltà è la scarsezza del provento , che si suol comunemente ricavare dall' semenze , particolarmente in quelle spezie di fiori , che sono li più stimati , e si vorrebbon più che gli altri moltiplicate , come a dire , Ranuncoli , Anemoni , Garofani &c. Dico , scarsezza , non già per la quantità delle piante , le quali senza numero produconsi dalle semenze , ma per la buona lor qualità , che si pretende ,
la

la qual è, che i lor fiori riescano pieni, e doppi, o semidoppi di bel colore, e di vaga forma: perocchè in molte razze di piante, (e son le più pregiate) d'ordinario appena mai suol cavarsi un solo fior doppio da cento piante di semenza, e raro è qualch'uno, che venga semidoppio; ma quasi tutti riescono scempi, i quali non si hanno in pregio, eccetto quando la bellezza della forma, e la finezza del colore, renda il fiore rispettabile, non ostante la sua scempiezza. L'altra difficoltà è l'impazienza, d'avere presto i fiori, la qual cresce coll'influsso della prima difficoltà: poichè bisognerà aspettare un altr'anno, prima che fioriscano le radichette; ed anche due, o tre anni con qualche cosa di più tardano a dar fiore i bulbettini, nati da semenza: là onde stanco il Fiorista già della lunga aspettativa, e poi deluso dalla mala raccolta di soli, o quasi soli semplici, perde la pazienza, e mette in non cale il prezioso traffico delle sementi, postochè lo pruova quasi per affatto inutile senza il preteso guadagno.

109. Le medesime difficoltà incontrava io da principio: seminava le semenze de' Ranuncoli, e degli Anemoni, e dopo l'aspettazione di due anni, quasi tutt' i fiori mi venivan semplici, doppio appena mai qualch'uno, e molto pochi i semidoppi. Al tedio d'aspettare il fiore sino al secondo anno, aveva io benissimo riparato con seminarne ogn'anno, e così per ogn'anno godeva de' novelli parti; al che poscia, fatto più esperto, trovai miglior rimedio, di seminar le sementi assai di buon'ora nel mese di Agosto, e Settembre, come dirò, e così mi riusciva, che per la maggior parte nel prossimo Aprile mi fiorissero. Però all'altro male, ch'era il più molesto, e 'l più interessante, di aver fiori doppi, e semidoppi, non seppi mai trovar rimedio, che stato fosse efficace; finchè dipoi la dura necessità non mi strinse, ad agguzzar l'ingegno, per accertarne

il secreto ; cosa solita ad accadere , quando lo spirito co-
stretto è , a sollevarsi quasi sopra se stesso , per trovare
scampo , e riparo ne' casi estremi .

110. Ecco il caso mio : essendo ito in Malta a leg-
germi la Mattematica , e non avendo altro luogo a pro-
posito , per piantare i miei fiori , fui costretto a metter-
li nel giardinetto di casa , poco ventilato , ed ingombra-
to da grossi alberi di Aranci . Il fucido terreno me ne
corruppe la massima parte , e tal pena ne provai , che per
non averne a provar altra simile , risolsi , o di abbandonar
totalmente il mestiere de' fiori , o di cercar maniera , come
poter ristorare ad un tratto simili fallimenti per la via del-
le sèmenze , quando mi riuscisse , di trovare il secreto , sem-
pre da me bramato , e cercato indarno , per far sortire
da quelle i fiori doppi , e semidoppi , ed in tanta copia ,
da poter prontamente rimettere il perduto capitale . Va-
no era lo sperar , di rinvenire un tal secreto ne' libri
de' Fioristi ; perchè se alcuno mai l' avesse saputo , e pub-
blicato , per la sua importanza saria già stato notorio pres-
so i Fioristi , e Giardinieri ; molto più , che que' secre-
ti , che intorno a ciò si spacciano , erano stati da me
provati , e son vere imposture , come farò per dire . Quin-
di m' impegnai , a farne seria ricerca da me medesimo ,
e non già temerariamente all' incerto , ma per certi bar-
lumi , che acquistati avea , nel filosofar altre volte a que-
sto medesimo fine sulla natura de' fiori , mi lusingava ,
che continuando per lo stesso sentiero , ed inoltrandomi
alquanto più nel filosofare , avria potuto arrivare al
termine desiderato .

111. Aveva io sperienza , di essermi venuta qualche
pianta di fior doppio , o semidoppio dal seme de' scem-
pi , e semidoppi ; e quindi deduceva , che come da que-
sti ne riescè alcuno doppio , o semidoppio fra cento scem-
pi , così potrebbero riuscir tali , o tutti , o la maggior
parte , se le cagioni medesime , che concorrono a far-

ne uno, a farli tutti doppi, e semidoppi cospirassero. Ma quali mai esser possono queste cagioni, che formano il doppio, e 'l semidoppio, se non quelle medesime, che o generano, o alimentan la pianta? Delle cause alimentanti, quantunque dicasi da molti, che la buona coltura possa far raddoppiare i fiori; io però nè allora, nè poi ne ho mai avuto alcun certo sperimento, ch'esse possano la natura mutare alla pianta, sì, che di fiore scempio, qual prima era, produca il doppio. Quindi tutta rivolsi l'attenzione alle cause generanti, delle quali o totalmente, o principalmente dovea dipender la doppiezza.

112. Sulla virtù generativa delle polveri de' fiori, provata nel Trattato primo, mi trovava per allora aver letto unicamente, nel *Tom. 3 Trattat. ff. del P. Ragnault*, l'opinione del Sig. Geoffroy e le sue dotte osservazioni, e ragioni molto me la persuadeano; cosicchè da tal notizia potei dedurre, che quando la doppiezza, o scempiezza de' fiori fosse nativa, ed originaria, era proprio mestiere delle polveri femminili, il far, che i semi del Ricettacol de' fiori, pregni di piante or doppie, or scempie si concepissero. Ma poichè la virtù femminile, che risiede nel Ricettacolo, egualmente concorre colla maschile delle polveri alla generazione; poteva pur dipender da quest'altra la doppiezza, o scempiezza; e però era da cercarsi la vera sua origine, o in entrambe le virtù insieme, o almeno in una delle due.

113. Ovunque però si cerchi, s'incontra la medesima difficoltà; cioè, che così l'una, come l'altra virtù sia omogenea in ogni sua parte; nè abbiain motivo, da poter presumere, che una porzion di polvere v. g. sia di miglior qualità, per generare i grani doppi, ed un'altra d' inferior qualità, per generare gli scempi: come dunque le polveri, e 'l Ricettacol d'un medesimo fiore qui producono un grano doppio, e lì un grano scempio? Parvemi insuperabile la difficoltà, se dovesse
cer-

cercarsi la cagion fisica di tal varietà di concepimenti nell' interna struttura degli organi di uno stesso Ricettacolo, e nell' interna qualità delle polveri; dacchè l' interno, minuto lavoro della Natura è stato, e sarà sempre un paese incognito a noi mortali; e però insistendo alla presunta omogeneità, ed uniformità d' ambedue le virtù in ogni lor parte, mi rivolsi a continuar la ricerca fra le cagioni, che potesser venire dall' estrinseco, le quali fosser abili, ad alterar le due virtù, determinandole, ad operar difformemente nella varia concezion de' grani, altri scempi, altri doppi. Così dall' azione degli agenti estrinseci, ora contraria, ora favorevole, proviene, che i grani di un istessa spiga di biada riescano altri pieni, altri voti, altri bene, altri mal graniti.

114. Di più rifletteva a proposito sulla sperienza, poco stante premessa, che non sembra cosa, troppo connaturale per una pianta di fior doppio, o semidoppio, il produr semi, la massima parte scempi, quando par, che dovria più tosto generar doppi, e semidoppi, simili a se: così molto meno, anzi niente sembra connaturale per una pianta di fior semplice, produrne un altra di fior doppio, senza Stamigne, senz' Apici, senza il Ricettacol de' semi, ma tutto pieno di sole foglie, cioè tutto ne' principali membri alterato; essendo sol proprio di pianta semplice, che ne produca altre semplici, simili a se; così l' ha istituita la Natura, ed a questo fine ha ordinati gl' interni suoi organi, perchè generi le consimili piante di membri interi, non le manchevoli, e mostruose. Se dunque genera essa de' parti mostruosi; (e mostri appunto i fiori doppi son riputati) ci vien coitretta da causa estranea, che le sopravvien, e l' altera, e la dispone, a dar parti, da' suoi proprj notabilmente dissimili, e preternaturali. Questo medesimo sentimento mi veniva maggiormente confermato dall' analogia del-

la generazion degli animali, gli organi de' quali, ordinati da Domeneddio, a generar parti bell', e perfetti; se talor producono i mostri, vi vengon forzati, e determinati da cagioni estranee, che ne impediscono, ed alterano le lor naturali esigenze.

115. Guidato da un tal discorso, e sempre insistendo sulla pari analogia degli animali, onde poteasi trar buon lume, non mi si parava alla mente altra cagione estrinseca più atta, ed abile, a determinar la pianta v. g. di fior semplice, per farle generare un parto alieno, cioè il doppio, o semidoppio, quanto lo eran le polveri femminili d'altro fiore della stessa specie, doppio, o semidoppio; quando le polveri di questo per buona sorte arrivassero al fiore scempio, lasciato a semenzire. Che cosa più connaturale di questa, dissi io allora, che qualche porzioncella delle polveri del doppio, o del semidoppio, trasportata per accidente nel cuor di un altro fiore, quivi generar possa qualche semenzina di pianta doppia, o semidoppia, simile alla pianta, che la fa da padre, da cui le polveri son venute? Le fattezze medesime della doppiezza de' figli fan testimonianza, onde sia venuto alla pianta madre il benefico influsso delle maschili polveri, cioè che sia venuto dal doppio, o semidoppio padre. Il medesimo s'intenda detto della pianta doppia, e semidoppia, quand'ella genera scempi, e se dissimiglianti, che li genera per lo accesso al suo fiore delle aliene polveri de' vicini scempi. Sulle recitate riflessioni cento altri pensieri mi si affollavano alla mente, e tutti con nuovo lume la rischiaravano; di maniera che, dopo un breve pensare, potei restar persuaso, che non solamente mi trovava in sulla buona strada, ma che già era presso che nel termine desiderato.

116. Non mi faceva veruna impressione la difficoltà, di dover le polveri del fior doppio, o semidoppio volar per aria, per poter arrivare al fiore scempio; perchè

chè di fresco avea letto nel citato libro del D. Reguana il simil volo, che debbon fare per necessità negli alberi di due sessi le polveri del maschio, per andare alla femmina, e fecondare i suoi frutti: anzi qui il tratto del volo era per ordinario brevissimo da una pianta all'altra, ambedue nel testo medesimo, o nella stessaajuola, o quivi presso così vicine, come soglion nascere, doppie, scempie, semidoppie, confusamente framescolate. Non piacevami, è vero, la maniera nello stesso libro riferita, come le polveri dicevanfi andare, anche lontano, da una in altra pianta, cioè, che 'l fiato de' venti ve le trasporti; nè fu, se non dopo un anno, che potei scoprire la vera maniera del trasporto, che si fa dagli Insetti, i quali portan seco volando da fiore in fiore le polveri, attaccate al corpo, come ho fatto costare nel primo Trattato. Ma questa ignoranza, intorno alla maniera, niente pregiudicava alla verità del passaggio delle polveri dal maschio alla pianta femmina; perchè del passaggio era io certo, che farsi, qualunque ne sia la vera maniera; e come si fa, diceva io, fra gli alberi di due sessi, può egualmente, anzi meglio effettuarsi fra le nostre piante, che stan fra loro assai più vicine per ordinario.

117. Nè tampoco faceami della impressione l'irragionevol sospetto, che forse le polveri del fiore straniero non avesser la facoltà d'impregnare i fiori di un'altra pianta, quando ella sia della medesima specie, o poco differente. E perchè nò? diceva io; non avvien così in tutte le razze degli animali, che ogni maschio, quanto si voglia differente, s'ei però sia della specie medesima, o anche poco aliena, è abile ad impregnare? Anz'io fin d'allora conceputo avea speranza, di poter ottenere i bastardi di terza specie coll'applicazione delle polveri di una specie di pianta sopra i fiori d'altra specie, purchè però fra lor non sieno molto eterogenee,

nec. La gran similitudine fra la generazione degli animali, e quella delle piante, mi facea sperar, che sì nell'uno, come nell'altro genere si potessero far de' muli, di due differenti spezie composti. E qui mi sovvennero alla memoria certi tralignamenti di piante, che avea udito raccontare, i quali senza temerità, giusto pareami, di dover attribuire alle polveri di qualità diversa, ite da un fiore all'altro di due differenti piante; onde poi se ne concepiva il seme di mista qualità, e di là ne venga la pianta, dalla sua natural indole tralignante. Molto maggiormente dappoi mi son confermato nella verità di questo mio parere, quando prese avendo da gente perita più certe informazioni di varj tralignamenti, i quali a suo luogo riferirò, trovai, che nessun'altra causa ad un tal effetto meglio di questa convengasi, e che l'influsso delle aliene polveri è solamente quello, che può far concepire un parto alieno alla pianta madre.

118. Ancorà qui mi sovvenne in buon punto di ciò, che avea più volte con maraviglia notato, ed è un fenomeno, che tutti ammirano frequentemente i Fioristi, cioè la mutazion de' tanti varj colori, forme, e figure, in cui si trasmutano i fiori, e le piante, nate da una stessa qualità di semenza, raccolta da una medesima madre. Più d'una volta avea io fatta pruova, di seminare i semi, raccolti eziandio da una medesima spiga; e da quella sortir ne vedea le piante, ed i fiori, notabilmente fra se, e dalla pianta madre dissimiglianti: esempligrizia i semi colti da pianta di foglia liscia, larga, ritonda, e tinta di verde scuro, i di cui fiori eran di color cremesi, di foglia larga, ritonda &c., partorivano piante di foglia varia, chi liscia, e chi increspata, chi larga, e chi stretta, chi ritonda, e chi oblunga, dentellata, riccia &c., chi di una sorta di verde, e chi d'un'altra: così medesimamente i lor fiori di cento varj colori, e forme, chi rosso, chi giallo, chi bianco, chi

fo-

fosco, chi picchiettato, e mischio di più tinte, e le foglie de' fiori nel numero, e nella figura, chi di una, e chi di un'altra molto dissimil maniera.

119. Questa mirabil verità, che s'osserva in molte spezie di fiori, veggenti dalla semenza, come ne' Ranuncoli, negli Anemoni, ne' Garofani, nelle Viole, Giacinti, Tulipani &c. la qual non mai s'osserva, o assai di rado, in certe altre spezie, e son quelle, le di cui piante generatrici son costantemente di una stessa forma, e di un sol colore, come il Giacinto tuberoso, la Viola Mammola &c. mostra da una parte, che quelle prime piante abbiano da per loro certa particolar disposizione, per far tai cambiamenti; e mostra dall'altra parte, che son veri tralignamenti, i quali comodissimamente trar posson sua origine dall' influsso, ed azione delle vicine piante, quando queste sieno della sua spezie, e di varj colori, e forme: perocchè con ogni naturalezza di tai cambiamenti, e varietà può esserne la cagione il concorso, e l' arrivo delle polveri de' fiori vicini, di colori, e di forme differenti; essendo cosa molto congrua, e propria, che i germi concepiti nelle semenze ne vengano colle fattezze, che ritraggon dai padri, e dalle madri, che concorsero a' generali. Ma questo, che in quel principio era per me un discorso ragionevolissimo, fu di poi provato verissimo con più sperienze, che poscia riferirò, mentre ora ho premura di dar luogo, e risposta alle difficoltà, che mi si oppone-

7400.

C A P O X.

*Difficoltà contra l' esposta Teoria;
e lor soluzione.*

120. **D**Ue sole difficoltà mi dieron da pensare : era la prima , che i fiori rigorosamente doppi non tengon nè Apici , nè polveri ; e però se non ne tengon per se stessi , come mandar ne possono alle piante semplici ? E se non ne mandano , come mai potranno i semplici generare i doppi senza l' influsso de' medesimi ? Così è per verità , che 'l vero doppio niente altro produce , che foglie ; e solamente quando sdoppia , o scempia , come tal volta fa , produce polveri , e semenze , come tutti gli altri semidoppi , o scempi . A declinar la forza dell' argomento , giova distinguer due sorte di doppi , cioè doppi di primo grado , e son que' di sole foglie , e doppi di secondo grado , che formano anche il primo grado de' semidoppi ; e questi son pienissimi di foglie , appena niente manco de' primi ; alla qual dote però accoppiano insieme l' altra , che son feraci di polveri , e di semenza ; stimabili per ciò niente meno , o qualche cosa di più de' veri doppi per lo pregio , che hanno , della fecondità , a riguardo della quale ora noi dal secondo grado di doppiezza li farem salire al primo grado di estimazione ; mentre daremo a vedere , che questi semidoppi son veri genitori di piante doppie , e semidoppie di primo grado .

121. Ma come generano essi i veri doppi , a se dissimili , se non hanno in se stessi la dote della rigorosa doppiezza ? Appunto li generano , come tal' ora da genitori nani nascono figli d' alta statura , e al contrario da padri alti nascono figli corti , da' grassi figli magri .

gri, e da' magri i figli grassi: così da' genitori bell', ed interi ne vengon figli deformati, e mostruosi; e così veggonsi tra padri, e figli più altre notabili dissimiglianze. Son esse alquanto rare negli animali quest' esotiche generazioni, ma pur si danno qualche volta, sebbene per ordinario i figli portino le fattezze medesime de' lor genitori; perciocchè la Natura da se non altro intende sempre, e procura, che 'l simile, il legittimo, e 'l naturale. Giusto così avviene nella generazion delle piante, le quali di legge ordinaria producono i parti, simili a se; ma qualche rara volta, alterate dal concorso di un nuovo accidente, riescono le lor produzioni alquanto dissimili, o eziandio mostruose. Mostri sono i fiori doppi, se totalmente son menni, e manchevoli delle parti genitali; e però son rari, anche ora (non più però rarissimi, come prima), dopochè si è scoperta l'origine, onde vengono, e gli accidenti, almeno alcuni d'essi, che li fan venire dissimili, e mostruosi.

122. Del resto quant'è finalmente la differenza fra i doppi di primo grado, ed i doppi di secondo grado, che sono i lor genitori? Ella è pochissima; perchè ancora questi, e son pieni di foglie, e son menni, e manchevoli della massima parte delle Stamigne, degli Apici, delle polveri, e delle semenze, e a mala pena tengon qualche raro Apice, tal ora un solo, ed un piccolo Ricettacolo con pochi grani di semenza. Si per certo sono anch'essi mostruosi, chi più, chi meno, i fiori semidoppi; perchè nascon mancanti di tante Stamigne, e di tanti Ricettacoli, o gusci di semenza, quant'è il maggior numero delle foglie, che portano, sopra il consueto numero delle poche foglie, che ha il fior semplice; essendosi osservato nel Capo 41. n. 638, Tratt. 1, che le lor foglie nascono nel luogo medesimo, ed invece de' grani, e delle Stamigne, che si sono in tante foglie trasmutate. La mostruosità de' semidoppi va per

T. II,

M

pic-

piccoli gradi crescendo insensibilmente, dallo scempio passando pian piano ad un numero maggiore, e maggiore di foglie, ed all' istesso passo per contrario ad un numero minore, e minore di Stami, e grani, fin che arrivisi a' semidoppi di primo grado, i quali hanno qualche solo stame con qualche grano; ed è tanto piccola la differenza, che vi ha fra questi, ed i veri doppi, quant' è fra un granellino, e una stamignuola più, o meno, che 'l fiore or produca, ed or lasci di produrre. Quindi da un sì giusto discorso potei sodamente conchiudere, e diluire l' inforta difficoltà, che non era mica frastuono, anzi era cosa naturalissima, che da un padre mostruoso, qual è il fior semidoppio, ne venisser figli, altri più, altri meno, altri egualmente mostruosi; cioè altri doppi, ed altri semidoppi di diversi gradi, come porta la qualità de' diversi accidenti.

123. Spianata questa prima difficoltà, ne insorgea un'altra forse più molesta; dacchè insistendo alla similitudine, che debbono avere i parti a' proprj lor genitori, ne siegue per legittima conseguenza, che i fiori semidoppi debbano produrre fiori semidoppi, almeno per la maggior parte, simili a sé, e per accidente qualche doppio, e qualche scempio; non è vero? Verissimo; chi può disdirlo? questo porta la legge ordinaria, e s' inferisce dal prefato discorso. Or io, ciò non ostante, avea più sperienze in contrario: perocchè, come ho accennato, avea più volte seminata semenza di fiori semidoppi, ed il prodotto di poi quasi tutto di fiori semplici mi sortiva; quasi all' istesso modo, come quando seminava la semenza, tratta da fiori semplici; eccetto che ne ricavava un poco più di semidoppi, e più facilmente qualche doppio.

124. Quindi opponeva io a me stesso, che come dallo scempio lasciato a semenzire in vicinanza del semidoppio, ne veniva qualche raro semidoppio, o eziandio.

dio doppio, in virtù delle polveri, che vi capitavan dal semidoppio, e tutto il resto in gran numero era di scempi, simili alla pianta madre: così ancora per parità di ragione dovria succedere nel semidoppio, lasciato a semenzire in vicinanza dello scempio, che in virtù delle polveri di questo dovrebbe il semidoppio produrre qualche raro scempio, e tutto il restante numero esser dovria di semidoppi, o doppi simili a se. Poichè siccome lo scempio poco s'impregna delle polveri aliene del semidoppio, o perchè poche ve ne arrivano, o perchè le proprie polveri sono a lui più connaturali, e la propria virtù esercitano più efficacemente, che le straniere, e però delle proprie più agevolmente s'impregna; così dovria il semidoppio difficilmente impregnarsi delle polveri dello scempio, scarse, come venute da lontano, e men connaturali, come aliene; e quindi come quello i semplici, così questo i semidoppi, e doppi dovrebbe abbondantemente partorire.

125. Per rispondere all'istanza, non poteva io attribuire l'effetto delle numerose produzioni semplici, fatte dal semidoppio, al maggior numero delle piante semplici, che gli stessero accanto, o alla maggior quantità delle lor polveri, che producono i scempi in molto maggior copia de' semidoppi, e che per ciò andando quelle in maggiore abbondanza da' scempi a' semidoppi, che da questi a' quelli, una prole di scempi più numerosa si venisse a concepire; non potea, dico, valermi di questa disparità, buona per altri casi, ma non per lo mio; perchè usava io per ordinario, di strappar, e levar via le piante scempie, subito, che sbucciava il primo lor fiore, e poche ne lasciava de' più bei colori, confuse fra un numero molto maggiore di doppie, e semidoppie, per farle semenzire.

126. Quindi non trovando esito sicuro per questa via, pensai più tosto, che un tal effetto dovesse provenire da

due altre concause, che pareano meglio adattate: l'una è la maggior energia, ed efficacia, che aver dee, per agire, ed impregnare i grani, lo spirito femminile delle polveri del fiore scempio, rispetto alla minore attività delle polveri del semidoppio: l'altra è una maggior disposizione, che tutte tengon le piante madri, a concepir più agevolmente i grani de' semplici, che de' doppi, e semidoppi; e di qua proceda poi, che venendo a concorrenza le due diverse polveri, quella dello scempio, e quella del semidoppio, dentro un istesso fiore, prevalga per ordinario l'azion della prima; sì perchè ella è più spiritosa, e più attiva della seconda, e sì perchè vien meglio accolta dalla pianta madre, come più conforme alle sue naturali disposizioni; e però dal concorso di queste due concause ne potea seguir l'effetto, da me sperimentato, che sì nel fiore scempio, come nel semidoppio, la massima parte de' grani riuscissero semplici; giacchè nel fiore scempio, lasciato a semenzire, le proprie polveri doveano prevalere sopra quelle, meno efficaci, che gli venivan dal semidoppio; e nel fiore semidoppio, lasciato a semenzire, doveano altresì prevalere le aliene polveri, che gli capitavan dallo scempio sopra le proprie, men generose.

127. Che questo mio pensiero non fosse stato un mero ideale sistema, formato sul verisimile, ma totalmente reale, fondato sulla verità; ma lo persuadeano allora prontamente certe ragioni, che mi sovvennero allamente, e poscia col tempo me lo refero certo più altre notizie, e sperienze. Delle ragioni, che provan le polveri de' scempi più efficaci, e più possenti delle polveri de' semidoppi, una è la maggior gagliardia, e robustezza, che soglion aver le piante di fior semplice sopra le piante de' doppi, e semidoppi. Le loro radici, o i bulbi, ed i semi medesimi, onde nascono, sempre son più grossi, e più polposi, e la pianta ne vien più

al-

altr', e più fronzuta, ed i suoi fiori più sodi, più sani, e più rigogliosi: a tal che senz' ombra di temerità: lo spirito spermatico delle lor polveri si ha da giudicare più nerboruto, più spiritoso, e più abbondante, che non sia nelle polveri de' semidoppi, per esser quelle più vigorose, e a dir così, più maschili, e queste più deboli, ed effeminate.

128. Una seconda ragione più convincente, me la suggeriva la qualità medesima degli uni, e degli altri fiori. Nel fiore scempio non alleva la pianta, che poche foglie, per servir principalmente alla difesa delle polveri, e degli embrioni; e però non ha ella, in che altro impiegare tutto quel suo vigore, che in allevare vegeti, e vigorosi gli Stami, gli Apici, e le polveri prima d'ogn' altro, e dappoi gli embrioni già concepiti. Al contrario nel fior semidoppio dev' ella impiegare tutta la sua sostanza in alimento di un gran fiore, pieno, e talora pienissimo di foglie, le quali, attraendo a se il più, e la miglior parte dell' umore, o ne lo sottraggono affatto da' canali, che debbon portarlo agli Stami, e al Ricettacolo, ed allora i grani non si concepiscono; o ne viene colà tramandato in sì poca quantità, e sì fiavole di vigore, che appena è sufficiente alla concezione, e nutrizione di pochi grani. Ella è cosa ordinaria, che la granitura delle spighe del fior semidoppio riesca poco buona, e soventemente pessima con molti granì voti di germe, o anche la spiga intera, piena di aborti, totalmente si sconcia. Or consistendo nell' azione delle polveri la virtù attiva della granigione, basta sol questo argomento, a provar di quelle polveri molto maggiore la fievolezza, comprovata l' una, e l' altra da un effetto sì proprio, e sì costante, quant' è il disuguale lor granimento. Comparo io i fiori doppi, e semidoppi agli Eunuchi, e non senza proprietà: gli uni, e gli altri son mancanti degli organi, ove si lavora il seme genitale; e gli

e gli uni, e gli altri nel contraggonò il medesimo detrimento della fiacchezza; e simili ancora sono in quell'altro accidente, sì proprio degli Eunuchi, che soglion crescere, or di più alta; ed or di più grossa corporatura, come fanno i fiori doppi, e semidoppi, che si fan tanto più grandi, de' loro scempi.

129. Vi è pure la sua ragione, per ammetter l'altra concausa, consistente in quella maggior disposizione, che tengon tutte le piante, ancorchè sieno semidoppie, a produrre da se prole scempia più tosto, che doppia, o semidoppia. Che le piante scempie sien così disposte, non si può mettere in controversia, portando così la lor naturalezza; ed il dubbio solamente può esser delle piante semidoppie, le quali, par, che dovrebbero inclinar più tosto a fare i figli semidoppi simili a se, e non gli scempi dissomiglianti; giacchè la Natura per quelli, e non per questi deve aver disposta de' lor organi la costituzione. Questo medesimo altresì mi comprovava quella poco maggior quantità di germogli semidoppi, la qual cavava io dalla madre semidoppia, che non ottenea dalla scempia. Non ostante però costessa sua buona disposizione, è da dirsi, che gli organi del suo fiore sieno talmente preparati, che a declinare alla produzion dello scempio, non aspettino altro, che un minimo urto, il qual venga lor dato dalla possente virtù del maschio scempio, tosto che vi arrivino le sue polveri; anzi eziandio senza il concorso di queste, so, per isperienza, che basta un leggiero impulso d'altro, qualunque sia, accidente, per determinar gli organi del semidoppio, a generar facilissimamente i grani scempi: imperocchè nel far poscia le mie sperienze, provava, che dopo aver impedito ogni accesso di polveri scempie al fior semidoppio, pur questo, benchè dalle sole sue polveri fecondato, non mancava mai di dare alcuni scempi dalla sua semenza,

130. Ma io in quel principio, non fui mosso da questa osservazione, quando non avea pur tanto sperimentato; ma fui mosso da tre altre buone ragioni, ad asserir ne' fiori semidoppi la detta disposizione, che hanno, per far gli scempi. Primo, perchè l' effetto medesimo, di veder nascere tanto gran numero di piante scempie da' grani delle semidoppie; fra le quali non eran, che poche piante scempie frammescolate, mi guidava a giudicar, che non solamente le polveri andatevi da' fiori scempi, benchè poche, doveano esser efficacissime, per tirare a se la pianta semidoppia; ma ch' ella pur da se vi dovea essere non poco disposta, ed inclinata, per lasciarsi così facilmente tirare alla generazione di tanti semplici; mentre per altro motivo dovea ella di sua natura inclinar più tosto alla produzion de' simili semidoppi. Secondo, cavava la sua cattiva inclinazione, dall' aver veduto scempiare alcune piante di differenti specie, le quali eran prima doppie; ma più frequentemente vedea d' anno in anno molte semidoppie andar degradando, sino a farsi scempie; qualità, che mostra l' interna lor disposizione, non solamente a far de' figli scempi, ma quel, ch' è più, a scempiar esse medesime le piante madri. Terzo, mi confermava la stessa disposizione il fine della Natura, la qual intende la propagazion delle piante, e la intende con tanta cura, che a questo ultimo fine ha ella avuta unicamente la mira nella struttura di tutto il corpo della pianta, fabbricazione gli organi con tal disegno, che l' principal, ed ultimo lor lavoro fossero i semi, ed i germi delle novelle piante; perchè si voglion sempre vive, per riempier la terra, e sempre più moltiplicate.

131. A questo fine ha ella con tal magistero gli organi congegnati, che stieno sempre disposti alla fabbrica delle nuove piante, e quando quelli ne vengano impediti per contrario accidente, stieno pronti a ripigliar l' interrotto lavoro, tosto che siane levato l' impedimen-

to. Così ella tien pronti gli organi di un tralcio, staccato dalla sua vite; o di un ramo, reciso dal suo tronco, per non farlo miseramente perire, ed anche per farlo in altra vite, o in altro albero risuscitare; tien, dico, pronti gli organi, per produrre, subito che sarà piantato in terra, le sue radici; ma pur quegli organi eran disposti a produrre altri tralci, ed altri rami, quando fosser rimasti sulla pianta natia, ed ora in vece di questi, dal luogo medesimo delle gemme, onde sarebbon nati tralci, e rami, con mirabil metamorfosi nascono le radici; appunto perchè la Natura della moltiplicazione delle piante premurosa, tien quegli organi sempre disposti, e pronti, a dar fuora nuove radici, per aver nuove piante, quantunque volte l'occasione se le presenti. Or questa medesima è la disposizione, che tengono gli organi delle piante doppie, e semidoppie; erano essi prima determinati a fabbricare sterili foglie in vece di Stami, Apici, e sementi; ma tosto che la debolezza, la vecchiaja, o altro qualsivia accidente li disobbliga dal vanamente lussureggiare in foglie, vengon senz'altro determinati, a produrre Stami, Apici, e sementi in luogo delle foglie; e così scempiano, e semenziscono le piante, quasi come follecite di lasciar eredi dopo di se, prima che muojano. Dell' istessa maniera gli organi del Ricettacolo nel fior semidoppio, benchè preparati da se alla fabbrica di grani simili semidoppi, pure son disposti ad ogni minimo determinativo, a mutar la fabbrica de' grani semidoppi, in grani scempi, a seconda delle provide idee della Natura, la quale intende per se la propagazione delle piante feconde, e sol permette con gran ritegno, e riserba, per qualche nostro sollazzo, alcune poche piante affatto sterili, quali son le doppie, assai rare a venire; e quindi le semidoppie son più frequentemente permesse, appunto perchè godono in parte della
fe-

fecondità ; ma le scempie , come feconde ; non mancano mai di venire .

132. Tutto questo , che ho fin qua riferito , fu il discorso , che allora potei formare con quelle poche notizie , delle quali mi trovava fornito , riserbandomi a pigliar più distinte relazioni da periti Ortolani , Giardinieri , ed Agricoltori di certi tralignamenti di piante , i quali mi confermavano molto più sodamente l' idea pensata ; nè pareami , che restasse altro , a fare , se non a metterla in pratica sù i fiori , che teneva già pronti nel Marzo , per vederla ulteriormente confermata colla sperienza .

133. L' idea dunque , e la teoria , che cavasi dal premesso discorso , ella è questa in ristretto . Primo , le piante nascono scempie dalle semenze , concepute da madre , e padre scempi , cioè da pianta scempia , e da polveri di scempio fiore , nelle quali risiede la virtù paterna , e maschile : e nascono parimente scempie le piante da padre scempio , e da madre semidoppia , quando le polveri maschili del fiore scempio vanno ad impregnare i fiori della semidoppia . Secondo , nascono le piante semidoppie dalle semenze , concepute da madre , e padre semidoppi ; e qualche fiata nascono parimente semidoppie da padre semidoppio , e da madre scempia , quando le maschili polveri del fior semidoppio vanno , ad impregnare i fiori della scempia . Terzo , nascono le piante doppie di primo grado più facilmente da madre , e padre doppi di secondo grado , che sono i semidoppi del primo grado , come più vicini di similitudine ; e nascono altresì , ma più difficilmente da madre semidoppia di grado inferiore , o anche da scempia , e da padre doppio di secondo grado , allor quando le sue polveri vanno ad impregnare i fiori della detta semidoppia , o anche della scempia . Quarto , in tutti questi tre casi sempre nascono delle piante scempie , cioè nel primo

T.H.

N

le

le piante riescono tutte scempie, quando nessun grano di semenza venga fecondato da altra polvere, e che di quella sola del fiore scempio; e nel secondo, e terzo caso ne riescono pure alcuni grani scempi, ancorchè non sia intervenuto alcun commercio di polveri dello scempio col fior semidoppio, lasciato a semenzire; appunto per ragion, che la Natura intende di sua primaria istituzione la nascita delle piante semplici per la semenza, e la semenza per la loro propagazione; e per la ragione medesima non intend' ella mai per se le piante doppie, come mostri sterili; e però soglion venire più rare per mero accidente, o come per mero error di Natura,

134. Che il prefato discorso giusto m'abbia guidato alla scoperta del vero, e che le quattro conseguenze ora dedotte sien legittime, e concludenti; oltre le ragioni addotte, le quali almeno ne mostrano tutta la verisimilitudine; mene han mostrata di poi appuntino la verità le continuate sperienze di venti, e più anni in molte varie spezie di fiori, alcune delle quali sperienze ora farò per riferir distesamente. Ed ecco intanto nelle predette quattro conseguenze contenuto, e propagato (e così però in generale alla rinfusa senza certe particolarità, ed eccezioni da soggiugnerti) il promesso segreto, per far venire dalle semenze i fiori doppi, e semidoppi, di bei colori, e di nuove capricciose forme. L' ho detto già sufficientemente in teorica, e ne darò la minuta pratica con le sue necessarie condizioni, e particolarità, mentre che anderò meglio dilucidando, e comprovando il tutto colla recita delle sperienze, dalla pratica delle quali, da me usata con le più diligenti cautele, vien anche ad impararsi la stessa pratica del segreto.,

C A P O XI.

*Confermasi la predetta Teoria cogli
sperimenti.*

135. **L**E prime sperienze, che conferman la verità dell'esposto pensamento, e che mene diedero il primo lume, sono i cennati tralignamenti, de' quali aveva io udito raccontar qualche cosa superficialmente; e però me cercai subito la certa notizia dagli Ortolani, che dovean saperli. Avea udito dire, che la semenza del Cavolfiore suole spesso degenerare, ed in vece di Cavolfiore produca il Broccolone, il quale in Sicilia, ed anche in Malta, dove allora mi trovava, chiamasi Broccolo bastardo, appunto perchè traligna dal genitore. Il simile udito avea della semenza del Cavol Cappuccio, ch'ella bene spesso in vece de' Cappucci dia Cavoli di oblungo torso, che qui chiamano Cavoli Braschi, nome derivato dal latino *Brassica*, che significa il Cavolo. Sopra tali notizie discorrendo fra me stesso, giudicai, che questi due tralignamenti non fosser mica diversi da quelli, che pensato avea delle semenze de' nostri fiori, e che la cagion ne fosse totalmente la medesima. Si per certo; perchè siccome ne' nostri fiori è facilissimo il passaggio delle polveri da una in altra pianta del medesimo giardino; così negli orti, ove piantansi, e fioriscono all'istesso tempo diversi generi di Cavoli, e Broccoli, passino da queste in quelle piante; e quelle, che sono in se più spiritose, e godono di una maggiore attività, impregnino i fiori delle straniere madri, ed i grani di specie aliena si concepiscano.

136. Quanto, e come aveva io pensato, il tutto, e appuntino così mi han confermato a voce concorde tut-

ti gli ortolani, a cui ne ho dimandato: Dicono, esser verissimo, e frequentissimo l'uno, e l'altro tralignamento, e che succeda così; che tralignino le dette sementi tutte le volte, che fioriscano insieme il Cavolfiore, e'l Broccolo, il Cappuccio, e'l Cavolo ordinario, quando sien piantati in ripartimenti vicini, o soltanto, che sciambevolmente si veggano. Quindi è arte propria de' Maltesi, (dico io, e non già particolare virtù del loro clima, e terreno, come in Sicilia falsamente apprendesi,) il far buona, e legittima la semenza del Cavolfiore, la qual noi qua facciam venire da Malta; perchè dopo qualche anno la nostra suole imbastardire, producendo Broccoloni: ma ho io per sicuro, che imbastardisca più tosto per la negligenza, ed ignoranza di ciò, che sto dicendo, che per lo clima, o per lo terreno; perchè non usano i nostri ortolani l'arte medesima de' Maltesi.

137. Tutta l'arte consiste nella cautela, di tener lontani da ogni sorta di Cavoli, e Broccoli que' piedi di Cavolfiore, che si lasciano per semenzire: attesochè se ad un tempo medesimo questi, e quelli fioriscano, è certo, come tutti attestano ancora i nostri Ortolani, che la semenza degenera in Broccoloni. Mi attestò l'antico spertissimo Castaldo della nostra villa, che teneva egli due partite di Cavolfiore in due luoghi differenti; in uno de' quali si trovavan vicini Broccoli ordinarij, che fiorirono circa quel tempo, ma nell'altro luogo erano soli, e lontani i Cavolfiori. Lasciò egli a semenzire degli uni, e degli altri; ne raccolse le semenze, e separatamente dappoi le seminò: ma dalla semenza, nata da quella partita di Cavolfiore, che stava in vicinanza de' Broccoli, gliene venner semenze, onde poi ne nacquerò Broccoloni; e dall'altra, che stava in lontananza, ne riuscì semenza di Cavolfiore legittimo, e naturale, dal quale ancora n'ebbe altra buona semenza la seconda,

da; e terza volta, finchè usò la medesima precauzione; e dal mancamento di questa ne venn'ella finalmente imbastardita.

138. Ella è similmente arte propria de' Genovesi; il far venire buona, e legittima la semenza de' Cavoli Cappucci, ed essi da Genova a noi la portano; non già perchè qui non si possa far sortire legittima, quando si usi l'arte medesima, (e sen'è fatta pruova, che riesca ottima;) ma perchè a' nostri Ortolani costa poco il comprarla, e par loro, che costerebbe qualche cosa di più la diligenza, e l'arte, che, per averla buona, debbono praticare. Ne dico l'arte per profitto degl'industriosi, che non la sapessero, e metter la volessero in opera, come insegnata mi viene dallo stesso perito Castaldo, e come l'ha egli praticata con prospera riuscita. Tagliato il Cappuccio, quand'è già maturo, ne resti il tronco di un palmo in circa sul terreno: s'esso quivi resta scevero, lontano, e segregato da ogni altra specie di Cavoli, e Broccoli, che possano allo stesso tempo fiorire, si lasci stare, dove sta piantato; o altrimenti bisognerà trapiantarlo diligentemente, acciocchè non patisca troppo que' detrimenti, che seco porta il trapiantamento, e si metterà in altro luogo remoto, e solitario. Tosto darà fuori de' novelli germogli, de' quali si strappino i superflui, e sene lascino solamente quattro de' più rigogliosi, ed a questi pure si mozzì la cima, lasciandovi sol pochi germogli laterali a semenzire, acciocchè così que' pochi vengano più robusti; ed in tal maniera ne riuscirà vigorosa, legittima, ed ottima, qual si desidera, la semenza.

139. Ed ora qui è luogo proprio a riferire il trapiantamento, altrove accennato nel *Tratt. 1. Par. 2, c. 29 n. 394*, e promesso qui a raccontare in confermazione del nostro assunto. Mi trovava io un giorno a goder de' fiori nel delizioso giardino del Sig. Duca di Cefalà, ed

al mio solito, ansioso di cavar qualche buon documento da' periti nell' arte propria, mi posi ad interrogare il vecchio, e savio giardiniere di quella villa, se avesse mai alcun esempio, che le piante imbastardissero? Oh sì, mi rispose, ne ho un esempio, riuscito a me pur troppo doloroso, per avervi perduta la spesa, e la fatica. Mi trovava piantati due dipartimenti vicini, e contigui fra se, uno di Cavoli, e l'altro di Broccoli, che qui chiamiam Gennaroti, i quali si maturaron insieme circa il mese di Gennajo; ed io ne lasciai d' entrambi alcuni piedi, per averne la semenza, e mi fiorirono allo stesso tempo; e bell', e granita la maturarono. In questa semenza avea io riposte per lo venturo anno le speranze mie di un buon guadagno; e ne potei riempiere due gran chiusure di terreno, le quali non lasciai di coltivar con ogni cura, acciocchè le piante ne venisser d'ottima condizione: vi nacquero prosperamente; ma col tempo cresciute a stato da poterli discernere questi per Cavoli, e quelli per Broccoli, io ancora non sapea distinguere nè se fosser Cavoli, nè se fosser Broccoli; ed ebbi poi a restare stupito, e confuso, quando pervenuti a qualche maturità comparvero di una terza specie, come una cosa di mezzo tra Cavoli, e Broccoli. Maggiore fu la mia confusione, quando non trovava la maniera da poterli vendere, nè come Broccoli, nè almeno come Cavoli; perchè i compratori, al veder quegli insoliti mostri, nè per l' uno, nè per l' altro titolo li degnavano; e però stentatamente a vil prezzo sol potei con molta mia perdita barattarli. Quindi, egli soggiunse, gattigato io, e reso cauto dal patito discapito, non mai più in avvenire mi arrischiavi, a seminare unitamente nel mio orto dell' una, e dell' altra specie, di maniera che insieme fiorir potessero; ma per istar più sicuro, tutto il terreno ora di soli Cavoli, ed ora di soli Broccoli, alternando, seminava.

In

140. In questa medesima parlata fu, che io tornando ad interrogar questo Filosofo rurale, lo addimandai, che mi spiegasse la maniera, come avesse potuto succedere il riferito fenomeno del tralignamento: ed ei rispose più che da buon filosofo, come già ho riferito nel luogo sopraccitato, che a parer suo qualche cosa dovea necessariamente andar da' fiori d'una spezie a' fiori dell'altra spezie di Cavoli; e che tal cosa poteva esser l'odore, o sia l'alito del fiore, o altra simil cosa trasferibile, ch'ei non sapea, e che per avventura potea esservi trasferita dalle Api, e da più altri animalletti, mentre vanno a zonzar pe' fiori in busca del mele, e del proprio lor cibo. Un altro simile tralignamento, ma più avventuroso, mi raccontò egli, succedutogli ultimamente; avea piantati in due luoghi, non troppo lontani, Broccoloni, e Cavolfiori, i quali essendo fioriti circa il tempo medesimo, poterono agevolmente gli uni partecipar delle polveri degli altri, e d'aliena virtù concepir le sementi, come poi confermò l'avvenimento: dacchè la semente del Calvolfiore, benchè per la maggior parte date avesse le piante della sua spezie; pure non vi mancaron de' spurj Broccoloni, e la semente di questi con felice successo, raro ad accadere, diede non poche piante di Cavolfiore.

141. Or chi non vede ne' riferiti tralignamenti, sì certi, e sì volgari negli ortaggi, primo, che la vera, e principal origine, ond'essi derivano, non è altra, che la mistura di due differenti virtù generative, quando la maschile, che sta nelle polveri de' fiori, alla femminile, che sta nel Ricettacolo, di spezie, o di sorte differente si accoppj? nella maniera medesima, che dall'accoppiamento di due diversi animali, o di spezie, o di fattezze differenti, la prole mista dell'uno, e dell'altro ne risulta. Ed applicando il medesimo corollario al fatto nostro; chi è, che non vede ne' tralignamenti, sì certi, e sì volgari nelle piante de' nostri

fior.

fiori, venute da semenza, quand'esse mutano tanto frequentemente, e ne vengono alterate, tanto notabilmente dalle fattezze della pianta lor genitrice, ed i lor fiori riescon così varj fra se nel colore, nella doppiezza, o scempiezza, e nella stessa integrità de' membri, e così varj dal fior materno, che ne generò le semenze? Chi è, dico, che non vede la vera, e principal origine, onde derivano tali, e tanti cambiamenti, che deggia esser la missione della virtù maschile delle polveri, venute da' fiori delle vicine piante, che per ciò i semi nel Ricettacolo, così mutati, ed a se dissimili, concepisce?

142. Secondo, chi può mica dubitar più, che le polveri de' fiori, dotate di virtù generativa, passino da una in altra pianta per opera degl' Insetti, come fu nel Tratt. 1. dimostrato, e vi vadano facilissimamente, e frequentissimamente, come ora si può dedurre dalla facilità, e frequenza de' suddetti tralignamenti, che vi cagionano; poichè impreteribilmente succedono ne' generi de' Cavoli, e de' Broccoli, ogni qualvolta sien essi vicini, o a vista, ed insieme al medesimo tempo fioriscano? E però chi può similmente dubitare, che le polveri de' nostri fiori vadano da una in altra pianta per opera del numeroso stuolo di tant' Insetti, che van continuamente girando pe' fiori, e feco inevitabilmente portano attaccate al pelo so, o anche all' irsuto lor corpo le polveri, da se resinose, e attaccaticce; e che di più ciò deggia succeder facilissimamente, ogni qual volta le piante de' nostri fiori stien vicine, o a vista; e quando fiorisca in un istesso tempo delle lor varie razze la fioritura?

143. E' da notare ne' precedenti esempi, che nella missione delle due differenti virtù generative, la virtù del cattivo suol prevalere sopra la virtù del buono, e più agevolmente il cattivo tira a se il buono, che non il buono tira il cattivo, per farlo degenerare; perocchè

il

il Broccolo per lo più prevale sopra il Cavolfiore, e lo fa degenerare in Broccolo; essendo cosa rara, che mai succeda il contrario, e come un fatto straordinario raccontava il suddetto giardiniere, che dal Broccolo ne sia venuta semenza di Cavolfiore. Così prevale il Cavolo volgare sopra il Cappuccio, nè mai ho sentito dire il contrario, che dal Cavolo ne venga semenza di Cappuccio. E così finalmente nel terzo esempio mi giova credere, che nella mistura di Cavolo, e Broccolo l'apparenza, e la natura di Cavolo più tosto, che di Broccolo vi dominasse.

144. Ma s'ella è così notoria nel gener de' Cavoli, e de' Broccoli del cattivo sopra il buono la prevalenza, con questi splendidi esempi viene a confermarsi maggiormente l'asserita prevalenza de' Cattivi fiori, che son gli scempi, sopra i buoni, che sono i semidoppi, a motivo della maggior potenza, e gagliardia delle polveri di quelli sopra di questi; e ne vengono pur confermate le ragioni, ivi addotte, a provarne la maggior possanza: perchè in effetto per queste medesime ragioni hanno maggior gagliardia le polveri del Cavolo, e del Broccolo sopra le polveri del Cappuccio, e del Cavolfiore. Conciossiachè il Cavolo, e 'l Broccolo son di natura più robusta, come si è detto delle piante di fiore scempio, e non allevano gran quantità di foglie, nè un troppo gran fiore; e per ciò tutta impiegano la propria robustezza, e sostanza, in allevare bene gli Apici, ed in dare spirito, e vigore alle polveri prima, e poi alle semenze: all' opposto i Cavolfiori, ed i Cappucci sono in certa maniera, come piante doppie nel suo genere, di più tenera, e di più gentile complessione, ed obbligati sono a nutrire una massa molto maggiore di foglie, e fiori, massime le numerose ampie foglie del Cappuccio, e 'l florido, vasto Tirso del Cavolfiore; e quindi le lor polveri d'ordinario

ne riescon fiavelle, e meno attive di quelle del Cavo-
lo, e del Broccolo; a tal che venendo ambedue a com-
petenza in un medesimo talamo, queste ultime impre-
gnano il Ricettacolo di granì della sua stirpe, e l'azione
di quelle, ancorchè nel talamo proprio, riman frus-
trata.

145. Appunto per rinvigorir la debolezza del Ca-
vol Cappuccio, cred' io, che ad aver legittima, e ben
granita la sua semenza, uopo è, d'usar l'industria in-
segnata, di troncar il Cappuccio, di strappargli i ger-
mogli, e lasciarne pochi, ed a questi medesimi mozzar
la cima; la quale industria par, che possa usarsi auco-
ra nel Cavolfiore, (e forse l'usaranno i periti, ma non
ne sono informato) ed io l'ho praticata in una simil ma-
niera ne' nostri fiori, e la insegnerò, con ottimo riusci-
mento; perchè la pianta così sgravata, s'ingagliardisce,
ed ai pochi allievi, che le si lasciano, più copioso, e
più sodo può ella il latte partecipare; onde ne vengano
spiritosi le polveri, ed i semi corpulenti, e legittimi,
e di miglior granitura.

146. Più altri tralignamenti raccontansi; ma nè tut-
ti pajon veri i racconti, nè tutti son veri tralignamen-
ti: que' però, che sono veri, confermano sempre più la
verità della lor cagione, ch'ella sia per ordinario la da
noi asserita, cioè l'arrivo al fiore delle polveri stranie-
re d'altra sorte di pianta, e di qua ne derivi de' fiori
spurj, il concepimento. Non può negarsi, e noi lo as-
seriamo, che certi accidenti, e circostanze di clima di-
verso, di qualità di terreni, di varia coltura, or dili-
te, or negletta, d'intemperie di stagioni, or per cal-
do, or per freddo, or per eccesso di pioggia, o per sic-
cità, questi, dico, e simili altri determinativi sieno abi-
li, a cagionar nelle piante, ne' fiori, e nelle lor semen-
ti delle notabili alterazioni accidentali; ma pur la cau-
sa più ordinaria, o forse unica degl'imbastardimenti ve-
ri

ri, sostanziali, ed originarj, che sortiscon dalle semenze, deggia ella esser la già detta, come la più proporzionata. Di quest' altri tralignamenti, e della maniera, come ottenerli per arte, cavata dalla teoria del nostro secreto, per aver piante nuove d'una terza spezie, la qual sia di due, o eziandio di più varie spezie composta, differisco a trattarne più abbasso separatamente, per non interrompere il filo qui degli esperimenti da me fatti, de' quali si sta ora in curiosità, per la total conferma del vero, che a forza di mero discorso s'era di già rintracciato.

C A P O XII.

Sperimenti proprj sulla medesima Teoria.

147. **N**On son io qui per riferir tutti a uno a uno que'tanti sperimenti, che son andato facendo per lo corso già di venti, e più anni; tentandone sempre de' nuovi in varie spezie di piante, ed i già fatti più volte replicando; ma per evitar la noja, che feco porterebbe la replica di cose simili; mi ristringo solamente a que' pochi, ne' quali è qualche diversità, e nuovo lume porgono, e nuova istruzione per la buona pratica ci suggeriscono. Per far tutte insieme in un anno le principali pruove, lasciai a semenzire molti fiori semidoppi di secondo, e di primo grado, pieni, o pienissimi di foglie, di pochi Apici, e di piccola spiga; e perchè da questi sperava io il ristabilimento del perduto capitale, per arricchirmi in un anno di buone razze di Ranuncoli; di questi fiori lasciai a semenzire la maggior quantità, ed a questi rivolsi la principal mia cura. Lasciai pur a semenzire alcuni Ranun-

colli semidoppi di grado inferiore, e pochi altri propriamente scempi di bei colori.

148. I testi, ov' erano separatamente fra sè soli questi tre assortimenti di fiori, furon da me segregati, e situati mediocrementemente lontani gli uni dagli altri, ciascuna sorte per sè sola; ma non tanto lontani, che non istessèr a vista, e che gl' Insetti volanti non vi potessèro esercitare agevolmente il solito trasporto, e lo scambievol commercio delle polveri femminali: poichè a quel tempo, come ho detto, non sospettava io niente di tal guoco d' Insetti, di poi da me scoperto; e sol pensai, a premunirmi dalla forza del vento, collocando i vasi, tanto fra sè discosti, che coll' aura del vento, secondo l'error comune, arrivar non potessèro così agevolmente le polveri da un testo all' altro di que' diversi assortimenti. Questa negligenza incolpabile sì, ma pur pregiudizievollissima, fu in qualche modo rimediata colla diligenza di avere strappate, e levate via tutte le piante semplici, eccettuate quelle poche, che servivano allo sperimento, acciocchè non m' infettassèr collè lor maligne polveri i fiori stelti, e le semenze.

149. Disposte così le cose, osservava ogni giorno i fiori destinati alla semenza, per veder, quando i lor Apici cominciassèro a screpolare, e a dar fuora le polveri; segno essèndo sicuro, che allora cominci a correre il giusto tempo, destinato dalla Natura alla fecondazion del Ricettacolo; ed allora io ammaestrato dalla stessa Natura, dava principio ad usar dell' arte premeditata, di pigliar le polveri straniere d' altri fiori, ed applicarle a cotesti, lasciati a semenzire, affin d' impregarli colla virtù femminile delle polveri altrui, e per ingenerar ne' ferì le qualità proprie di quegli altri fiori.

150. Insegno qui l' arte importantissima dell' applicazione dellè polveri, della quale più volte d' ora innanzi dovrem parlare, acciocchè se ne sappia la giusta

ma-

maniera di praticarla. Nelle ore calde matutine, o meridiane, quando i fiori son totalmente aperti, e quando gl' Insetti vanno in giro, tirati, e guidati providamente da Dio col lecco del mele, a portar la fecondazione ai semi; quello appunto è il giusto tempo del lussureggiar de' fiori, dell' applicazione delle polveri, e del concepimento de' grani; e però allora più utilmente dovremo anche noi le polveri colle nostre mani applicare; ciò, che si può fare in due maniere. Si osservano i fiori destinati per padri, e vedendovi gli Apici spalancati, e carichi di polvere, come ho detto; giusto allora saran' eglino maturi, ed opportuni, per fecondar le madri, destinate alla produzion della semenza. Si collegano i fiori, e coi loro apici toccando, e leggermente fregando la spiga, o la cima della tromba del fior materno, finchè ne resti di polver tinta, farà così celebrata la nuova foggia dell' innesto, che altri direbbe più propriamente matrimonio.

151. Se i fiori saran vicini, o i testì si potran trasportare, di modo che un fiore arrivar possa a toccar l'altro, neppure fa d'uopo di cogliere il fiore; e potranno ambidue servir di padre, e di madre, fregando gli Apici dell'uno sopra la spiga, o la Tromba dell' altro, e così entrambi resteran fecondati scambievolmente; come le Lumache, feraci ambidue di semenza. Alcuni, a' quali è stata da me comunicata quest' arte, hanno specolata una ulterior diligenza; cioè lasciano i due fiori, da maritarsi, sopra le loro piante, e mentr' essi stanno aperti, e polverosi, gl' accozzano insieme testà con testà uno contra dell' altro, legandoli con filo insieme, e così affrontati, li tengono per alcuni giorni, finchè pajà lor, ch'è siensi vicendevolmente fecondati.

152. La seconda maniera, per far l' innesto, serve specialmente per quelle sorte di fiori, ne' quali non son così esposti, ed eminenti gli Apici, e la Tutà, o la Spi-

ga, come son v.g. ne' Ranuncoli, e negli Anemoni, ma son bassi, e riconcentrati nel fondo del fiore, o tra le folte foglie imbarazzati, e nascosti, come appunto son ne' Garofani; ed in questo caso, siccome anche può farsi nel primo, bisogna usar la violenza di castrare il padre, tagliando destramente colla punta delle forbici, o strappando con mollette le Stamigne cogli Apici polverosi; e colle forbici, o mollette medesime si van gettando gli Apici nel cuor del fiore materno, procurando, di farli toccare, anzi di farli restare sopra la Tuba, o Spiga, per impolcicarla. Ma quando i fiori fosser molto distanti, o si volesse far di più polveri differenti un confuso miscuglio; gli Apici troncati si metteranno in una carta, ed insieme raccolti, si anderan poi gettando colle forbici, o mollette nel cuor de' fiori; e tanto basti per la presente istruzione.

153. Usando dunque dell' arte ora suggerita, per far le mie sperienze tutte in una volta, cominciai primo, a dar polvere di fiori semidoppi di primo grado, dai quali pretendeva ottener ottima, e copiosa semenza, per quindi ricavar ottime piante di fiori doppi, e semidoppi. Secondo, ad alcuni di questi fiori non diedi polvere de' lor pari, ma polvere di scempi, e li notai diligentemente, per poi veder la riuscita delle lor semenze, se tutte, o nella massima parte scempiassero, come fondatamente potea presumersi. Terzo, de' fiori semplici ad altri diedi polvere di fiori similmente semplici, ad altri di fiori semidoppi di primo grado, ad altri di fiori semidoppi di altro grado inferiore. Quarto, ai semidoppi d' inferior grado diedi polvere d' altri a se pari, e ad alcuni di scempi, e ad alcuni di semidoppi di primo grado. Era uopo far tutte queste varie combinazioni, per provar se i parti venisser tai, quali, e simili ai genitori, e se la mistura dal maligno scempio infettasse, e sopra tutti prevalesse colla sua malignità

tà: All' istesso passo veniva io a fare sperienza della variazion de' colori, ed a provar, s' ella derivi dalla virtù delle polveri di più fiori di vario colore, come ragionevolmente dovea presumersi: e quindi ad altri de' suddetti fiori applicai polvere di fiori dello stesso lor colore, per veder se riuscissero i figli di un sol colore, e del suo proprio invariato; ad altri applicai un sol colore diverso, e ad altri più differenti colori, per veder, se riuscisser misti, e picchiettati di più tinte. Il tutto veniva da me notato con segnali ne' vasi, ed il tutto in carta per ajuto della memoria fu distintamente registrato.

154. Continuai per parecchi giorni a somministrar nuove polveri coll' istesso metodo, e diligenza; finchè gli Apici propri de' fiori da semenza, già tutti aperti, ed appassiti davan segno, di essersi già compiuta de' semi la concezione. Dopo di che passati alquanti giorni, potei aver la consolazione di veder avverato uno de' principali buoni effetti, che sene potea sperare. Dacchè le spighe de' fiori, come inebbriate dalla copia delle polveri così proprie, come aliene, mostrarono una granigione cotanto straordinaria, che i grani tutti esorbitando risaltavan da' loro gusci per la grossezza, e molti quasi ne scoppiavan di pienezza, avendo cacciato fuori fin' anche la piuma, o sia le prime foglie del germe, e con mio stupore sulla stessa spiga ne germogliaron bell', e verdeggianti, come altrove sen' è fatta menzione.

155. E qui voglio, che s' apprenda ancor meglio l'importanza di quest' arte, di dare al fiore le polveri altrai. Fu ella da me pensata, per averne tre grandi utilità, tutte già comprovate dalla sperienza. Primo, per l' effetto ora detto, di far meglio granire la semenza; e quand' ella riesce più granita, ne vengono le piante, ed i fiori più rigogliosi, e pieni di foglie,
e più

e più facilmente doppi. Secondo, ella è una necessità, di dover applicar le polveri, prese da altri fiori, a que' fiori, che di lor natura son del tutto menni, e manchevoli d' Apici, e polveri, o ne sono assai poveri; e tali son per lo appunto que', da' quali, più che da ogn' altro, sperava io allora i doppi: perocchè questi fiori più scelti, e pieni, soglion venire molto facilmente, (avvengacchè non unicamente, come poi dirò,) da simili altri semidoppi di primo grado, i quali, come pienissimi di foglie, sovente non portan altro, che 'l solo picciol bottoncino, o spiga di semenza; e se tengon qualche stamignuola, ella è sola senz' Apici; o se vi son Apici, son pochi, e smunti, e le polveri scarse, e fiavoli tanto, che i grani o non si concepiscono, o riescono mal graniti: e però se vogliam semenze ottime, e fiori ottimi dalle semenze de' fiori doppi, o semidoppi; bisogna adattarci, ad ajutar la Natura coll' arte, ov' ella manca, cercando, e pigliando da' fiori più scelti, e pieni le polveri, ed applicandole industriosamente colle nostre mani a que' fiori, che ne tengon necessità. Terzo, coll' uso di tal arte noi possiamo avere i fiori delle semenze di tutti que' colori, che desideriamo, purchè que' colori vi sieno ne' nostri fiori: secondochè faranno i colori del fior da semenzire, e del fiore, onde vengon tratte le polveri; i colori medesimi verranno contratti da' figli, che da tai genitori ne nasceranno, come di sopra ho accennato, e come in appresso la giusta pratica ne prescriverò.

156. Raccolte le mie semenze col buon augurio di sì prospera granitura, le conservai separatamente, ciascuna col suo notamento in iscritto, secondo le lor varie diversità. Intanto potei fin d' allora accertarmi del lor felice riuscimento con altra presunzione, o più tosto argomento di sode sperienza, che l' accidente mi portò innanzi avventuratamente. Il Sig. Fr. Luigi Agostino

Godeheu Parigino della Sacr. Relig. Gerosol. mio buon amico, e dilettante di fiori, trovandosi allora in Malta, s'era fatta venir da Francia qualche quantità di radici di Ranuncoli, tutti di buone razze, o doppi, o semidoppi, senza infezione alcuna di scempi. Da questi l'anno avanti ne avea egli raccolte le semenze così alla rinfusa, senza veruna industria, o arte, che mai sapesse, la qual poscia gli fu da me comunicata, per aver buone le semenze; ed avendole seminate nel suo giardinetto della Floriana, produsser fiori, così belli, grandi, e pieni nella maggior parte, ch'ei ne restò sorpreso, e contentissimo; ed io ammirato pure ne fui, quando m'invitò un giorno a vederli: che se non superavano nella doppiezza que' venutigli dalla Francia, alcuni però gli emulavano, e quasi tutti li superavano nella pompa de' colori, e nella grandezza del fiore straordinaria.

157. Io, che in quel tempo appunto formato avea il mio sistema, e lo stava mettendo in opera, lo interrogai, d'onde avute avesse quelle preziose semenze; e rispondendo egli, che l'avea colte dalle sue medesime piante, che io li vedea fiorite, già subito compresi la vera origine, ond'eragli derivato tutto quel benemerzecchè guardando per tutto il giardinetto, non vi si scopriva un sol fiore, che fosse scempio; ed egli, benchè non prevenuto dall'importante notizia del maligno influire, che hanno i scempi, per far degenerar le semiamenti; mosso da mero decoro del suo giardino, non tollerava in esso fra tante nobili piante l'indecorosa comparsa di verun fiore scempio; e subito ne strappava la pianta, tostochè al primo fiore, d'esser ella scempia, si appalesasse. Quindi egli, senza saperlo, liberava i suoi fiori dalla cattiva influenza degli scempi, e non vi essendo nel suo giardino altro, che fiori doppi, o semidoppi d'alto grado, non potea esser, che sempre buono, e di scelte razze: l'inlusso delle polveri femminali, che ne givan

da un fiore all'altro; laonde non doveano esser, che buoni i semi, che se ne concepivano, e di simili buone razze le piante, che ne nascevano. Confrontando io dunque l'esempio di questi semi, e di questi fiori con altri esempi di semenze, da me più volte seminate, e riuscite nella massima parte di fiori assai dozzinali; perchè sempre pigliate o da fiori semplici, o da semidoppi di minor grado, ed allevati in compagnia di più fiori semplici; dal confronto de' due contrarj esempi potei dedurre sicuro presagio della buona riuscita delle mie semenze; perchè tenute anch'esse lontane dal contagio de' scempi, ed eziandio ne sperava una miglior riuscita per l'applicazion delle polveri aliene, da me fatta industriosamente, affin di migliorarne la granitura.

158. Darò più abbasso altri simili esempi di maggior conferma, ed intanto ne vengo all'esito delle mie semenze, le quali poichè furon seminate tardi, per la maggior parte diedero il fiore nell'anno seguente, quando mi portai in Palermo. Qui vi la riuscita di quelle, che raccolte avea da migliori fiori, e colle polveri d'altri lor pari innestate, fu tal, quale speravasi; produsser fiori di maraviglia a chiunque vedea, bell'e gai di più colori, straordinariamente grandi, e pomposi, ed in molto numero pieni, e ricchi di foglie, per lo più semidoppi di alto, e di mezzano grado, e non vi mancavano i suoi veri doppi di prima sorte, come che sieno questi rarissimi a venire di lor natura. Della bellezza di questi fiori, e moltitudine insolita di tanta quantità di buone razze, che in un sol anno, da fallito, mi fecer ricco, furono ammiratori, e testimonj parecchi. Dilettanti, che vennero a vederli, ma sopra tutti ne restò preso il nostro P. Pietro Maria Ferreri del mestier de' fiori passionatissimo, e praticissimo per l'esercizio di lunghi anni; il qual prevenendomi per lo vengente anno, a farlo partecipe di sì squisite semenze, ne fu da me do-

doviziosamente provveduto, e n'ebbe fiori tanti, e tanto degni, che meritaronfi d'andare in giro per le case de' Fioristi.

159. Confesso però schiettamente, che per questa prima volta gli scempi, ed i semidoppi di bassa lega, sebbene sieno stati la minor parte, pure non furon sì pochi, che non vi si conoscesse chiaramente l'infezion delle polveri degli scempi, arrivata, ad ammorbar gli scelti fiori, che produsser tal semenza. Quegli scempi, benchè pochi, da me lasciati, per far di loro sperienza, ancorchè segregati a distanza di più pertiche; quanto pareami, che bastata fosse, a non potervi arrivare col fiato de' venti il lor maligno contagio; pur esso vi pervenne, e le lor polveri ebber l'attività d'infettare i buoni fiori, e di fare i semi degenerare. Quindi pres'io nuovo argomento, ad aver per falsa l'opinion volgare, che alla forza del vento il trasporto delle polveri d'una pianta all'altra solea attribuire. Allora fu, che cominciai a pensar più seriamente ad altro più vero mezzo di cotale trasporto; acciocchè conosciuto una volta, guardarmene potessi, per ovviarne il grave danno; ed essendomi poscia accorto, ch' eran gl' Insetti volanti, consolatissimo della importante scoperta, pensai tosto alla maniera (altrove accennata, e da dirsi ora altra volta) come potermi premunire dalla molestia dell' importuno lor traffico; acciocchè nella preparazion, che dovea farsi delle nuove semenze, starbar più non mi potesser gl' Insetti col loro accesso la continuazione d'altri più esatti sperimenti.

160. L'esito altresì delle tre altre varie combinazioni, e preparazioni di semenza, sopra esposte, corrispose per l'appunto all'idea, che sen'era concepita: cioè da' semi de' buoni fiori semidoppi, anche di primo grado, ma innestati con polveri di scempi, ne sortiron pochi fiori buoni, o più tosto mediocri, e nella massima

quantità sortiron cattivi: da' semi de' semplici innessati con polveri di semplici, ne venner quasi tutti semplici con qualche raro semidoppio; e da' semplici, innessati con semidoppio, sen' ebber parecchi semidoppi: così ancora da' semidoppi d' inferior grado, innessati con semidoppio, sen' ebber molti simili semidoppi; e da' semidoppi con scempio sene ricavò il maggior numero di scempi, dominandovi sempre più la scempiezza, e 'l cattivo tirando a se il buono in tutte le combinazioni, ovunque del pestifero scempio eran le polveri intervenute.

161. Solamente la pruova della mutazion, e mistione de' colori riuscì alquanto mendiciva, e non senza giusta ragione: attesochè gl' Insetti avendo esercitato liberamente fra tutt' i miei fiori l' incessante commercio delle polveri, portandole, e riportandole di quà, e di là; ebbero a confondersi i colori da me ordinati, e pretesi; e però ne venner molti di più altri colori disparati, e diversi, da que', che sortir doveano dalle varie mie combinazioni. Non per tanto però fra la varietà di tanti differenti colori, vi si vedean sopra tutti gli altri dominare in maggior numero, e quantità i colori preordinati, e competenti alla disposta combinazione: giacchè i fiori o portaron quel colore, di cui erano i genitori, o ne teneano almeno qualche tintura. Così mi ricordo, d' aver innessato giallo con giallo, e d' averne ricavata di gialli, o di giallo misti, tanta gran quantità, che chiaro conosceasi ne' figli 'l color, e la simbianza de' genitori: così ancor fu notabile 'l numero de' fiori, gentilmente screziati di più tinte, nati da que' semi, che furon preparati con mistura di molte polveri di fiori di color vario. Quindi mi fu già sodamente confermato dalle riferite prime sperienze, ancorchè tuttavia imperfette, l' esposto sistema, e tutta la teoria, per far venire da' semi le piante di fior doppio, e semidoppio,

di bei colori , e di vaghe , e nuove forme , com' era stato promesso: ma nuove altre, più evidenti conferme ne daranno gli sperimenti più esatti, da riferirsi.

C A P O XIII.

Altri sperimenti più esatti, in conferma dell' esposta Teoria.

162. **C** Onosciuto il cattivo influire , che fan le polveri femminali de' fiori semplici , e l' vero mezzo , e maniera , come vanno anche lontano ad infettare i buoni semi , agevol cosa mi fu , liberare i miei fiori dalla lor rea contagione . D' allora in poi tostochè mi accorgea dal primo fior , che sbucciava , ch' esso era scempio , o semidoppio di poche foglie , senza perdervi tempo , per ordinario lo strappava con tutta la pianta : o se per aver bisogno di molti fiori , era io costretto , a trattener anche le vili razze per qualche tempo ; in quel mentre non lasciava fiore alcuno , a far semenza ; e quando poi veniva l' ora da farla , strappava , e gettava via tutte affatto le piante ree , per torre agl' Insetti ogni occasione , da poter adulterar le razze più elette.

163. Con questa unica precauzione , di levar via tutte le piante vili , e trattener le sole nobili , senza infastidirsi a far degl' innesti industriosi colle proprie mani , ma rimettendoli in balla degl' Insetti , che non mancheranno , a farneli da se soli , si potrà ottener da' semi circa una metà per lo meno , e più ancora di belli , e buoni fiori , da poter arricchire qualsiasi gran giardino . Così ho insegnato a praticare a' Fioristi neghittosi , che attedianfi , e a' rozzi , o poltroni Giardinieri , che o non fanno , o non voglion le mani adoprare con destrezza , per valersi degl' innesti , i quali fruttano mol-

to più di fiori , doppi , rari , e capricciosi , e rendono poco men , che il cento per cento di pieni , e vaghissimi semidoppi .

164. A questo proposito di dover via levar gli scempi , e vili fiori , per l'utile , che ne proviene , oltre l'esempio sopra descritto , ne aggiungo un altro contrario , del danno , che cagionan gli scempi , per fare i buoni semi degenerare . Nel primo anno , che fui in Palermo , mi portai a veder nella strada di Morreale il pulito giardino di frutta , e fiori del fu nobile Sig. D. Carlo Napoli , Avvocato di sommo grido ; e vi trovai un ottimo assortimento di fiori , universalmente degni , da' quali l'anno avanti l'accurato Giardiniere colti avea buona quantità di semi , e da questi n' eran venuti fiori sì belli per la maggior parte , che posti a confronto de' fiori antichi , ne oscuravan la bellezza . Animato egli dalla buona messe , tornò a raccogliere i semi per seminarli , e così sempre tornava a fare ; ed io vi andava ogn'anno a vedere i fiori , che ne venivano ; perchè servivano a me di sperienza , per accertarmi , del pronostico , fattovi sopra , che questi semi , ed i lor fiori dovesser ogni anno gir sempre più digradando , e degenerando tanto dalla lor bontà , che da que' semi non ne nascerebbe poi finalmente altro , che mala razza di piante scempie .

165. Così fondatamente pronosticava , perchè vedea , che l'giardiniere per l'avidità d'aver molta quantità di fiori , e di radici , (vizio comune di tal gente ,) tutte lasciava in piedi le piante de' scempi , e solamente ne strappava qualch' una più vile di color bianco , per certo barlume , che tenea , come dirò , del suo cattivo influire . Di più prevedeva io , ch' egli al raccor delle spighe , adescato dalla grandezza delle scempie , e della vantaggiosa lor granitura (error comune , che inganna ogn' uno) queste raccoglierebbe più tosto , per iscusabile ignoranza , preferendole alle spighe più piccole ,
finun-

simunte, e mal granite: delle migliori piante semidoppie; e però senza fallo seguir ne dovea delle sue piante un notabilissimo digradamento. Il presagio andò sempre più avverandosi, e trovava ogni anno un numero molto maggiore di scempi, e minore assai di doppi, e semi doppi, e rara pure osservavasi la primiera finezza, e vivacità de' bei colori, declinati già di mano in mano al biancastro, e ad altri squalidri coloracci.

166. Colà finalmente mi portai il quarto anno, ed era una compassione, a veder quel misero semenzajo, il qual da principio era stato, a mirarlo sì gajo, e ricco, una meraviglia. Eh bene, dissi io al giardiniere, o voi avete perduta, o avete trascurata l'arte vostra, di coltivare i fiori; perchè voi ne' primi anni facevate venir nel semenzajo fiori veramente d'incanto, e poi di anno in anno gli ho veduti declinar tanto, che ora vi fan vergogna, pari all'onore, che alla vostra perizia facevano i primi fiori. Eh, rispos' egli, sarà stata forse mia imperizia, ma non negligenza di coltivatura: il male più tosto vien dalle semenze, le quali d'anno in anno degenerano, e vanno sempre al peggio. E qui di nuovo da me istigato a dar ragione, perchè le prime sementi non erano state tralignanti, e le ultime sì? Diemmi risposta da più, che Filosofo rusticale, e colpì nel vero, dicendo, che le prime sementi furon colte da razze, tutte universalmente buone; ma che le seconde, e le susseguenti erano state tocche dal pernizioso contagio de' fiori scempi: ora io mi accorgo, soggiunse egli, che le piante da fiore son anch'esse, come altre piante, che abbian negli orti, le quali stando vicine a vista, s'ingravidano scambievolmente; e l'cattivo, che sempre domina, prevalendo sopra il buono, i semi per ordinario fa imbastardire: così egli a me, ed io confermandolo maggiormente nella sua verissima opinione, lo animai, ad esser crudele contra le sue piante, estirpandone tutte

le cattive, e ad-esser men' avido di molta quantità di fiori, ma di contentarsi del poco, purchè tutto fosse di razze buone, e così solamente ottener potrebbe da' semi tanto numero di piante elette, che in pochi anni, ne diverrebbe di poi straricco.

167. Il medesimo documento ho inculcato a' nostri Fiorari, così da noi chiamati que', che vivono di tal mestiere, molti de' quali son venuti da me, per saper la maniera, come far fiori di buona condizione: mercecchè per tal sorta di gente grossolana, che mal si adatta alla delicata operazion degl' innesti, basta questo solo insegnamento; ma pure, chi 'l credrebbe? molti di costoro non fanno indurli a praticarlo: dacchè par loro, di strappar le proprie viscere, quando strappano una pianta vile; ed è tutta ingordigia del guadagno presente quella, che non li fa badare al lucro molto maggiore, che farebbono nell' avvenire. Son' essi avvezzi a far d' ogn' erba fascio, e vendon tutto, i buoni, ed i mali fiori: siccome le radiche, e le cipollette di cattive razze vanno spacciando come razze nobili con astuzia, e con inganno. Però altri, che si son serviti dell' arte bene appresa, vi hanno guadagnati buoni danari. Ne rammemoro solamente due, uno de' quali era un povero giovane, tenuto alla coltura de' fiori nel giardinetto di casa del Sig. D. Ottavio Gaerani, Marchese di Sortino, de' Principi del Cassaro, al quale io per la special' servitù, che gli professo, insegnai il secreto delle semenze, e la maniera, da far gl' innesti; e quel giovane avendo appresa l' arte, ed essendosi provveduto delle semenze medesime di quel giardinetto, pieno tutto di razze nobilissime, cominciò a seminarle a conto suo, e ne ha fatto tale traffico per più anni, con tal guadagno, che di povero è divenuto il più ricco de' Fiorari con invidia degli altri, i quali ricorrono ora a lui, per aver della buona semenza; ed ei guadagna con vender

semenze, fiori bellissimi, a caro prezzo, e le radici, e le piante medesime dentro i vasi. L'altro serviva al nostro P. Ferreri per la coltura de' fiori nel giardinetto domestico del Gesù, al quale per ciò insegnai la giusta preparazion delle semenze; ed esso trafficando per se nel suo giardino, ne ottenea razze di fiori sì preziosi, che concorreato, a vederli molti Signori, e Dame dilettanti, ed invaghiti della bellezza, e pienezza loro, ne compravan le piante a gara con molto guadagno del giardiniere.

168. Ma pur questi Fiorari non usavano quasi mai altra diligenza, che di strappar, e gettar via le piante degli scempi, e lasciavan le sole più scelte per semenzire: se però faceasi uso degl' innesti, sono i proventi molto maggiori in numero, e qualità, come ora col racconto de' fatti dimostrerò. Descrivo qui l'esperienza principali fatte allora, ovvero in più anni di poi, e fino al dì d'oggi più volte replicate, per indubitata conferma di quelle prime; e ne riferisco qui la giusta, e caute-losa maniera di praticarle, per servir d' insegnamento; quantunque alcuna cosa ne sia stata detta per necessità, che ven'era, nel Trattato primo.

169. Dopo aver tolta ogni pianta, non solo scempia, ma pur semidoppia di bassa, o mediocre lega; buona eziandio per la quantità delle foglie, ma cattiva per lo colore smorto, specialmente se biancastro; (il quale ho trovato il più pernizioso, per infettar di simil colore le altre piante,) dopo aver ciò fatto, destinava io alla produzion della semenza le piante, primo, più sane, e vigorose; secondo, le meglio colorite di colori più fini, più brillanti, e più carichi, che avesser dell'oscuro, e del nero; perchè vanno i colori anch' essi digradando, ed assai facilmente inclinano al bianco; terzo, le più doppie, purchè tenessero il bottoncino della semenza, ancorchè non avesser Apici, e polyeri, le qua-

fi io poteva pigliare a prestito da altri fiori di ottima qualità, e dargliele a gusto mio; anzi queste di lor natura castrare, per qualche tempo almeno furono le mie predilette, ed erano preferite a tutte le altre, per averle provate di veri doppi seconde partoritrici.

170. Se poi le ora lodate piante sien di quelle razze fine, che per lo addietro state sono totalmente doppie, ed ora per mal di vecchiezza, o altra infermità, non potendo lussureggiar più nella produzione di tante foglie, sdoppiano, e si riducono a semidoppie; queste, quasi come tocche anch' elleno dall' innata passion, di lasciar eredi dopo di se, prima di andare a morte, producono almeno la spiga della semenza, o anche gli Apici, con tutto il bisognevole a generare; e coteste piante, io sempre ho avute nella maggiore stima, per la ragion naturale, che debbon esser le più disposte a generare i parti, simili a se, non solamente semidoppi, secondo lo stato loro presente, ma pur doppi, quali erano per lo innanzi; e di fatto l'ingenita doppiezza, che han perduta le madri, risuscita frequentemente in parecchi de' figli, come ne ho certa pruova ne' Ranuncoli per più replicate sperienze.

171. Le medesime tre condizioni, richieste per la buona scelta delle madri, eran da me richieste per la scelta de' Padri, da' quali andava pigliando le polveri; maschili per la fecondazion delle semenze; cioè dalle stesse madri per ordinario tagliava i fiori, che trovava più abbondanti d' Apici, e polveri; ciò, che serviva insieme per isgravar le madri de' molti allievi, e per asperger colle lor polveri i fiori d' un'altra pianta. Facevasi l' innesto, e per più giorni replicavasi nella maniera di già insegnata; e questo solo senz' altro bastava praticare per la preparazione delle semenze, dalle quali altro principalmente non pretendasi, che buone razze di fiori d' ogni vario gusto, e capriccio.

Ma

172. Ma quando uno volesse tal determinata razza, oppure alcun esatto sperimento eseguir bramasse; allora bisognerà usar la cautela di coprir il fiore, destinato a far semenza, con un velo di seta delicato, e trasparente, che noi qui diciam volgarmente Velo di Regina, il qual non impedisce al Sole, ed all' aria il passaggio, ma lo impedisce agl' Insetti, acciocchè non vi portino altre polveri, che voglionfi escluse. La cautela medesima, sarà bene, usar pure con que' fiori, onde si hanno a prender le polveri, per far gl' innesti, quando si tratti di voler con sicurezza la tal razza determinata, e l' tal colore, o quando si voglia fare una speranza del tutto netta, e indubitata; perchè gl' Insetti possono aver portate a questi fiori altre polveri differenti dalle lor proprie, e quindi può venirne adulterato l' innesto, e lo sperimento. L' ho avvertito già nel citato luogo del Trattato 1, ed ora torno ad inculcarlo, che non vi ha diligenza, la qual sia bastevole, per ischer- mirsi dagl' importuni, e continui tentativi, che van facendo gl' Insetti, per insinuarsi nel cuor de' fiori; e quindi bisognerà tal volta raddoppiare il velo, e valersi d' altre più squisite precauzioni, per deluder le loro industrie, o essi altrimenti deluderan le nostre.

173. Or venendo all' esito delle sperienze degl' innesti, eseguiti giusta la premessa istruzione, corrisposero esse appuntino all' idea, che sen' era formata, e mi confermaron sino all' evidenza, che dalla virtù seminal delle polveri de' fiori dipenda principalmente la doppiezza, o la scempiezza de' fiori da semenza, come altresì la variazione tanto mirabile delle lor forme, e colori. E intorno alla doppiezza lascio di riferirne le particolarità, che potrebbero arrecar noja, mentre alcune dovran riferirsi ad altro miglior proposito; ma basterà qui dire in generale, che per lo corso già più d' anni venti, ed io, e tutti gli altri, a quali ne ho co-

municata la pratica, e l'hanno debitamente adoperata; ottenuto abbiamo dalle semenze tanto gran numero di fiori, tra doppi, e semidoppi, e di qualità così varie, così bell', e capricciose, che per lo numero siam divenuti ricchi in un sol anno di più mila piante, tutte degne da far comparir in qualsivis nobil giardino: e della eccellente qualità di buona parte de' lor fiori, oltre che ne può esser testimonio tutto questo paese, che n'è stato spettatore, ne darò a miglior luogo testimonianze tanto autorevoli, e di così alte lodi, che parranno esagerate, benchè sieno sincerissime.

174. Ma intorno a' colori son qui da riferirsi quelle sperienze, che ordinate furono a comprovar, che anche l' colore, e le tanto varie sue mutazioni, le quali ammiransi ne' fiori di semenza, dalla virtù seminal delle polveri maschili sien pur anche dipendenti. Le iterate sperienze m'hanno insegnato, che qui pure nella generazione delle piante va giusto la cosa, come nella generazione degli animali moltipari, che i parti vengono altri simili del tutto al padre, altri alla madre, e la più parte partecipano i colori, la forma, e le fattezze di entrambi. Ad eseguir bene, come va fatta, la sperienza, bisogna usar le predette cautele, di serrar dentro il velo il fiore, che serbasi a far semenza, primachè sia totalmente sbucciato dal suo calice, acciocchè non vi penetri qualche insetto, e vi porti delle polveri straniere. Se gli si vorrà fare innesto, dovrà similmente coprirsì con velo quell' altro fiore, onde s'hanno a pigliar le polveri, da dare a questo, come si è avvertito. Quando si vogliano i fiori del colore, e forma medesima della madre, per lo innesto, farà il meglio, che le polveri prendansi da' fiori della stessa pianta, o di altra della medesima razza, sebbene in difetto di questi, supplir si possa con altri fiori consimili. Se poi si maritino due, o più fiori di color diverso, saranno i figli
mol-

molto varj fra se; chi del solo color paterno, chi del solo materno, chi di un terzo sol colore, misto di entrambi: così per esempio ho fatt' io venir più volte gl' Anemoni di un giocondissimo color di Lacca, o sia purpureo, che non avea per avanti, e mi arrivò quasi nuovo, il qual surge dalla mistura del rosso col turchino: altri poi de' figli riescono chi cangiante, chi listato, chi brinato, chi punteggiato, chi a grandi macchie stampato di due, o più varie tinte, or vivaci, e cariche, ora smorte, e dilavate; ma sempre del colore istesso de' genitori.

175. Di tai sperimenti ne ho fatti sopra gl' Anemoni, sopra i Ranuncoli, e sopra i Garofani, alcuni almeno con tutta la prescritta cautela, e più altri con solamente notare i colori de' padri, onde pigliava le polveri, e delle madri, a cui le applicava; e da questi secondi, vero è che ne ho ricavati de' figli molto varj, e degeneranti per la mescolanza d'altre polveri, la qual mai non cessano di far gl' Insetti: ma, pure di figli, che portavano il color medesimo, o almeno molti lineamenti, copiati da' lor genitori, mene son venuti in tanto considerabil numero, che ancor questi, come che fatti senza la dovuta cautela, passar possono per veri, e buoni sperimenti. Così quante volte ho desiderato di avere qualche maggior copia di tal' e tal' altro colore, tante volte l' ho avuta per cotesto mezzo, e mene sono arricchito con solamente maritare insieme due fiori del color medesimo, che bramava; giacchè fra tanti, che sortivan di color diverso, sempre ne riuscivan molti del color proprio de' genitori. Ma non così mi è accaduto, quando l' innesto faceasi con polveri di fiore di color diverso, o quando non vi si fosse fatto alcun' innesto; perchè allora toltone qualcheduno, che quasi sempre riesce simile al fior generante, ne risultava ne' figli un miscuglio, e varietà di cento colori, to-

tal-

talmente diversi dall' ereditario, che avea la madre.

176. Ma le sperienze, fatte con la precauzion di velare i fiori, sono state almeno tre ne Ranuncoli, oltre quelle de' Garofani, delle quali parlerò separatamente: una fu fatta sopra fior tutto giallo, e l'innesto fecesi con polvere di fiori del color medesimo, onde i figli quasi tutti ne venner gialli: l'altra fu fatta di fior rosso maritato con polvere di altri rossi, ed i figli quasi tutti ne venner rossi: la terza fu fatta sopra fior giallo, stampato di rosso, al quale diedi polvere di fiori gialli; ed i figli ne venner o gialli del tutto, o misti di giallo, e rosso, e pochi del tutto rossi; e ne' misti, che furono in maggior numero, dominava il giallo più che il rosso, appunto come la qualità dell'innesto richiedea.

177. Confesso però, che in queste sperienze v' interveniva sempre qualche raro color differente, che pareva non trovarsi ne' genitori, della quale irregolarità possono essere state molte le cagioni. La prima può essere stata qualche mistura d' aliene polveri, massime che io tal volta, attediato, trascurava di velare i fiori, onde pigliar dovea le polveri, ed alcuna volta trovava già penetrato sotto il velo qualche Insetto. Per seconda cagione assegno l'anion di varj colori, che per ordinario trovasi o palese, o almeno occulta in un sol fiore; la qual varietà di colori passa di poi in retaggio ai figli, e li fa varj. Un Ranuncolo vi parrà totalmente giallo, o rosso, ma fissatelo con attenzione, e cercatelo per tutto; che vi troverete soventemente o nelle fogliuzze ultime del centro, o altrove sparsa qualche striscia d'altra qual si sia tintura. Di più è da sapere dalla Fisica, che i colori semplici, e primigenj son tre solamente, il rosso, il giallo, e l' turchino, e che ogn' altro colore in tutta la Natura sia composto di questi tre, come ha sostenuto forse il primo, o tra i primi il nostro Mattematico di Parigi il P. Castel, contra il parere del

del Gran Newton, che ne ammette sette più principali, e poi anche innumerabili semplici, e primigenj. Noi sostenghiamo non pur come probabile, ma come vera l'opinione de' soli tre colori, e speriamo, nella terza delle nostre Dissertazioni *De Lumine*, poter comprovare la stessa opinione con nuove nostre ragioni, e sperienze tali, che non s'abbia a desiderar più nel P. Castel quella maggior sodezza d'argomenti, che vi si brama, per istabilir la sua sentenza.

178. E' da sapere altresì, che i medesimi tre primigenj colori non son mai del tutto semplici, e puri senza qualche mistura dell' uno coll' altro, come confessa Newton medesimo: laonde sì nell'una, come nell'altra supposizione, non dee parer così strana, che un fiore, benchè veggasi di un sol colore in apparenza, pur ne' parti suoi faccia manifesta quella pluralità di colori, de' quali il suo proprio era occultamente composto.

179. Per ultima cagione assegno la facoltà, che v'è in Natura di variar colore in certe spezie di fiori, la qual facoltà in certe altre spezie ne vien negata. Sanno i Fioristi per isperienza frequente, che i Ranuncoli, i Tulipani, i Garofani, e più altri, d'anno in anno van facendo de' cambiamenti, e quello, il qual'era per cagion d'esempio un Tulipano rosso, vedesi nel seguente anno forger di bianco, di giallo &c. tutto gentilmente screziato: il bulbo, la radica, la pianta sono i medesimi, e pur si muta, ed altera il colore a segno tale, che talvolta il fiore più per desso non si riconosca. Or quanto maggiormente alla Natura dee esser accordar simile facoltà per le fabbriche del tutto nuove nella generazione delle semenze? E però non è da maravigliarsi, che in tali sperimenti qualche razza ne forisca di color totalmente diverso dall'ereditario: ma questo è certo, che la massima parte de' fiori novelli vengon simili, chi più, chi meno, nel color, e nell'le

le fattezze al Padre , ed alla madre , che i semi ne produffero .

189. Poichè si è detto , quanto basta per ciò , che s'appartiene alla variazion de' colori , torno al soggetto nostro principale , ch'è la doppiezza de' fiori , per agguinger quasi come un nuovo secreto , il qual sembra a prima vista , che sia un altro , anzi par , che sia contrario al già esposto ; ma pure ambidue son fondati sul medesimo principio , che da buoni padri ne vengano buoni figli . Sin' era detto abbiain molto di male in discredito de' fiori scempi , che son la peste del giardino , perchè ne infettano i semi col cattivo influsso delle loro polveri ; ma ora senza contraddire al già detto , li commenderem tanto a titolo di buone madri , e nutrici , quanto in ragion di maligni padri l'abbiain giustamente vituperati . Le piante doppie , e semidoppie posson cavarfi benissimo ancora da' semi de' fiori scempi in pari quantità , o forse ancora maggiore , e di miglior qualità , che non cavanfi da' fiori doppi , e semidoppi se si usi il seguente artificio , poco diverso dal precedente .

181. Considerando io da una parte , che le piante scempie soglion esser le più robuste , ed i fiori allevano più vegeti , le spighe più grandi , ed i semi nutricano più grossi , e corpulenti ; a motivo che tutta impiegano la lor sostanza in allattar solamente i parti ; nè obbligati sono a dividerla , e consumarla pella nutrizione di tutto quel numeroso arredo di foglie , che un fior pieno ha obbligo d' alimentare ; dall' altra parte considerando , che da' semi de' fiori scempi ne fortisce talora qualche fior doppio , o semidoppio , (ciò , che mostra in essi l'abilità di produrli ;) è che il produrli così di rado potea ragionevolmente provenire , non da inability intrinseca , ma dalla prevalenza delle proprie maligne polveri , più abbondanti , e più efficaci di quelle poche , e men vigorose , che vi arrivano da' fiori pieni ,

come si è provato . Fatte , dico , queste considerazioni , giudicai , che dagli scempi si avrebbon potuti ricavar de' bellissimi fiori doppi , e semidoppi , forse in maggior quantità , per la grandezza della spiga , e di miglior qualità per la copia , e sodezza dell' alimento ; purchè ne venisse totalmente impedito l' influsso dannevole delle proprie polveri , e sole operar potessero la concezion de' semi le polveri , tratte da scelti fiori doppi , e semidoppi ; cosicchè questi la facesser da meri padri , e gli scempi unicamente da madri , e da nutrici .

182. La pratica era facile ad eseguirsi ; perocchè in alcune spezie non son rari a trovarsi gli scempi , men- ni , e senz' Apici dalla natività , come ne' Garofani , ne' Ranuncoli &c , e questi , così fatti dalla Natura , son da stimarsi sopra tutti ; perchè più disposti , anche da se , a produrre i fiori doppi , e semidoppi , come lo mostra l'esperien-za , e la ragione , da dirsi nel seguente Capo . Ma senza di ciò , agevolissima cosa sarà castrare il fior semplice , tagliandone colle forbici le stamigne , subito che sia sbucciato il fiore , prima che gli Apici suoi sieno screpolati . Avendo di poi la cura , di dare alla vedova madre altro marito più degno coll' innesto , cioè coll' applicazione delle polveri straniere , tolte da fiori eletti ; ripiglierà ella tosto la nuzial giocondità , e come che assunta dalla vil plebe , potrà ben non di meno divenir regina , quando ne venga già di generoso , e nobil seme fortunatamente incinta .

183. Quindi io , a comprovarne la teorica colla pratica , ne venni all' esecuzione , ed avendo troncato gli Apici a quattro Ranuncoli scempi di bel colore , andai lor dando delle polveri di Ranuncoli scelti , e pieni : così pure a tutti que' scempi , che trovai , naturalmente privi d' Apici , e furon molti , applicai polveri di Ranuncoli de' più scelti per la bontà del colore , e per la ricchezza delle foglie ; con la precauzione di tenerli sem-

pre coperti di velo, per aver sicurezza, che non vi capitasse altro gener di polvere, che la sola da me applicata. I semi ne riusciron bell', e pingui, straordinariamente graniti, quali aspettavansi dalle robuste madri; e seminati, e cresciuti, colla prospera lor fioritura comprovaron per vero, tutto quanto era stato in idea preventivamente conceputo. Sì nel colore, come nella pienezza i fiori portaron copiate le simiglianze più tosto de' padri doppi, e semidoppi, che delle madri scempie; essendone venuti semplici assai pochi, e la massima parte furon semidoppi, e pienissimi, con parecchi doppi di prima classe; parendomi, eziandio di poter asserire dopo replicate altre pruove, fatte ancora in molto maggior numero ne' Garofani, come ora son per dire, che i fiori pieni ne vengano forse più di rado, ed in minor numero dalle madri lor pari, che da coteste scempie in total guisa con polveri di doppi fecondate. E' da soggiugnere una sola avvertenza, che delle scempie madri, scelgansi più tosto quelle, che tengono in mezzo un ciuffetto di foglioline, o che in altra maniera sien alquanto più frondute delle totalmente scempie; dacchè quel ciuffetto, e quelle foglie mostrano una certa maggior disposizione a frondire ne' figli doppi, e semidoppi, la qual non hanno le più nude scempie:



C A P O XIV.

Altri sperimenti ne' Garofani.

184 **S** In qua ho parlato delle sperienze, fatte per lo più ne' Ranuncoli, ed ora, per accreditar maggiormente il già detto, ne vengo agli sperimenti, presi da' Garofani, e poscia ad altri sopra altre spezie; acciocchè formar se ne possa per ogni gener di piante soda, ed universale induzione. Ella è sperienza comune di tutti coloro, i quali han tentato di moltiplicare i Garofani per via delle semenze, che quasi tutti riescan scempi, ed appena mai qualche rara pianta ne riesca di fior doppio, o semidoppio: quindi va in tanto discreditato tal sorta di traffico, che chi non ne fa l'arte, di farlo maravigliosamente fruttare, o si burla di mè, o si sente da me burlato, quand' io lo propongo, come un negoziato il più vantaggioso, per aver piante di Garofani bell', e peregrine, ed in molta quantità.

185. L'origine del poco lucro, che suol ricavarfi da tai semi, comincia di qua, che da questo fiore appena si può mai raccorre maturo il seme: il doppio, o non ne tiene, o non lo matura, ed il semidoppio spessissimo patisce dello stesso male; a tal che per pruova fattane, di una ventina di fiori a mala pena ne riuscirà un solo, pregno di seme, e questo medesimo in parte voto, e mal granito. Quindi è, che i Fioristi, per averne il seme, son costretti a cavarlo da' soli Garofani scempi, che più agevolmente lo compiscono: ma dagli scempi, come si è veduto, quando non si faccia uso dell'arte ora prescritta, vano è, lo sperar altro, che scempi.

186. A ben valersi di cotest' arte ne' Garofani , ed in altre tali specie, (nelle quali l' applicazion delle polveri da un fiore all' altro può incontrar qualche difficoltà , che non è ne' Ranuncoli , Anemoni &c, ne' quali è facilissimo l' eseguirli ;) avverto prima, a saper ben riconoscere, quali sieno le Stamigne cogli Apici , e quando questi sieno spalancati , e mettan fuora le polveri femminali ; qual sia il Ricettacol de' semi , e qual sia la sua Tromba , per quivi applicar più opportunamente , che altrove, le dette polveri . Ne' Garofani , de' quali ora trattiamo , le Stamigne cogli Apici non son troppo eminenti , e facilmente nascondonsi fra le folte foglie de' Garofani doppi , ne' quali son rari , e se voi non cercherete attentamente , perderete di vista quell' uno , o due , che vene sieno , e perderete il lucro di tanti semi , quanti ne può concepire uno , o due Ricettacoli , potendosi anche con un sol Apice impregnare un intero fiore .

187. Per saperli meglio riconoscere , ve gli ho espressi nella Tav. 2 , Fig. 14. Sono gli Stami cogli Apici que' fili delicati ; che sorgon dal fondo intorno al piè del Ricettacol de' semi , il qual' è quella boccetta oblunga , che forge dal centro del Garofano , e la sua Tromba dalla cima , e dall' imboccatura della boccetta erge si in alto sparta in due , o tre cornetti , lunghi , intorciati , ed eminenti sopra tutto il fiore . Gli Apici poi , attaccati sulla estremità degli stami , appajon simili a femenzuole , bianchi , ed aspersi di farina , quando sieno già screpolati ; ed allora è il proprio tempo da valersene . Io però gli stimo pur buoni , quando li veggio turgidi , già prossimi a screpolare ; gli apro io stesso col taglio delle forbici , ed imito in ciò le Api , le quali van tastando co' denti gli Apici ancor ferrati , per assicurarsi , se sieno maturi ; e trovandoli tali , gli spaccan co' denti , e ne raccolgon le polveri .

Di

733. Di più a ben eseguire il predetto maritaggio, non v'è altra maniera più comoda, che tagliar colle forbici, o mollette gli Stami cogli Apici, uno a uno, e pian pianino con destrezza, acciocchè non se ne cada la polvere, la quale in questo fiore non è al solito attaccaticcia, ma molto labil', e sciolta; e con le forbici, o mollette medesime gli Apici troncati cavanfi fuora, e trasportansi al Garofano da innestarsi, guardando bene, di non urtar nelle foglie, così nell' estrarli, come nell' introdurli, per non dissiparne la polvere. Se si gettin, così alla ventura nel cuor del fiore, forse cadran lontano dalla Tuba; ma farà più certo il lor effetto, se li poserem, come ho io costume, sulla imboccatura del Ricettacolo, fra l' uno, e l' altro corno; o anche meglio fregando prima cogli Apici sul velluto delle stesse corna, per attaccarvisi, ovunque sia, la polvere. Tutto questo tratto vellutato è veramente il luogo proprio; destinato dalla Natura per le polveri: giacchè, come detto è nel Tratt. 1, c. 12. n. 156 ha ella industriosamente ornata di peluzzi, e di velluto la sola interna faccia de' cornetti, ove l' una guarda l' altra di rimpetto, ed entrambe guardano insieme l' orifizio del Ricettacolo, acciocchè fra le asprezze di quella lanugine la polvere resti attaccata, e di là, come da luogo il più opportuno, col vivace suo spirito vita ispiri agli embrioni: Che se non'avrete presenti i Garofani, destinati a semenzire, conservate gli Apici troncati in una cartolina, e poscia col vostro comodo ve gli anderete applicando; perchè mantengon la lor virtù per più giorni, eziandio fino ad otto, come ne ho sperienza.

189. Premessa cotesta istruzione, ne vengo all' racconto delle sperienze. Sia la prima quella, che intrapresi, per iscoprir la prima origine della doppiezza de' fiori: giacchè avendo provato, che i fiori doppi ven-
gon da' genitori doppi, se altra origine non han, che

que-

questa sola, sarebbe stato uopo, che Iddio fin da principio creato avesse alcuni fiori doppi, per propagarne la generazione, e non già tutti semplici gl'individui. Potea però crearli tutti semplici nel caso, che da meri semplici senza verun concorso di doppio, sortir ne potessero i doppi, o qualch' uno almeno; come io pensava, che ciò potesse ottenersi coll' applicazion delle polveri di fior semplice a semplice, e con niente altro più, che con dargliene in molta copia: giacchè avendo provato, che le polveri caricate abbondanti, arrivano fino a far germogliare i grani sul Ricettacol medesimo; sembrava pur verisimile, che colla lor copia, aumentata l'attività, potesser produrre in uno stesso grano di semenza due, o più germogli, o altro tal mostro pieno di foglie, quai sono i fiori doppi.

190 Per far pruova, lasciai a far semenza pochi Garofani sopra alcune vigorose piante, altre scempie, altre quasi scempie, ed altre semidoppie d' inferior grado: delle polveri de' lor medesimi fiori, i quali coglieva per isgravar la pianta, mi serviva, per applicarle, ed aggiugnerle alle proprie, che avea da se il Garofano, destinato a semenzire, ed ogni giorno ne aggiugnea delle nuove in buona quantità. La riuscita poi di queste semenze fu, che i lor fiori ne venner de' colori medesimi de' genitori, o poco differenti, ed alcuni misti di due colori; ma la scempiezza de' generanti non fu da tutti ereditata, come avvenir suole, quando non vi si adoperi la copia delle polveri. Da padre, e madre scempi la massima parte ne venne scempia, ma pur vi fu qualche semidoppio: da padre, e madre semidoppi, la maggior parte ne venne semidoppia con qualche doppio di più, e così nella terza combinazione di semidoppio, e scempio furon gli scempi di minor numero, che nella prima. In questa sperienza non usai veruna cautela di coprir con velo i Garofani, anzi collocai stretti, e con-

fu-

fusi fra se i testi, ov' eran piantati; acciocchè gl' Insetti mi ajutassero a far meglio l' innesso, portando polveri dall' uno all' altro fiore. Dacchè il principal mio intento in questa prima speranza era più tosto di veder, se la sola applicazion delle polveri differenti, copiosamente somministrate, ajutasse a promuover gli scempi, ed i semidoppi a più alto grado di semidoppi, e doppi, come realmente mostra il riferito sperimento.

191. Quindi cavasi, che Iddio da principio potè aver creati i fiori, tutti scempi; (come più perfetti, e compiuti ne' membri, spettanti alla generazione, da Dio principalmente pretesa in ogni gener di pianta); e che poscia da questi fortiti ne sieno i semidoppi grado per grado sino a forgerne i doppi; e che di più la prima origine della doppiezza possa essere stata, almeno come principal concausa, la copia, e l' miscuglio di varie polveri, fatto sin da principio dagl' Insetti, che le trasportano. Quindi altresì caviam la maniera, come potrem ottenere i semidoppi, e doppi nel caso, che di qualche gener di fiori non ci troviam ne' doppi, ne' semidoppi, pertrar da questi le polveri, ed applicarle a' fiori da semenza; ed in tal caso applicando polveri di scempio sopra scempio, più volte, in più giorni, ed in buona copia, ne otterrem qualche raro semidoppio, e da questo ne verrà finalmente il doppio.

192. Il secondo sperimento è stato quest' altro. La Signora Principessa di Poggioreale tenea tre razze di Garofani bell', e rari, semidoppi di più che mezzana grandezza; e le razze medesime con un' altra di più ne avea S. E. il Sig. Vicerè nel Giardino Reale. Una forte era il Garofano giallo, o più tosto gialliccio, e le altre forti aveano il campo di bianco lattato; tutte però le tre erano fregiate pertutto il giro della foglia di una bella frangia, formata da linette, o strisce, e punti di color rosso, chi sanguigno, chi cremisi, chi incarnato, e chi
pur-

purpureo. Però di una delle tre razze la frangia era più tosto un gentilissimo merletto, o un vero ricamo, che chiamano, A punto di Spagna, dipinto a granito di soli punti rossi, qual suol farfi intorno al giro del cappello, e formato con tal esattezza di merli, e giusta simmetria, che chi lo mirava per la prima volta, credealo dipinto ad arte, e poi ammiravalo come proprio un miracolo di Natura: se non che anni addietro il merletto ne venne tanto alterato, che d'allora in poi non è più desso, ed i punti, che ne formavano il ricamo, si son cambiati in lineette, confuse con punti, senza tutto il buon ordine primiero; non pertanto però queste tre razze si hanno per le più bell' e rare, che s'ensi mai vedute.

193. Or pensando, che questi Garofani erano abili a compier qualche poco di semenza, come semidoppi, e che potea farsi senza verun fastidio una buona sperienza sopra di quelli, che tenea la Principessa; la pregai, a lasciarne molti a semenzire, acciocchè fra tanti, alcuni almeno ne compieffer la semenza; ed ella favori di lasciarli, e poi già secchi me li mandò. La sperienza era questa: non teneva essa altri Garofani, che solamente le nominate razze, che potesser produrre delle polveri femminali, e mandarle dall' un fiore all' altro; giacchè due altri, che ne avea d' altra sorte, osservati da me, furon trovati del tutto, o quasi del tutto sterili d' Apici, e polveri. Nè tampoco v' era gran pericolo, che gl' Insetti altronde portasser colà delle polveri; perchè i vasi de' Garofani eran tenuti in luogo assai ritirato, e remoto; e poi non soglionfi allevare altri Garofani, che doppi per tutta la Città. Laonde stava io come sicuro, che se mai vi fosse stato alcun commercio d' aliene polveri, non sarebbe stato, che di quelle sole tre razze fra lor consimili; e quindi potea vedersi da' fiori delle lor sementi, se i figli mai dalle ma-
dri

Uri degenerassero . Da' suddetti Garofani secchi non potei cavar più , che venti grani di semenza , quasi tutta mal granita , e vota di germe . Ma per quel che potesse valere , la seminai , e mene nacquero tre soli germogli , i quali arrivaron finalmente a fiorire dopo un anno . Due di essi fecer Garofani totalmente bianchi , e semidoppi d' infimo grado , o quasi scempi , de' quali poscia mi son servito come ottimi , per fargli generar la semenza . Il terzo però riuscì semidoppio di supremo grado , e quasi doppio , di campo bianco lattato con la frangia confusamente screziata di lincette sanguigne , molto simile alla madre , e sol differente in ciò , che alcune delle linee scorreano alquanto più giù dalla frangia , ed era più parca la lor quantità ; ma se nella madre fa maggior pompa il vermiglio , nel figlio non si desidera , anzi la sua stessa modestia par che lo renda più grato , e più gentile .

194. Or dall' esito medesimo io argomento , che la concezion di questi tre grani fu fatta dalle sole polveri del fior materno ; perchè tutti e tre , chi più chi meno portaron ne' fiori le fattezze medesime della madre : e sebbene i due non portano i lineamenti rossi , n' ereditarono però il campo bianco , ch' era il più disteso , e 'l principal colore ; e la mancanza del rosso comprova quell' altro asserito già provato antecedentemente . Ne' Ranuncoli , cioè che sebben lo stile ordinario della Natura sia , più tosto di fare il simile nelle sue nuove produzioni ; non per tanto , però siavi in certe spezie di piante la facoltà , d' andar facendo pian piano qualche piccolo cambiamento . Ciò maggiormente confermasi con una rarità succeduta in questa medesima pianta di Garofano , riuscita quasi del tutto simile alla genitrice ; perocchè nel suo cesso medesimo vi fu della varietà ; e fu , che un braccio dello stesso tronco produsse Garofani totalmente bianchi , mentre dagli altri rami tutti ne ven-

ner di rosso graziosamente merlati . Era facile alla Natura lo trascurare quel pochino di color rosso , ed amando ella sempre la varietà , potè agevolmente negarlo non solo a' primi due germogli , ma eziandio a qualche ramo del terzo .

195. Così ancora l' altro divario de' due figli quasi scempi dall' ottima madre semidoppia , è una nuova conferma di due altre assertioni ; cioè che la Natura inclina sempre più allo scempio , per quanto può , e che mancandole l' applicazione , e l' urto delle polveri aliene , come qui mancò nel nostro caso , ella si trova nelle favorevoli circostanze , di assecondar la sua inclinazione , che ha di produrre gli scempi . Anzi ella è da stimarsi gran ventura , che di tre grani di semenza ne sia riuscito uno semidoppio , sì riguardevole per la pienezza , il qual senza l' industria dell' innesto non si poteva sperare neppur da trenta grani ; ed io attribuisco la buona ventura alla propizia circostanza , che la madre , sconsigliata per tutto il resto de' grani , potè nutrire quell' unico grano meglio concepito , che gli altri due , essendo questa una delle industrie , che insegneremo per ottenere un maggior numero di piante a fior doppio da' semi , lo sgravar la pianta madre dai molti allievi , e l' lasciarlene pochi , acciocchè ne riescano più robusti , e pieni .

196. Il terzo sperimento conferma sino all' evidenza tutte le nostre asserzioni , e di più mostra , che l' uno , e l' altro secreto di far venire i fiori pieni , e da' semidoppi o dagli scempi stessi , benchè riesca con profitto in ogni specie di pianta , pure in certe specie riesca molto meglio , che in certe altre , siccome ancor dico per la variazione de' colori : imperciocchè ne' Garofani riesce il tutto egregiamente bene , e molto meglio , che non ne' Ranuncoli , senza menoma differenza della teoria alla pratica : i doppi ne vengono in maggior numero , che non ne' Ranun-

co-

coli, e tra doppi, e semidoppi il guadagno può comportarsi almeno per la metà, o per due terzi de' grani seminati. Così pure di tutti i varj colori, e capricci, che uno ha ne' suoi Garofani, ne può aver quanti altri ne brama, simili o dissimili per tutte le varie combinazioni di colori, e capricci, di cui i Garofani son capaci. Egli è un gran vantaggio per questa preziosa specie di fiori, che possono moltiplicarsi in immenso per via de' semi, e possano averfi sovente delle razze belle e nuove; ed avutole, poter fare tra le molte la scelta delle più nobili, e peregrine, e queste poscia propagare ogn' anno colla piantagione de' figliolini, delle margotte &c. ed in pochi anni arricchirsi delle più fine razze del mondo, come ne' seguenti esempi potrà vedersi avverato.

197. Il primo fondo, sopra cui cominciai a trafficare, fu il poverissimo capitale de' predetti tre Garofani ottenuti dalla semenza, ed in tre anni mi son fatto ricco di più centinaja di piedi di Garofani, e di tutte quasi quelle differenti razze, che sogliono esser comunemente le più stimate, ed in oltre di più altre nuove razze, che non si sono mai più vedute, ed ora veggonfi con ammirazione per la lor singolar bellezza. I due Garofani scempi non mi furon men cari del semidoppio da se per altro sì degno per l'uso, che poteva farsene, a generar semenza, per lo qual uso furono da me giudicati de' più idonei, che dar si potessero: da una parte l'estrema lor bianchezza sembrava la più disposta, per ricever l'impressione di qualunque altro estraneo colore, che vi si volesse imprimere coll' innesto, perchè il bianco risulta dalla copiosa riflessione del lume, minutamente confuso, e composto di ogni sorta di colori; e però nelle particelle del corpo bianco trova la disposizion propria per ricevere in se, e rimettere all'occhio l'impressione del lume di qualsivisia colore: ma senza questo corre

anche voce tra i Fioristi, che da' semi del Garofano bianco cavanfi più sicuramente i varj, e bei colori; e ciò si suppone verisimilmente fondato sulla speranza, la quale l'ha pure confermato a me con replicate pruove. Dall'altra parte queste due piante aveano un'altra buona qualità, che di lor natura producevano i fiori men- ni, cioè per lo più senz' Apici, e senza polveri; qualità che li rendea suscettibili di qualunque impressio- ne di doppiezza, ed di colore, che lor venisse fatta coll' innesso delle polveri de' doppi, senza il contrasto del- le proprie lor polveri, sempre maligne, più efficaci del- le altrui, e prevalenti.

198. Era io allora in possesso già del segreto di ca- vare i doppi da' fiori scempi, ed avea fatta pruova, che gli scempi, men- ni di lor natura, sono i più abili a far semi di fiori pieni, laonde con certa speranza di doverne veder tutto il buon esito, mi diedi fretta a far degli innesti di tutte quelle buone razze, che mi pote- rono capitare alle mani: nel che però non potei esser troppo felice, perchè alquanto rari sono i doppi, che di stami, ed Apici sien forniti, e spesso ancora i semi- doppi o ne son poveri, o ne son del tutto manchevo- li; nè io allora teneva altri Garofani, che 'l mio semi- doppio, dal quale appena estrar poteasi qualche misera Stamignuola.

199. Quindi non trovando altro di meglio, mi pre- valsi principalmente delle polveri di Garofani rossi, pa- rendomi che sopra il bianco della madre vi potesse me- glio allignare il rosso, e spiccarvi, e farvi de' più bel- li scherzi di bianco, e rosso. Potei anche aver polve- ri di Garofani screziati di bianco e rosso, o incarnatino, o di lacca, ma la maggior parte dell' innesso fu fatto con polveri di un doppio, che mi trovava pronto presso di me, e stracarico d' Apici ben grossi, malfatto per verità, e mal colorito di pavonazzo; alcuni ne furono innestati col-
le

te polveri del già detto semidoppio strisciato di rosso, avuto dal seme, ed uno potei fortunatamente fecondarlo con pochi Apici, che troncai da' Garofani col merletto del Giardino di Palazzo. Però da molto numero di Garofani, che lasciai a semenzire, non potei altro raccorre, che un centinajo di grani di semenza tra buona, e mal granita, e mene nacquero soli 63. piedi.

200. Fu così scarsa la raccolta per due motivi; primo perchè i Garofani son da se difficili a concepire i germi, secondo perchè due Insetti nocevolissimi a questo fiore danno il guasto a tutti quas'i Garofani, che si lasciano a semenzire; son le Formiche, e certe Farfallette, che vengono a partorirvi dentro i lor vermini roditori: arrecano tale infestazione a cotesti fiori, che se io non mi fossi accorto del danno, riparandolo con coprir di velo gli ultimi Garofani, che mi restavano, per impedir loro l' accesso, appena forse avrei potuto raccorre semenza da un sol Garofano. Ma di questo, e di altri ripari si parlerà meglio a suo luogo, nel trattar della coltura de' Garofani.

201. La maggior parte della semenza, ch'era dei menzionato padre pavonazzo, diede i figli del medesimo colore doppi, e semidoppi con qualche parte di scempio ed alcuni pochi ne venner bianchi come la madre, della quale alcuni rossi portaron qualche leggier vestigio di linee bianche. Quell' altro poco di semenza, ch'era di padri merlettati, ne diede una parte bianchi, ed una parte ornati di merletto, altri doppi notabilmente più grossi, e pieni del genitore, altri semidoppi di ugual grandezza, ed altri scempi, e chi del tutto simile nel lavoro del merletto, o della frangia, e chi per piccolì gradi differente, ed altri più, altri meno pomposamente frangiati. Già fin d' allora, che fu la prima volta, che seminai semenza fatta coll' industria delle mie mani, mi stimai padrone de' più rari, e bei Garofani, che

che s'abbiano mai veduti; non solo perchè tali erano questi, ma perchè avuti questi, con valermene per generatori di nuove altre semenze, poteansi già moltiplicar in tanto numero tra un pajo d'anni, da riempierne un intiero giardino, e poteansi insieme portare pian piano a più altre varietà di razze di ugual bellezza, e forse ancor maggiore, se pur l'estrema può averne altra, che la superi, e la pareggi.

202. Quindi mi diedi ad applicar polveri, ed a far degl'innesti, quanti più ne potei, e ne avrei ricavato un buon migliajo di grani di semenza, se i vermini suddetti, ed i forci, che ne sono assai golosi, non ne avesser consumata la maggior parte. Di più ella è molto perigliosa al nascere, ma molto più dopo la nascita sene perdeva gran quantità ne' primi anni, finchè potei accorgermi della cagion del male, e nella coltura propria de' Garofani ne prescriverei il rimedio. Con tutto ciò dopo altre perdite, ne potei avere fino alla fiorita un centinajo di piedi, e più della metà furon doppi, e semidoppi, e di questi, e de' scempi variamente frangiati, o picchiati di rosso, sen' ebbero circa trenta piedi o simili o poco dissimili a lor padri, ed ancor più belli,

203. Sono già ora più anni, che vo continuando gl'innesti intorno a cotesti Garofani merlettati, che rispetto alle altre sorti le più riguardevoli meritano il principato; ed ogn'anno ne ho ricavata dalle semenze una abbondante raccolta di variamente frangiati, merlettati, e screziati di tutte quasi le varietà, che può avere il rosso finissimo sopra bianco di latte, o argenteo splendente. Mi mancava l'orlato d'incarnatino, e per averlo applicai polveri di merlettato rosso sopra Garofano incarnato, e stimo, che da questo maritaggio ne sortiron due piedi confusi fra tanti altri, gentilmente guerniti d'incarnatino; uno de' quali per altra sua ra-
ri-

rità meritosi il ritratto nella Tav. 14. Fig. 4. ed il nome distinto di Garofano Pazzo: giacchè altre delle sue foglie eran totalmente bianche, ed altre del tutto incarnate, altre merlettate al solito, ed altre per metà bianche, e per metà merlettate; capriccio ben raro a vederfi, e che fea ammirarfi una sol volta, perchè con mia grave pena sene morì, appena compiuti i fiori, e quel ch'è peggio senza aver potuto lasciar eredi, a motivo che avendo da se apici, e polveri, non potei servirmene da padre, ed avendolo destinato per madre, non potè concepire un sol grano di seme dalle polveri aliene. Ogni nuova razza, che mi riusciva semidoppia, veniva da me radoppiata nel seguente anno con applicar replicatamente le sue polveri su qualche scempio vigoroso, e con ciò mi riusciva, d'ottenere qualche figlio doppio, simile al padre nelle fattezze. La grandezza di cotesti doppi è stata pur sorprendente, e non inferiore a quella de' più magnifici, che si veggono nelle antiche razze, e qualche uno n'è sortito con altro Garofano, che sorge dal centro, qual vedesi nella Tavola 14, Fig. 1, e di più tanti altri piccoli Garofanini tutt'intorno alla circonferenza nascosti sotto le foglie, uno per ciascun merlo del calice. Alcuni poi di questi son anche più rispettabili per lo forte odore aromatico, ch' esalano, nè par, che manchi loro alcuna dote, per averli in conto de' più bei Garofani, che s'abbiano ne' giardini. Oltre i predetti due, altri quattro ne rappresenta la Tavola 13, Fig. 2, 3, 4, 5, dove nè la grandezza della mole di alcuni si è potuta esprimere, perchè due soli avrebbon occupato tutto il rame, nè l'insigne lor bellezza, massime che questi rami furono de' primi a delinearfi, ed inciderfi, mentre ancor mi trovava in quest'arte principiante.

104. Però lasciando altre prove della stimabilità di cotesti Garofani, basterà dir solamente, che per custodir.

'dirli da' furti, non ho trovato mai luogo sicuro; ove tenerli; i furti sono stati tanti, che mi han ridotto a fallimento, e per riaverne alcune razze sono stato costretto di ricorrere per qualche figliolino a que' medesimi, a' quali l'aveva io date, ed a grave stento l'ho potuto riavere: in un sol furto n'ebbi a perdere 150. piedi novelli di semenza, tanto che per non averne a tollerar più l'amarezza, era già risoluto di levarmi que' pochi, che mi restavano; ma pur la dolce passione, e la facilità di potermi rimettere in capitale, trassemi a far nuova semenza, e tornai ad arricchirmi in un sol anno di più centinaja di piante; ma più di me se gli han moltiplicate altri, a cui ho date le mie razze, e semenze. Quest'anno da due soli piedi di scempi ho colti presso a due mila grani di seme, e levando alcuni centinaja, che ne ho dati, e quei, che si son perduti al nascere, e si perderanno al crescere, so conto, che ne avrò circa un migliajo di piedi al tempo della fioritura.

C A P O XV.

*Industrie da praticarsi con certe particolari
specie di piante, per aver buoni fiori
dalle lor semenze.*

205: **A**lle cose fin ora dette bisogna aggiungerne alcune altre, come necessaria appendice, cioè qualche particolarità per certe specie di piante, ed alcuni amminicoli, che servono d'aiuto alla virtù generativa per la buona produzion delle sementi. E' da aggiugnere prima, che in certe specie non si vede mai nè fior doppio, nè semidoppio, ma tutti sono scempi gl'individui; si cerca saper, se in tal caso siavi maniera, da poterli ottenere da' soli scempi.

Non

Non so, che rispondervi; parmi che sia uno de' casi disperati, perchè se mai in qualche specie non si è veduto nascere altro, che soli scempi, può presumersi, che la sua indole ripugni, a produrre i doppi, e semidoppi. Imperciocchè non è credibile, che in tanti secoli dalla Creazione sin' ora, non siasi mai dato il caso degli accidenti favorevoli, ne' quali producessi dallo scempio il semidoppio, e 'l doppio: come si è dato il caso per le altre specie, che li producono; così dato sarebbersi ancor per queste, seppur non fosser d'indole naturalmente restia. Perchè però facilmente può avvenir, che i doppi, o semidoppi di quelle specie vi sieno realmente, ma sien rari, e sieno a noi incogniti; per ciò quando vi fosse impegno di averli, potrebbesi tentar la sorte con praticar l'artificio insegnato, di dare a scempi molta polvere d'altri scempi, e con aggiugnervi le altre industrie, che suggerirò, per ottener più facilmente dagli scempi i doppi, e semidoppi.

206. E' da aggiugnere di più, che in certe particolari specie non v' ha forse altro mezzo, per cavarne li, eccetto che sol dagli scempi: così parmi, che accada negli Anemoni, e nelle Viole, dette altrimenti Viole Arboree, o *Leucojum*, dal Latino *Leucojum* (Sicil: *Barca*) perchè nelle Viole non ho potuto mai trovar le semidoppie, per molto che ve l'abbia studiosamente cercate, e tutte le ho vedute o scempie, o doppie; e le doppie non producon mai semenza, anzi neppur vi ho potuto mai trovar Apici, e polveri, come non di rado trovansi in altre specie di doppi. Quindi con questo, e con altri simili generi, che s'incontrassero, non par che possa farsi uso intero del principal nostro secreto, ma di qualche sua parte; perchè nè vi son semidoppi, nè vi son polveri di doppi, per applicarle a' fiori scempi. Il perchè in queste tali specie bisogna pigliar altra strada, ed usar altre industrie, accomodate alla loro particolar

natura, le quali aggiunte a quella di farvi l'innesto delle polveri, faran venire i fiori doppi dalle semenze degli scempi.

207. Negli Anemoni poi ho provata un'altra irregolarità: hanno i suoi semidoppi nati per lo più da altri semidoppi, e qualche volta da' meno scempi; però da' semidoppi non par, che mai ne venga alcuna pianta di vero doppio, come porta il buon ordine della Natura, e com' ella suol praticar nelle altre spezie, ma tutta la prole ne riesce o semidoppia anche di primo grado, ovvero scempia; ed i veri doppi ne vengon immediatamente da' semplici: così n'è paruto a me, per pruova di più anni. Parlo io qui de' semidoppi venuti a me dalle semenze: trovo però fra le imagini degli Anemoni espressi nella Iconografia del citato Weinmann, certi semidoppi d'altra foggia diversa, i quali non mi ricordo bene, se mai mi sien venuti, quai veggonsi delineati nelle nostre figure 2. e 3. Tav. 7. Questi sopra le foglie del mantello hanno un giro di fogliette, le quali vi formano una metà del fiocco, e fan corona intorno al Ricettacol de' semi, che vi si erge nel centro. Gli Anemoni di tal sorta pajono i più disposti a produr semi di fiori doppi; poicchè non manca loro ad esser doppi altro che l'integrità del fiocco, la qual potrebbero agevolmente acquistare coll'applicazion delle polveri d'altri tali Anemoni semidoppi, che tengon gli Apici polverosi, ma la rarità di tal maniera di semidoppi non mi ha data l'opportunità di farne pruova, e però ad aver gli Anemoni doppi, farà d'uopo per ordinario ricavarli immediatamente da' meri scempi.

208. Or per tali razze, per le quali non son tutte applicabili le date regole generali, bisognerà usar delle industrie confacevoli alla lor natura. Parlando prima degli Anemoni, fiori pregiatissimi: per ottener dalle semenze i soli semidoppi, val per essi tutta intera l'of-

servanza delle regole generali già prescritte : cioè si cavano i semidoppi da' genitori semidoppi ; ed in maggiore abbondanza , e più ricchi , e pieni di foglie ne vengono , se si faccia l'innesto colle polveri d'altri semidoppi ; ed è anche necessario il farlo ; perchè i lor semidoppi di primo grado , o son privi totalmente d'apici , e polveri , o ne sono assai poveri ; e quindi per far granire i semi , bisogna loro applicar le polveri pigliate a prestito da altri semidoppi , altrimenti la spiga o si sconcierà , o verrà mal granita . Ma bisogna sopra tutto guardarli dall'infezion degli scempi, tenendo segregati , o meglio coperti con velo i fiori lasciati a semenzire , o anche quelli , onde s'hanno a prender le polveri , per far l'innesto.

209. Così facendo , ed osservando tutto il resto delle istituzioni , voi avrete in gran copia belli , e rari semidoppi , grandiosi di volume , pienissimi di foglie , niente meno de' doppi , di vaghi colori , di nuove forme così capricciose , che molti , benchè pratici di fiori , non han saputo riconoscerli , di che specie sieno , per la novità . L'ordinaria lor forma suol riuscir similissima agli Anemoni Calcedonici , detti volgarmente Argemoni , Tav. 6. fig. 1. , cioè sono i fiori di foglia lunga , e stretta , che finisce in acuto ; e pari ancora agli Argemoni nella proprietà , di portar colorite con qualche striscia del color proprio del fiore le foglie verdi del calice , siccome al contrario il color del calice sale su tal volta al fiore , che riesce listato assai graziosamente di verde . In questa sorta di Anemoni espressi nella stessa Tav. fig. 2 , e seguenti , non son rari a vederli certi mostri , composti di più fiori , cioè due , tre , quattro , e cinque steli insieme congiunti , ed ordinati l'un presso l'altro , come capne d'organo , e ciascuno stelo col suo fiore distinto , e tutt' insieme in un fiore conglutinati , ed uno di due composto ne rappresenta la fig. 2 . Gli Anemoni semidoppi sono i miei fa-

voriti, e gli antepongo talvolta ai doppi, quando sieno ben pieni, grandi, e di bel colore, tantochè ne' canestri, e nelle caraffe da regalo più volte si son meritati il luogo più distinto, e più cospicuo infra cento Anemoni doppi, e Ranuncoli de' più scelti; e che abbiano occupato condegnamente il primo posto per la novità, e bellezza loro, il gradimento comune l'ha comprovato.

210. Ma per far fortire dalle semenze gli Anemoni doppi, l'affare riesce molto malagevole; a motivo che debbon essi andar per salto da' scempi a' doppi, senza osservar la solita ordinanza, e gradazione, giusta il comune delle altre spezie, le quali passan da' scempi a' semidoppi, e quindi a' doppi; e però cosa insolita essendo nella Natura il passaggio da un estremo all'altro senza intermedio, per giusta ragione dovrà esser cosa rara, e difficile, che gli Anemoni ne riescan doppi. A tal proposito è da levarsi un equivoco nato da un passo del Ferrari, dov'egli attesta, come ocular testimonio, che siasi saputo da un suo amico Fiorista, ma tenuto sempre nascosto, il secreto di far venire dai semi quasi tutti doppi gli Anemoni: riferisco le sue parole: *L. 4. C. 8. 2* Ho io più volte veduto nel giardino, che ha in Trastevere Polidoro Nerucci, uomo di natura più amena degli stessi suoi fiori, gli Anemoni dalle foglie larghe d'un anno solo, non ancora traspiantati, poco meno che tutti doppi, e di tal pienezza, che restandone ogn'uno ammirato confessava, non potere in quel genere trovarsi cosa più raguardevole. E pur l'arte d'acconciar il seme, a produrre fiori sì maravigliosi, degnissima di risapersi, è ancora occulta. Perocchè quest'uomo richiesto supplichevolmente da molti amici, a voler far palese questo segreto, ha data quella divina risposta: *Secretum meum mihi 2*

211. Però a levar via l'equivoco d'alcuni sulle citate parole, dico, che non parla egli qui de' nostri Anemo-

mo-

moni, di cui ora trattasi, ma degli Argemoni espressi nella detta fig. 1, i quali chiama egli Anemoni; della foglia larga, come cavasi dalla descrizione, che ne fa L. 2. C. 6. ove più espressamente dice *pag. 180* : L'Anemone dalle foglie larghe, che volgarmente chiamano Argemone : Questa pianta per la molta similitudine, che ha cogli Anemoni, vien fra questi da' Botanici annoverata; ma pur le foglie della sua pianta sono assai più larghe di quelle degli Anemoni, e la diversità del fiore, e di tutta la pianta è tale, che si hanno per una specie subalterna, differente da' comuni Anemoni, de' quali noi qui parliamo. Degli Argemoni non ho potuto far mai esperienza; perchè oltre ai doppi non men' è mai capitato in mano alcuno, che fosse scempio, o semidoppio, abile a far semenza, come l'ho grandemente desiderato. Ma dal parlar medesimo del Ferrari deducesi chiaramente, che gli Argemoni sieguon la regola generale, cioè che dagli scempi ne vengano i semidoppi, e dai semidoppi, che l'Autore appella doppi, altri doppi o semidoppi. Ecco le sue parole L. 3. c. 11. *pag. 335*. : Il miglior seme avrassi dagli Anemoni doppi, tra quelli delle foglie larghe; per lo contrario da' semplici, tra quelli, che l'hanno strette; perocchè il seme di questi fa molto variare il colore, e sovente produce Anemoni dal fior doppio : Il secreto dunque del mentovato Nerucci senza sbaglio era de' soli Argemoni, e non già degli Anemoni: ma benchè sia rimasto occulto, non par, che sia stato altro, che una parte del nostro; cioè lasciava egli a semenzire i soli Argemoni doppi di secondo grado, che sono i semidoppi di primo grado, e tutti n'estirpava gli scempi, con che solamente molta quantità di simili semidoppi, e doppi di secondo grado ancora, ritrar potea dalle semenze: in simil maniera, come detto abbiamo del Signor Godeu *Cap. 12. num. 156*, che senza saperne l'arte, e la ragione, ricavava ottimi Ranun-
coli

coli dal seme, con solamente mantener netto il suo giardino dall' infezione d' ogni fior scempio.

212. Or lasciando gli Argemoni, e tornando a i veri Anemoni, dopochè a replicate pruove mi fui accertato, che i doppi uopo era ritrarre dagli scempi, e la data ragione persuadeami, che vano era lo sperar dagli scempi molta quantità di doppi, senza usar nuove altre industrie, oltre quella di faziare il fior da semenza, colla molta copia delle aliene polveri; quindi, dico, mi son fatto a filosofar seriamente sulla natura particolare degli Anemoni; e pensando, e ripensando, due sole strade mi parvero da tentarsi, per arrivare al termine preteso, nè altre ne ha scoperte fin' ora il mio debole intendimento. Pensui primieramente, ch' era proprietà degli Anemoni il salto senza intermezzo, così nell' ascendere da scempio a doppio, come nello scender, e scadere da doppio a scempio; perocchè ancor quando sdoppia l' Anemone, per quanto almeno so io, non suol passare da doppio a semidoppio, come suole avvenire nelle altre spezie, ma lasciato il grado di mezzo, sene va immediatamente all' altro estremo della scempiezza. Considerai dall' altra banda, che ad un Anemone stato già doppio, e poi scempiato, dovrebb' esser più connaturale, generare il doppio, che ad ogni altro scempio, il qual non fosse stato mai doppio; e però giudicai, che dal seme dello scempiato sperar potrebbe d' Anemoni doppi qualche maggior numero competente. Una sola volta ne ho potuto fin' ora tentar la pruova; sì perchè raro è stato il caso, che qualche Anemone de' miei si sia sdoppiato, e sì perchè mi è ora mancato il comodo, ove tenere in casa vasi di fiori, per far delle sperienze colle mie mani: ed in quella stessa unica volta, che ne tentai la pruova, non son certo dell' esito; perchè non so come, le raccolte semenze furon confuse con altre; e sol mi ricordo, che da tutte quelle raro fu qualche
dop-

doppio, che ne ritrassi. Lascio ad altri l'impegno di tentarne più accuratamente la sorte, e n'è ben degno il tentativo, ancorchè pochissimi sieno i doppi, che se ne ritraggano, purchè si sappia, qual ne sia la sorgente, poichè se in ogni altra specie rari sogliono essere i veri doppi; molto più in questa specie anomala dobbiam esser contenti de' pochi, se si hanno a cavar quasi per miracolo di Natura da' soli scempi.

215. Quando anche que' pochi doppi d'incerto padre sieno itati figli dell'Anemone sdoppiato, restandone io tuttavia incerto della verità, e mal contento della sua troppo scarsa fertilità, rivolsi i miei pensieri, e le mie speranze sopra certi altri scempi, rari anch'essi a farsi vedere, i quali comechè forniti di molti Stami, pure in cima degli Stami non tengon apici, e son realmente menni, e manchevoli di polveri dalla nascita. Questi sembravami tuttavia più disposti de' sopradetti, a partorire i doppi; perchè gli Stami loro senza l'appendice degli Apici non son altro, che que' filetti medesimi, i quali tra il mantello, cioè tra le foglie larghe, ed il fiocco dell'Anemone doppio ne formano la gentilissima coroncina, cioè quella, che sotto del fiocco riman nascosta: a tal che a questi tali Anemoni altro non manca, per esser doppi, se non che i grani de' semi non si son trasmutati in quelle foglioline, che ne compongono la pannocchia. Per tal disposizione, la qual rende l'Anemone come semidoppio, par che la Natura vada disponendo più da vicino lo scempio, senza far salto, alla doppiezza: e però potendosi fondar sopra d'essi una maggior speranza, ne tentai la pruova in due, o tre Anemoni dell'istessa pianta, che per buona sorte n'eran venuti senz'Apici, e senza polveri; e perchè senza polveri i semi non si, sarebbon potuti concepire, mi prevalsi delle polveri de' vicini Anemoni scempi d'ogni colore, ed a man larga per più giorni replicatamente ve le applicai. Al tempo
me-

medesimo allevai più altri scempj destinati a far semenza, e tutti eran da me innestati, e per alquanti giorni abbondantemente faziati colle polveri tratte da' lor compagni, per farne meglio granir la spiga, ed insieme far pruova, se almeno per quest' altra via dell' innesto sortir ne potessero i doppi in qualche maggior quantità.

214. Ma qui ancora mi tradi o la trascuragine, o la dimenticanza, e non so come vennero a confondersi, e mescolarsi insieme le radichette, e le piante dell' una, e dell' altra semenza, nè aver potei la soddisfazione, di saper determinatamente il lor vario risultamento. A buon conto però dal prospero esito al fiorire potei formar concetto, che il secreto della doppiezza nell' una delle due maniere, o anche in ambedue stesse occultato: giacchè da tutti quei semi ne sortirono venti razze di veri doppi, oltre molti semidoppi, d' ogni più bel colore, e tra i doppi due di finissimo turchino adoperati da me nell' innesto, altri rigati di più varie tinte, ed uno assai raro, e gentile di colore incarnatino, che traeva al giallo, non mai da me veduto di tal colore, e nuovo anche per la forma del fiocco, le di cui foglioline non si ergevano in alto al solito sopra i filuzzi della coroncina, ma tutte stando del pari basse a uno stesso livello, il cuor del fiore ne pareva da quelli, come di gentil selba ricoperto, qual sta delineato nella Tav. 7, fig. 4. Atteso il numero delle radiche, ch'erano circa 500, si può contare al quattro per cento il guadagno, il qual non dee parer poco, trattandosi di veri doppi sì rari a venire, eziandio in quelle altre spezie, in cui generano più connaturalmente da' semidoppi, che non come qui da' soli scempi.

215. Mi sono maggiormente confermato nell' accertamento del secreto, quando di più trovai, che il Signor Clarici insegna una delle suddette maniere, per
aver

aver gli Anemoni doppi dalla semenza, di cui ne riferisco il paragrafo *Par. 3. L. 2. C. 2.* Si propaga ancora col seme, il quale s'ha dagli Anemoni semplici, e sempre con profitto, mentre succedono ammirabili varietà ne' colori, ed il miglior seme per aver fiori doppi è quello, che si raccoglie da que' fiori, che negli stami de' bottoni non hanno apici, o sian granella; e fra questi si scelgono li più belli, e che abbiano la foglia stretta, e per ordinario quando s'osservano tali precauzioni, s'hanno per lo più fiori doppi. Spiacemi ch'ei non citi veruna autorità, ovvero sperienza fatta da se, o da altri, per corroborarne l'insegnamento; però sembra sicuro, che debba esser fondato il suo dire sulla sperienza, non essendo proprio di un Autor sì grave, l'asserirlo senza sodo motivo, ovvero sul solo appoggio di qualche ragioncella meramente specolativa, sempre incerta nelle cose fisiche, se non quando l'assodino gli sperimenti. Ma spiacemi sopra tutto, di non averne io potuto altra pruova replicare, per la rarità di tal sorta di anemoni scempi, privi d'apici, e polveri, e come che più d'uno se ne sarebbe potuto trovare fra mille, che ne fioriscono nel Giardino di Palazzo; però ne ho io avuto il comodo, di andarli osservando d'uno in uno diligentemente, come fa d'uopo, per ritrovarli, nè il Giardiniere ha avuta la cura di farlo, o la perizia di saperli riconoscere.

216. Parmi sicuro, che questa sia la vera maniera per ottenere doppi gli Anemoni in quella maggior quantità, che si puole; mentre abbiám cospirato due nel medesimo sentimento, senza che l'uno sapesse dell'altro; poichè io lessi il Clarici molto tempo dopo la pruova fattane, guidato unicamente dal riferito discorso: ma se a cotesta sorta di Anemoni non si faccia l'innesto delle polveri altrui, le quali non hanno essi da se, poco guadagno si potrà sperare da quelle poche pol-

verì, che vi portan fortuitamente gl' Insetti : anz' io coll' innesto degli scempi, che son forniti di Apici, ho cavato ancora de' bellissimi doppi, ma in minor quantità, e però ajutar ci possiamo coll' innesto di questi in mancanza di que' primi, a' quali par che debbasi dar la preferenza.

217. Parliam ora delle Viole, altra specie anomala, che va fuor di regola. Il Sig. Clarici par che consenta, di non trovarsi fra esse le semidoppie, mentre nomina solamente le scempie, e le doppie, e però le doppie non potendosi cavar dalle semidoppie, nè trovandosi Apici, e polveri nelle doppie, per applicarle alle scempie, ancor qui bisogna usar dell' arte industriosa, per far sortire le Viole doppie dalla semenza delle scempie. L'istesso Autore ne prescrive la maniera comprovata dalla continua esperienza, com'egli attesta *Par. 3. Libi 2. Cap. 119*: Per aver dunque Viole doppie (dic'egli) dal seme delle semplici, devesi scegliere una pianta di fior bianco, o d'altri bellicolori, che sia nata di seme, e che sia la prima volta, che fiorisca; e se le levano tutti li fiori dalla cima della spiga maggiore, nel mentre che ha principiato a fiorire, lasciandole quattro fior al più; poi si levano tutti li fiori de' rami, lasciandole però tutte le foglie, acciocchè il sugo filtrato, e depurato in esse, concorra in abbondanza alla nutrizione del seme, che faranno li quattro fiori lasciati, li quali riceveranno sostanza, ed impressione tale, che seminati nel plenilunio di Settembre, o in quello di Marzo, produrranno le Viole doppie, esperimentandosi ciò tutto di, e particolarmente nel famoso Giardino de' Nobili Veneti Barbarighi, situato ne' colli Euganei, nella Valle detta volgarmente San Zibio, dove fra molte rarità di quell' amenissimo Giardino, riescon di straordinaria grandezza, nè temono freddo in quel sito, benchè lasciate in terra tutto l'Inverno:

Que:

218. Questa medesima maniera mi fu comunicata da un Fiorista perito, il quale la praticava poco diversamente, e ne ricavava le Viole per la più parte doppie: cioè da una pianta nuova troncava egli la spiga principale di mezzo, prima che fiorisse, con altre vicine se fosser molte, e lasciava solamente tre, o quattro pipite laterali le più piccole, dalle quali poscia raccogliendo il seme nel plenilunio di Giugno, lo seminava nel plenilunio di Ottobre in terra arenosa, e sciolta, e concia con letame di Pecora recente, pesto ed insieme colla terra sottilmente crivellato. Ma per ora lasciando correr libera la vana osservanza del novilunio, e plenilunio, e di tutte le fasi Lunari, la quale altrove impugneremo, la sostanza del secreto consiste qui, nello sgravar la pianta da molti allievi, a quali non potrebb'ella somministrare molto alimento, e però essi ne riuscirebbero smunti, screati, e scempi; ed al contrario quando pochi ne allevi, debbe allevarli più sani, pingui, e doppi per la copia del nutrimento.

C A P O XVI.

Ristretto delle date istruzioni, ed altre industrie da usarsi, per ottenere buoni fiori dalle semenze.

219. **A**lle riferite industrie se ne possono aggiungere delle altre di non minor rilievo: e parlando ora più generalmente d'ogni sorta di pianta, dalla quale si vogliano cavare i doppi, o semidoppi, sarà pregio dell'opera metter qui per ordine di numeri tutte insieme le regole particolari, e le utili industrie, che si dovranno eseguire.

I. Le piante di fior doppio, e semidoppi o cavanfi

per ordinario da' semi delle semidoppie di più alto grado, e se ne cavano in maggior numero, se vi si adopera l'innesto, o sia l'applicazion delle polveri di altri tali semidoppi, purchè ogni commercio di polveri di fiori scempi vi s'impedisca, come si è diffusamente dimostrato.

220. II. Le piante a fior doppio, e semidoppio possono cavarfi in pari maniera da' fiori scempi, quando gli scempi si castrino, lor troncando le stamigne cogli apici sullo sbucciar del fiore, prima che gli apici fendansi, e spargan le proprie polveri; ma dando lor poi le polveri delle buone razze doppie, e semidoppie, ed impedendo l'accesso d'ogni altra polver di scempio, come fu insegnato. Ma se potranno averfi di quegli scempi naturalmente privi d'apici, e polveri, così fatti dalla natività, cotesti son da preferirsi ai predetti, e come che sono rari in alcune spezie, son da cercarsi diligentemente, come i più abili, e meglio disposti alla doppiezza.

221. III. Se in qualche spezie non si dien le piante semidoppie, come nelle Viole; o si sappia per isperienza, che da' semi delle semidoppie di tale spezie non ne vengano piante a fior doppio, come negli Anemoni; ovvero che le semidoppie non mai, o di rado compiano i semi, come ne' Garofani, con tutto l'innesto delle polveri, che vi si faccia; in tali casi per ottener semi di piante doppie da' fiori scempi, scelgansi per far semenza quegli scempi, i quali più si accostano ai semidoppi, e che mostrano avere pella doppiezza qualche natural disposizione, come già nell'antecedente precetto de' fiori senz'apici si è prescritto.

222. Ma è pur da fogggiugnere delle Viole, che sebbene non abbiano veri semidoppi, non per tanto fra le semplici nate da seme, ne vengono molte di quelle, che i nostri Giardinieri chiaman Viole Bastarde, le quali sono di fior più grande, e di foglia più ampia e foda, che non son le semplici volgari; e da coteste piante, come

avch.

aventi qualche grado di maggior disposizione sopra le mere semplici, le Viole doppie cavar sogliono i nostri Giardinieri, ancorchè non usino altra, che questa precauzione. Un dì costoro, al quale avevo io insegnata la maniera di far venire i fiori buoni dalle semenze, non potendo egli applicarlo alle Viole, suppliva al difetto delle semidoppie con lasciar a semenzire le sole Bastarde, levando via tutte le mere scempie, o mal colorite, e dalle Bastarde, le quali trovavansi nate in mezzo alle doppie, coglieva solamente le sue sementi, parendo a lui forse, che i doppi avesser polveri, per mandar loro il buono insufflo, o che bastasse ad influire la mera lor presenza. Il buon effetto però egli ne provava, ritraendone qualche numero di Viole doppie; e ciò cred'io, avveniva non tanto per la presenza dell'altre Viole doppie, (seppure non si voglia dir, che alcuna di loro, o qualche lor fiore porti talvolta degli Apici nascosti, e delle polveri, come più di una fiata ne ho avuto sospetto;) ma più tosto per la buona disposizione, che hanno in se le Bastarde a produrre i semi doppi, alla qual disposizione, se aggiungasi l'ajuto dell'artificio sopra prescritto, il quale ora faremo generale, per applicarlo ad ogni sorta di piante, si avran doppie le Viole più sicuramente, ed in maggiore abbondanza.

222. IV. Acciocchè i semi di qualsivisa specie ne vengano più robusti, e più facilmente, ed in maggior numero dieno piante di fior doppio, e semidoppio, ajuterà molto l'industria, di sgravare il Cesto dai molti allievi, che suol portare, lasciandogli pochi rami, e pochi fiori a semenzire, in una simil guisa, come si è detto delle Viole, e come si disse più avanti del Caval Cappuccio; due splendidi esempi, che confermano l'utilità di tale industria, autenticata dalla sola ragione, la qual detta, che 'l nutrimento medesimo

de-

destinato per molti allievi, se restringasi a pochi, li tien più sazi, ed essi ne riescon più sani, e copulenti.

223. E qui sorge il dubbio, se abbiano a lasciarsi per semenza i primi fiori, e quei del tronco di mezzo, e più principali, o più tosto i secondi, e gli ultimi, che vengono da' rami laterali. Fa de' primi a favore la plausibil ragione, che sogliono esser più grossi, e più robusti, che i secondi, e gli ultimi, i quali soglion venire più piccoli, e men vigorosi. Così pare a prima vista; ma la stessa grandezza di quelli, e picciolezza di questi si rivolge in argomento contra de' primi a favor de' secondi, ed ultimi: perocchè i primi fiori, come più carichi di foglie, consuman molta sostanza in nutricarle, la quale i secondi, ed ultimi scarichi di foglie, tutta impiegano in allattar meglio i semi. Alla ragione accordasi l'esperienza, che i primi fiori semidoppi, essendo assai pieni di foglie, o non compiono i semi, o i compiuti vi riescon men grossi, e men graniti, che non quei de' seguenti fiori di foglie men copiose. V'è di più, che i fiori d'Inverno primaticci, durando tuttavia rigida la stagione, ne senton gl'inecomodi, nè compier possono tanto bene i semi, come i fiori tardivi, che vanno incontro al bel tempo della Primavera.

224. Quindi son io di sentimento, che s'abbiano migliori semi da' fiori tardivi de' rami laterali, che da' primaticci del tronco principale, massime trattandosi di fiori d'Inverno, e semidoppi di molte foglie: siccome ancora degli estivi ho provato, e l'ho già detto de' Garofani anche scempi, che i primi son difficili a compiere i semi, e più facilmente li maturano i secondi, ed ultimi nel maggior caldo della State, del quale par, che abbiano bisogno per maturarli. Ma parlando de' fiori autunnali, i quali vanno incontro al freddo dell'Inverno, par che possano i primi agli
ulti-

ultimi preferirsi, sebbene non oso affermarlo, per non averne sperienza. Del resto generalmente parlando, si può star sempre sicuro de' secondi giusta l' insegnamento del Ferrarì, e si eviterà il vizio, che possono avere i primi, e la troppa debolezza degli ultimi. L'ordinaria mia pratica è stata, che ho colti i primi fiori con parte de' secondi per goderne, ed il resto gli ho lasciati a far semenza, strappandovi d' attorno i piccoli, ed ultimi figliolini: così ho fatto uso, e guadagno de' più belli fiori, che sono i primi, ed il provento delle semenze è stato più copioso di buone razze, che non quando ne' primi anni lasciava i primi fiori, che come più grossi, e vegeti, più acconci mi sembravano alla generazione della semenza.

225. V. Ad aver fiori doppi, e semidoppi, giova medesimamente la buona coltura, e la buona terra con altri simili ajuti, che possono agevolar così la pianta madre alla produzion de' buoni semi, come pur le piccole figlie nate da quelli, acciocchè non vengano a perder la buona qualità, che seco portano dal semmaterno. Della bontà della terra si è parlato, e della buona coltura se ne parlerà; e solamente qui debbo avvertire una circostanza molto importante intorno al tempo da seminar le semenze; perchè hò qualche sperienza, la qual mostra, che i semi non seminati, quando convien seminarli nel suo giusto tempo, patiscano tal detrimento, che di doppi, che sarebbero stati i lor fiori, ne riescano scempi. Nel Convento di S. Gio: di Badia de' PP. Riformati di S. Francesco essendo io entrato a vedere il lor giardinetto de' fiori, vi trovai molta quantità di bellissime Maraviglie di Francia, dette da' Botanici *Balsamine femmine*, divise in due separati compartimenti, in uno de' quali eran quasi tutte doppie, o semidoppie, ma nell' altro tutte scempie; e pensando io, che quella total diversità fosse pro-

venuta da due differenti semenze, una delle quali fosse stata di pianta semidoppia, e l'altra di scempia; ne interrogai quel Frate, che ve le avea seminate, ed ei mi assicurò, che non erano state due differenti semenze, ma tutte buone della medesima qualità, e colte dalle medesime piante, ed i grani insieme confusi, e tenuti in una medesima carta, e di là presi alla rinfusa senza veruna distinzione: ed ammirandone io il fenomeno, e cercandone da quello la ragione, soggiunse il Frate, che di quella total varietà di doppi, e scempi, la vera cagione altra non poteva essere stata, che la sola diversità del tempo, quando i due compartimenti delle Balsamine erano state seminate, cioè quelle riuscite doppie erano state seminate a tempo proprio nel mese di Marzo; ma le altre, venute scempie, per averne fiori più tardivi, le avea egli seminate in tempo improprio nel mese di Giugno, e però scempie per lo patimento n' erano riuscite.*

226. Io sento, come altrove ho detto, che la doppiezza, e scempiezza de' fiori sia originaria, ed origin traggia dalla prima concezion del seme, e che la buona terra, la coltura, e le altre propizie circostanze non dienno per ordinario almeno la doppiezza, ma più tosto conservino, e poi col tempo manifestino quella, che nel seme ne fu preordinata. Al contrario però la mancanza della buona terra, della coltura, e delle favorevoli altre condizioni, qual'è la ora detta del giusto tempo da seminare, sento che possa pregiudicare alla doppiezza, ancorchè nel seme già concepita, e però faccia scader la pianta al basso della scempiezza, come con altri esempi si è veduto, e per la ragione assegnata, che la Natura non amando la doppiezza, come sterile, e mostruosa, e favoreggiando la scempiezza per la propagazion della specie, direttamente da se pretesa, tien' ella ben pronti gli organi a
far

far delle piante scempie, quante volte se le presenti l'occasione di farle coll'opportunità delle circostanze.

227. In queste cinque regole colle aggiunte industrie contienfi tutto il secreto per aver fiori doppi, e semidoppi dalle semenze, e ciò è tutto quel, che io fo, nè alcuna cosa vi ho omissa. Altri vorrebbe qui aggiunta la sesta regola, molto decantata presso quasi tutti gli Agricoltori, e fioristi anche moderni, nell'osservanza della quale ripongon essi pressochè tutto l'arcano della buona riuscita della pianta, e della doppiezza del fiore; ed è l'osservanza delle Fasi Lunari, nel raccorre i semi, e nel seminarli, ovvero nel piantare, o spiantar le piante, nel potarle, tagliarle ora nel Novilunio, ed ora nel Plenilunio: ma poichè io questa ho avuta sempre per una delle vane osservanze; perciò nè mi son prevaluto mai di tal regola, nè la prescrive ad altri, come inutile, ed insufficiente. Non v'ha ragione, nè sperienza, che ce la persuada in questo secolo più critico de' tempi andati, e più illuminato nella scienza delle cose fisiche, come altrove.

Par. 3, Cap. 25. ne farò seria quistione, e ne darò pruove non disprezzevoli.

228. Le prescritte regole sono state altresì applicate da me a molte altre spezie di piante, oltre alle nominate, per trarne fiori doppi, e semidoppi, di bei colori &c. ed in ogn'una delle spezie provate vi riescono maravigliosamente all'intento, di maniera che per tutte se ne può formare induzione stabile, ed universale. Ne cito qui brevemente alcune spezie, per evitare il tedio, che arrecar suole la replica di cose simili, delle quali possiam già essere, per quel che si è detto, sufficientemente persuasi. Ne ho fatto prova ne' Garofanini d'Inghilterra, raccogliendo i semi da' semidoppi, e doppi senza mistura, che avesse potuto esservi di polveri di scempi, almeno fra i miei, aven-

done strappati tutti gli scempi, benchè avrebbon potuto venirvi le polveri da luoghi vicini; ov' eran degli scempi: ne ho tenuti alcuni custoditi con velo; agli scempi ho troncate preventivamente le stamigne, ed ho lor applicate polveri di semidoppi, e doppi, e di tutti ne ho raccolti semi nella maggior parte feraci di fiori doppi, e semidoppi; ed al contrario dagli scempi, o anche da' semidoppi, e doppi senza l'uso delle predette cautele, i fiori quasi tutti scempi ne son venuti. Così una volta pigliai semenza di Balsamina femina scempia, ove non era veruna doppia, e tutte le Balsamine indi nate furon scempie. All' opposto semina semenza di Crisantemo doppio, che chiamiam noi Girasole, piantato in un luogo, ov' era un altro scempio; ed i fiori ne riusciron doppi circa una metà; e così ho fatto io praticare al Giardiniere di Palazzo, per aver doppie molte Consolide reali, dette da noi Palombelle, de' Papaveri, delle Balsamine femmine, e di tali altre sorti di piante; facendogli levar via le scempie, o almeno almeno gli ho fatto raccogliere i semi dalle doppie, e semidoppie; e così facendo mi è riuscito di fargli tener sempre ricco di fiori pieni il giardino: e tanto basta aver detto per la totale istruzione del promesso secreto.



C A P O XVII.

*Utilità, che posson ricavarfi dall'arte insegnata,
per aver buoni, e copiosi frutti, e per otte-
ner ne' fiori, ne' frutti, e nelle piante
nuovi mostri di terza specie.*

129. **I**L vantaggio, che si ritrae dall'innesto de' fiori colle polveri seminali, non è ristretto a' soli fiori, ma si estende parimente a' frutti, e passa inoltre al guadagno, che si può far di nuove razze mostruose di fiori, frutti, e piante, le quali non mai forse al Mondo altra volta si son vedute. Parlando prima de' frutti, noi potrem raccorre molto maggiore abbondanza di frutti, e di miglior qualità, se ci prevarremo dell'innesto de' loro fiori. Le ragioni, e sperienze, colle quali si è provato, che l'altifziale applicazione delle polveri giova moltissimo ad impregnar bene il Ricettacolo di molti semi, e ben graniti, le medesime appunto provan, che colla stessa applicazione delle polveri otterrem noi molti frutti, e ben condizionati. I frutti della Terra, di cui viviam noi, e gli animali, son tutti o meri semi, come il frumento, l'orzo, i legumi &c. o Ricettacoli di semi, come la pera, la mela, la zucca &c.: e di questi secondi abbiain noi detto nel Trattato I. che il frutto unicamente fatto per la semenza, non suol quasi mai pervenire a maturità, e sen cade acerbo tutte le volte, che i semi nel suo ventre non si poteron concepire; siccome per osservazione da noi fatta benchè basti la concezione di un sol seme, a far compiere il frutto, pur esso, quando di molti ne concepisce pochi, o mal graniti,

ne vuol riuscire magro, e picciolo; ed all' opposto pingue, e grosso, quando gli ha tutt' in seno, e portali ben graniti. Postochè dunque coll' arte d' applicar le polveri al fior fruttifero, e con dargliene in abbondanza, possiam noi far sì, che i semi, ed i grani chiusi nel frutto, o tutti o in gran parte si concepiscano, ed acquistino un ottima granitura; ne siegue senza fallo, che abbiain l' arte in mano vera, e provatissima, da poter raccorre gran numero di frutti e sani, grossi, e d' ottima condizione, tutte le volte che coll' applicazione delle polveri seminali al fior fruttifero ne farem concepire tutti, o in molto numero i semi, e li farem venire prosperamente graniti.

230. Confesso, ch' ella quest' arte non è praticabile in molte spezie di frutta per la malagevolezza, che s' incontra; ma in certe altre non veggio tanta difficoltà, che non se ne possa introdurre la pratica, ove il guadagno riesca notabilmente maggiore della fatica, che convenga impiegarvi. Così foss' ella introdotta, com' è desiderabile, che s' introduca in quelle spezie, nelle quali dee riuscire molto facile, e niente più difficile di quel, che si è veduto nelle spezie de' fiori, nelle quali, s' ella è stata di già introdotta, e praticata da' Fioristi di questo Regno, perchè sen' è veduto il buon effetto, molto maggiormente dovrà introdursi nel genere delle frutta, per averne un vero lucro più sodo. E a darle il primo avviamento, uopo è che persone capaci, e dilettanti d' Agricoltura, mettano essi da se i primi la mano all' opera, e ne istruiscano i lor Giardinieri, ed Ortolani, finchè poi questi provatane l' utilità, possano da se soli esercitarne l' arte, e a pro comune propagarla.

231. Per agevolarne l' introduzione, ed accreditarla, acciocchè non incorra la consueta disgrazia delle cose nuove, che da principio non son curate, seppur ezian-

eziandio non s'ien derise; ricordo primieramente, che il proposto artificio non è del tutto nuovo, anzi è antichissimo in due principali sorte di frutta; ne' Datteri, e ne' Fichi, come può costare dal molto, che sen'è parlato nel Trattato primo. Ivi si è detto, che antichissimamente gli Egiziani ebbero in uso, ed usano al dì d'oggi di troncare i grappoli polverosi della Palma maschile, e di appicarli a' rami della femminil Palma imminenti a' grappoli de' Dattili, o più tosto usano anche con più profitto, d'andare scuotendo le polveri sopra ciascun grappolo femminile, acciocchè più accertatamente le frutta ne vengano fecondate; ed ove son Palmeti folti, ed imboschiti, ancorchè fra le femmine vi si trovino molti maschi, la di cui vicinanza fa loro risparmiar la fatica, di gir portando polveri colle proprie mani; con tutto ciò per l'accerto più sicuro dell'impregnatura di ciascun acino del grappolo, aggiugon essi l'industria, di legar corde tese fra il maschio, e le femmine, acciocchè i moscioni, che nascono dentro l'invoglio del fior mascolino, abbian più comodo il passaggio a piedi dell'una Palma all'altra, o ancora perchè obbligati a volare, scuoterebbon di dosso le polveri, e poche vene porterebbono. Ecco l'innesto da noi proposto, fatto antichissimo, ed esercitato in una gran parte di Mondo, ove son Palme, ed ed ecco le industrie, che vorrem propagate in altre sorti di frutta di pari importanza.

232. Nè dissimili sono, nè meno antiche le industrie, e le fatiche de' Greci, per ottener copiosissimo il raccolto de' fichi: vi faticano intorno per più di due mesi, secondo la relazione del Turnefort, per lo accertamento della fecondazion de' fichi colle polveri seminali de' fichi salvatici, che le producono insieme co' moscioni, che le trasportano, come a suo luogo abbiamo riferito. Pareva al Sig. Turnefort, che lo stesso di

due

due mesi, per accertarne l'esecuzione, costasse troppo più del guadagno, che se ne potesse ricavare; ma gli fu risposto, che il lucro sorpassa di molto la tanta lor fatica, mentre uno de' loro alberi produce ordinariamente fino a 280 libbre di fichi, ove che (soggiugne l'Autore) le nostre ficaje non arrivano a 20 libbre.

233. Ella è dunque antichissima l'artificiale applicazione delle polveri al frutto nascente per concepirsi, e mantenersi saldo in sulla pianta, e crescervi bell' e robusto; il qual effetto è certo, e provatissimo ne' dattili, ne' fichi, ed in tanti altri generi di semenze di fiori, ne' quali è stato già da noi provato; ed il guadagno è sì eccessivo nei frutti già detti, e nelle semenze de' fiori, che vi si può impiegare senza scapito dieci volte tanto di quella poca fatica, che l'artificiosa operazione richiede; e però ne suggerisco qui la pratica per facilitarla, ed i generi delle frutta più importanti, nelle quali si porta con agevolezza, e certo lucro esercitare.

234. Si può primieramente praticare co' Dattili, i quali sebbene nel nostro clima non abbiano il caldo bastevole, per maturarsi all'ultima perfezione; pur se vi si spargan sopra le polveri maschili abbondantemente, riescono pingui, e gustosi poco men, che gli Africani; del che se ne son dati esempi nel Tratt. 1. Si può, e deve praticare co' Fichi, massime co' primaticci, e con altre sorti de' tardivi, delle quali si fa, che senza il benefico influsso de' Fichi salvatici, se ne cadono tutti a terra immaturi. Questa pratica v'è tuttavia in Sicilia, ma non è sì frequente, nè sì giusta, e corretta, come dovrebbe essere, e qual la praticano i Greci nell' Isole dell' Arcipelago. E qui consiglio ai Padroni de' fichereti due cose: in primo luogo, che dieno essi ad intendere ai lor Villani tutta l'arte della Caprificazione de' Fichi ivi descritta, e la

maniera pratica d' esercitarla ; acciocchè la loro esecuzione venga meglio guidata dall' intelligenza della ragione , per cui si fa la tale , e tal' altra operazione , e ciò sia detto pure per altre simili pratiche , dando loro principalmente ad intendere , che le polveri applicate a' Ricettacoli hanno virtù di farvi concepire i semi , e co' semi le frutta &c.

235. Per mancanza di questa cognizione , e per l' errore stato comune per lo addietro , fin presso i Dotti , che il buon effetto della Caprificazione facciasi da' Moscioni colle lor morscchiature , n' è venuto l' errore ne' nostri Agricoltori di appiccare alle Ficaje in vece di Fichi salvatici , le borse , o escrescenze delle foglie dell' Olmo , perchè le veggono piene di Gorgogli , simili ai Moscioni del Caprifico ; e per simile ignoranza , come fu detto nel Tratt. I , sbaglian pure i Greci medesimi , i quali quando lor mancano i Moscioni del Caprifico , prevalgonfi de' fiori d' altra pianta , ch' essi chiamano Ascolimbri ; perchè veggono qualche volta su i nominati fiori i medesimi Moscioni , ma perchè questi Moscioni non portan seco addosso le medesime polveri del Caprifico , perciò non ne pruovano il medesimo buon effetto , e vi perdon vanamente la fatica .

236. In secondo luogo consiglio i Padroni a render facile ai lor Giardinieri la Caprificazione , con far piantare più Caprifichi in mezzo alle Ficaje , o nei contorni , e nelle siepi del Fichereto ; acciocchè l' abbiano quivi pronti , e non debbano girar in cerca nelle campagna più erme , ove l' umana non curanza , per non saperne tutto il pregio , e l' utilità , gli ha dannosamente sequestrati : anzi aggiungo , che la sola vicinanza , e presenza de' Caprifichi possa bastare a render feconde le Ficaje , senza l' incomodo di andare appiccando alle lor braccia i Fichi salvatici ; perchè i

Mo-

Moscioni ; per trovare il suo pascolo ne' Fichi dime-
stici , vi volan da se , e vi portan le polveri , che li
feccondano . E qui avverto , che non tutte son Capri-
fichi le Ficaje , che chiamiam salvatiche , poichè vi
son le salvatiche nate da qualche granellino di seme ,
le quali al solito degli alberi nati da seme , se non
s'innestino , producon sempre piccolo , e cattivo il
frutto ; e queste non son Caprifichi , ma son Caprifi-
chi certe altre Ficaje salvatiche , le quali producono
il fico pieno di stamigne , e polveri , e moscioni , che
ne sono il vero contrasegno per riconoscerli .

237. Passando ora alle altre spezie di frutta , nel-
le quali sarebbe nuova l'artifiziosa applicazione delle
polveri , ma non già senza i predetti due splendidissi-
mi esempli ; rammento in prima i Pistacchi , e qual-
che altra simile spezie di due sessi , com' è il Carru-
bo , il Terebinto , (seppure il suo frutto sia tanto sti-
mabile , quant' è quel de' Pistacchi ,) de' quali per-
chè si è parlato lungamente nel *Tratt. 1. , Cap. 23. n.*
314, e seg. ed ivi se n'è data per minuto l'istruzione per
l'applicazione delle polveri , non ho qui altro da soggiu-
gnere . Se non che per mera erudizione dico soltanto , che
dopo la stampa del Trattato I. mi è capitato alle mani un
librettino : *Caroli Linnei Regnum Vegetabile summatus
redactum , curante Xaverio Manetti* : e poichè del celebre
Linneo non potei aver l'Opera , come ho detto Cap. 2
n. 18 , metto qui ciò , che truovo nel detto compendio
§. 60 , ch'è al nostro proposito di far fruttare i Pistac-
chi : *In Sicilia florum racemos e Pistacia mare decerpunt
Rustici ; in umbra paulatim exsiccant , Et postea ramis arbo-
ris fructiferæ , sive semina adligant , ut pulvis fecundans
ventorum ope hinc inde supra arbores dispergatur , & pistil-
la fecunditatem recipiant . Alii flores eosdem masculos colli-
gunt , in sacculis siccandos exponunt , Et pulverem prolificum
in feminæ flores spargunt , ne fructus deficiant , abortiant ,*

minui edules proferantur. Bocc. Masco di Fifica. Obser.
 44. *Geoff. Mas. Med. 2. pag. 417.* Non mi trovo questi due Autori citati, per veder ond'abbiano essi avuta la notizia di cotal pratica, che sia mai stata in Sicilia, d'applicare alle femmine de' Pistacchi le polveri del maschio: dubito che sia stata, chi sa come, presunta dal Geoffroi, o da altro, che la potè creder verisimile sulla idea di ciò, che praticasi colle Palme: giacchè per quante notizie ho pigliate da' Periti di questa coltura, non fanno essi, che mai siavi stato un tal costume, anzi neppur sapeasi comunemente, ch'ella virtù del maschio consista nelle sue polveri; ne' de' Scrittori nostri d'Agricoltura, o Botanica so che alcuno ne parli; e ne parlerebbe sicuramente il Sig. Barone di S. Giaimo il più moderno, ed accurato, il qual trattando diffusamente de' Pistacchi non ne fa parola. L'Autore poi Cinquecentista Venuto, come nel Capo 22. del *Trat. 1.* si disse, non parla niente de' Pistacchi, come se non vi fossero stati al suo tempo in Sicilia; e però non sembra, pratica nè antica, nè moderna. Ma quando mai essa fosse stata in uso, e poi trascurata, tanto maggiormente dovriammo animarci a reintrodurla, come qui torno ad esortare.

228. Dalle piante di due sessi, pelle quali è più necessaria la lodata industria, nè vengo alle piante Ermafrodite, cioè quelle, le quali portan l'uno, e l'altro sesso sullo stesso piede, distinto però in due diversi fiori, uno maschio colle sole polveri, e l'altro femmineo col solo frutto; e questi ancora hanno uopo di qualche aiuto delle nostre mani per la fecondazione del proprio frutto; poichè gl'Insetti, a' quali per ordinario è commessa dal provido Iddio l'incombenza, di trasferir le polveri da un fiore all'altro, per l'ignoranza di non saper quel, che si facciano, e per altri accidenti, spesso accade, che ne trascurano, puntualmente almeno, l'esecuzione; e però se supplirem noi alle lor mancanze, ap-

plicando le polveri del maschio fiore sulla tromba del femminile senza più, e senza meno potrem quasi raccorre tanti frutti, quanti fiori femminili sbucciano sulla pianta. Di questo genere sono il Noce, il Nocciuolo, il Castagno, il Pino &c. ed ogni sorta di cucurbitacei, Zucche, Cocomeri, Peponi, Melloni, e l' Mais, o sia il frumento d' India. Di que' primi poco eseguibile parerà l' impresa, per esser alberi alti, e che per altro soglion da se caricarsi di frutta; attesa la gran quantità de' loro Amenti, o Juli, straccarichi di polvere, e di polvere asciutta, e sciolta, che di leggieri cade dagli Apici ad ogni moto d' aura sopra i soggetti, e vicinissimi embrioni delle frutta, oltre quell' altra porzione di polvere, che vi posson portar gl' Insetti: sicchè per questi è stata data da Dio tutta la buona provvidenza, per non aver bisogno di nostro ajuto.

229. Ma per le piante cucurbitacee, o altri simili, non vi ha scusa, che può arrecarsi, essendo facilissimo il troncare i fiori maschili, o più tosto tagliar colle forbici il solo cuor di mezzo, intorno al quale serpeggian gli Apici, come tante vene, che lo ricuoprano, e colle forbici medesime può inserirsi fra le foglie del fioretto, che il frutto porta in sulla testa, allorchè questo apresi, e dà il segno, che sia il tempo della sua fecondazione, e così ne verrà esso infallibilmente fecondato. Di queste frutta molte ne muojono nella prima infanzia; ed è credibile, che ne muojano per indigenza di quello spirito vitale, che in vano talor aspettano dalle polveri, se non vi sieno trasportate dagli Insetti, i quali non rare volte mancano al lor dovere. Ne ho fatto io alquante pruove nelle Balsamine, ne Melloncelli odorosi, e nelle Zucche, e quasi tutti que' frutti nascenti, a' quali ho somministrato le polveri del fior maschio, son vivuti, e venuti su felicemente; toltone qualch' uno, a cui altro malore è sopraggiunto.

Re-

230. Restano in fine le piante fruttifere del terzo genere di fiore Androgino, contenente l'uno, e l'altro sesso; cioè il frutto insieme, ne' gli Apici colle polveri ed in còste sembrerà forse ad alcuno totalmente superflua l'applicazion delle polveri di un fiore all' altro; perchè avendole in se stesso, non ha duopo delle aliene; maggiormente che nel più delle spezie non è ciò in verun conto praticabile, come per esempio nelle spighe delle biade, ne' grappoli delle uve &c. Così è veramente, ma pur'è vero ancora, che si può eseguire in molti altri generi, quasi colla facilità medesima, con cui si esercita ne' nostri fiori di delizia, ne' quali siccome ottenghiam molti, e buoni semi collo spargimento delle polveri aliene, così ancora ne' fiori a frutto per parità di ragione possiam conseguire un egual profitto di buoni, e copiosi frutti, quando avrem la pazienza di prevalerci del medesimo artificio. Sarà facile per altro ad eseguirsi ne' Peri, ne' Meli, ne' Pesci, ed in più altri; per la gran copia de' fiori, di cui son forniti nella Primavera; ciò che si potrà fare, cogliendo parte de' fiori dell' albero medesimo, o anche senza corli avvicinandoli, ed accozzandoli insieme, e con i loro Apici polverosi, se sieno eminenti, fregando leggermente l'uno contra l'altro sulla Tromba del fiore, che si lascia a fruttificare; oppur tagliando gli Apici colle forbici, e gettandoli nel cuor del fiore; e per quanto si potrà sulla cima della Tromba. Ma senza niente di tutto questo, mi sovviene anche una maniera più facile: i fiori fruttiferi sogliono esser copiosi di molti Apici, e molte polveri; e però senza cercar, ed applicar polveri dagli altri fiori, potranno sol agitarsi le mobili stamigne, ed i tremoli Apici del fior medesimo con un fuscelletto alla mano, acciocchè le polveri scosse cadono copiosamente sopra la Tuba, o forzando gli Stami a piegarsi, tanto che gli Apici vadano a toccar la

cima della Tuba , e lascino sopra di quella molte polveri attaccate .

231. So io che il tenero frutto , ancorchè già conceputo , sta tuttavia esposto a più disastri di gelo , che lo assidera , di caldo Sole , massime dopo il gelo notturno , che lo scotta , di vermini , che lo tarlano , di gragnuole , che lo colpiscono , di turbini , che lo atterrano , e di piogge , e nebbie maligne , che lo corrompono ; ma so pure per isperienza ne' nostri fiori , specialmente ne' Garofani , che sono assai cagionevoli , per compiere i semi , e ne' fiori cucurbitacei facili anch' essi a sconcertarsi , che le sementi , e le frutta col soccorso delle polveri femminali , date a' fiori con abbondanza , ne vengon assai meglio conceputi , e sì forti , e robusti ne riescono , che non cedon così frequentemente alle traversie , e si mantengon più saldi nel tempo stesso , che gli altri , a' quali non fu sovvenuto con un pari soccorso , miseramente periscono . Spiacemi assai , che non ho avuto il comodo d' andar facendo diversi altri sperimenti ne' differenti generi delle frutta ; non già che io o altri , che abbia ben ponderate l' esposte ragioni , e sperienze , possiamo aver ombra di dubbio del buon successo ; ma più tosto per poter determinare la quantità del guadagno , che da ciascuna specie particolare potria ritrarsi ; ciò che lascio ad eseguire a persone industriose , le quali abbiano zelo del proprio , e del pubblico vantaggio ; ed io intanto sarò contento , di aver suggerita la maniera , come possa almeno divertirsi nel suo dimestico giardinetto un Dilettante d' Agricoltura , il qual non abbia a comprar caro il tempo , e lo possa onestamente impiegare , in andare innestando , e faziando di polveri i fiori di qualche suo più caro alberetto ; quello che più degli altri meriti la sua particolare attenzione per la preziosità del frutto . Così egli poscia sarà per vedere

dere nella State con particolar soddisfazione il caro alberetto soccombere al peso, e piegar giù i rami sotto il grave incarco di gran numero di frutta, le quali già mature colla lor venosità, grossezza, e prelibato sapore inviteranno la stessa mano benefica del Coltivatore a sgravarnelo, ed a gustare il soave frutto della propria industria.

232. Continuando a calcare il sentiero medesimo, ed insistendo all' applicazione delle polveri seminali di un fiore all' altro, par che se ne venga come da se, ad incontrarci un'altra non men pregiabile utilità; ed ella è, che se noi daremo al fiore di una qualche specie le polveri di un altro fiore di specie differente, par sicuro, che ne debba venir un frutto di terza specie, misto di ambedue, forse totalmente nuovo, e mostruoso. Adagio però un poco; perchè sebbene il corollario sia legittimo, e immediatamente dedotto dalle premesse dottrine, non pertanto va esente delle sue valide difficoltà. In prima bisogna avvertire, che il frutto di tal fiore non verrà esso immediatamente quel mostruoso, che si pretende; ma sarà tal quale dovea essere della sola sua specie. Poichè quando noi detto abbiam de' fiori, che riescono simili ai padri, che li generano, e se i generanti eran dissimili, ne fortisce ne' figli un misto confuso delle paterne sembianze; abbiain ciò asserito non già di quello stesso fiore, e del suo Ricettacolo, che n' è il frutto, il qual' è già esistente nella propria sua forma, prima della fecondazione delle polveri, ne' può esso trasmutarsi in altro di quel, che già era ed è; ma detto abbiain più tosto, che la mutazione, e la mistura delle paterne differenti fattezze si fa ne' semi di quel Ricettacolo, in cui concorsero due differenti virtù seminali per impregnarlo: e però come da' semi in cotal guisa concepiti sono unicamente da sperarsi i fiori misti; così per
otte-

ottenere frutti di terza spezie, misti di due; convien prima far l'innesto del fior fruttifero con polveri di aliena spezie; e quando queste fortunatamente vi allignino, e 'l frutto vi si concepisca, estrarrene poscia i semi, che contien dentro, hanno questi a suo tempo nella debita maniera a seminarfi, e allora potrà per avventura sortirne almeno qualche pianta, se non tutte, mista di due spezie, misti i suoi fiori, e misti finalmente i frutti, e di terza spezie, come si desiderano.

233. Ciò premesso, vengo alla massima difficoltà, che per ciò conseguire s'incontra. Sarebb' ella per sicuro una bella gran cosa, aver l'arte in mano da poter far sortire dalla terra sempre nuove spezie di piante, di fiori, e di frutta non mai vedute, tutte fra lor diverse, ed in mille varie guise mirabili, e mostruose. Ma tutto il difficile sta qui, che s'incontrino tra le spezie diverse due complessioni omogenee, tanto che le polveri d'una possano allignare sul fior dell'altra, ed i semi vi si possano concepire. La Natura odia i mostri, ed o ce li vieta assolutamente, o celi difficoltà tanto, che sien rari, così negli Animali, come nelle piante. Che si diano nel gener delle piante i misti di due spezie subalterne, poco fra lor diverse; è cosa certa, da non mettersi in controversia; e la maniera, per farneli così venire, ella è quella ora detta coll'applicazion delle diverse polveri, come viene pienamente contestato da' riferiti inbastardimenti de' Broccoloni, del Cavol fiore, del Cavol Cappuccio &c. ma che si diano i veri mostri totali, composti di due spezie notabilmente diverse, e disparate, come sarebbe di Tulipano, e di Anemone, di Fagiuolo, e Cece, di Pero, e Pomo; ella è lunga, e difficil questione, che imprendo a risolvere separatamente ne' due Capi susseguenti.

C A P O XVIII.

*Quistione, se si dieno nelle piante i mostri
totali risultanti da due specie
disparate?*

234. **F**Rancesco Eulalio Savastani celebre insieme Botanico, e Poeta fa una raccolta di più mostri, e tralignamenti di piante, e felicemente li descrive in verso esametro nel libro 3. delle Cose Botaniche; e qui apporta il tralignamento, che va per le bocche di tutti, delle spighe del Frumento, nelle quali talora trovansi nati insieme o grani Avena-cci, o grani d' Orzo, o di Segala; che nominiam *Germano*; ma il parlar di questo lo rimetto più abbasso. Di più soggiugne la Metamorfosi di alcune piante bulbose, le quali lungamente tenute nel primo suolo natio, in altre specie si son cangiate, come dall' antica cipolla del Zafferano vuolsi, che ne germogli la Spadella, o sia il Ghiaggiuolo; e dalla Viola bianca il Giacinto porporino; e che dipoi al contrario a nuova piantagion di questo Giacinto ne fortisca nuovamente la Viola con mirabile alternativa. Tali fenomeni furon osservati dal Sig. Sarok, com' egli attesta nel suo libro *De Propagat. Plant. C. 1. n. 4.*, ove dice: *Plantas nonnullas bulbosas diuturniore mora in eodem loco, mirabili sane metamorphosi in alias species degenerasse, nempe Crocum in Gladiolum &c.* Ma il Sig. Rajo, che lo riferisce, non gli vuol credere, ancorchè quegli volesse attestarlo con giuramento: son certo anch' io, che il Sarok ha preso sbaglio, e sono facili quest' inganni per chi è credulo, e non osserva le cose con diligenza, essen-

essendo facilissimo, che truovisi caduta, o lasciata trascuratamente nella terra qualche altra diversa radice, o semenza, o cipolletta; e noi Fioristi vediamo spessissimo succeder queste supposte metamorfosi di sola incuria, che piantiam di una razza, e con quella ne nasce un'altra, la qual si trovava quivi nascosta.

235. Finalmente adduce il Savastani le mutazioni, che fanno alcune piante col piantarsi da uno in altro luogo; come del Garofano dice, che più volte trapiantato più aumenta il numero delle foglie, e si fa doppio, e doppie faccianfi altre piante, specialmente l'Anemone, e l'Ermodattilo, detto pure Zafferano selvaggio, da' boschi alla coltura ortense trasportate. Che la coltura, e la sceltrezza del terreno, ed il rinnovare spesso la terra, cambiando la sfruttata colla nuova, possa cagionar qualche aumento di foglie al fiore, è cosa certa; ma non è sì certo, come va per le bocche di molti, che la coltura, e 'l buon terreno faccia passare i fiori selvatici di scempi, che sono naturalmente, ad esser doppi; e 'l non averlo mai veduto succedere, e 'l non averne udito alcun certo racconto, ci fa dubitar della verità, o sarà ella ben cosa rara.

236. Degli altri Autori v'è il Sig. Carlo Stefano Franzese, il quale asserisce una metamorfosi tanto ardua, che non si può ammetter per vera nel nostro critico secolo, sebbene quand'egli la scrisse, prima di un secolo e mezzo addietro, anzi più anticamente, quando la scrisse Palladio, ond'ei poté averla tolta *L. 3. Tit. 24. Semen Brassicae mutatur in Rapa*; allora dico passava per così certa, che vi si era fondato sopra un volgare adagio. Egli dunque nella sua copiosissima Agricoltura, tradotta in nostra favella dal Cavalier Ercole Cato *Venez. 1606*, ove parla della semenza de' Cavoli, dice così: e Abbiate avvertenza, che il seme non sia troppo vecchio, perchè produrrà non

Cavoli, ma **Rape**: dond' è nato il proverbio, che si dice: *Seminatevi de' Cavoli, e vi verran delle Rape, o de' Navoni*; nondimeno dura sei anni in bontà, se è ben custodito: Come poco fa si è detto della metamorfosi de' Bulbi malamente appresa, così ora quel l'errore di questo proverbio debbe avere avuta sua nascita da' grani delle Rape, e de' Navoni, che facilmente cadono in terra negli orti, o dispergonsi quà, e là; o in altra guisa rimangon sparsi in quel terreno, ove si era seminata la semenza de' Cavoli, la qual non potendo germogliare per lo male dell'antichità, ed in suo luogo nascendo le semenze giovani delle Rape, e de' Navoni, potè ciò porgere occasione al volgo trascurato, di giudicar falsamente, che la semenza de' Cavoli in Rape, e Navoni sia tralignata.

237. Teofrasto commemora alcuni altri tralignamenti, e con savia cautela non se ne fa egli autore, ma li riferisce, come detti da altri, oppure non li dà per rigorosi tralignamenti. Del Sismbrìo, che altrè presso Plinio chiaman Timbreo, simile al Nasturzio, in più luoghi riferisce, che si trasmuti in Menta, o Nepitella, e che ciò succeda, quando per incuria si lascia incolto, o non si traspianta, e si lascia lungamente nello stesso suolo: così pure del Basilico, che si cangi in Sermollino, qualora stia troppo esposto al Sole, ma dell'uno, e dell'altro sostiene, che non sieno veri tralignamenti; poichè il Sismbrìo perde solamente l'acutezza dell'odore, il quale indebolito fa che confondasi colla Menta, o Nepitella; ed al contrario il Basilico esposto al Sole, rende un odor più acuto, e fa più piccole le foglie, onde poi assomigliasi al Sermollino; e però egli conchiude *L. 5, c. 8. de Causis Plant. Sed ejusmodi mutationes ita evenire putandum, ut aliquid similitudinis faciant, non ut omnino speciem expriment alienam*. Ed al *Libro 2, C. 21* riferisce l'opinione, che 'l Pioppo

T. II.

Z

bian-

bianco, si muti in nero, non solamente di foglia, ma in tutta l'apparenza. *Populum candidum transire in nigrum tum fronde, tum etiam tota specie, ajunt*: la qual mutazione, soggiugn' egli, se veramente avvenga, ella succede quando l'albero si va facendo più grosso, e per cagione della maggior età: *Populi, si ejusmodi mutatio fit, tunc fiet profectò, cum amplius crassescere arbor incœperit, quod evenire ætatis causâ solet.*

238. Ma il più celebre, e più controverso traligamento, è quello, che dicesi del frumento, che si muti in loglio, con vera, e propria trasmutazione; e Teofrasto, vi aggiugne il lino, che ancora si muti in loglio: *Triticum item, linumque lolii capessere speciem, ajunt*. Altri, al riferir del medesimo Teofrasto, ammetton la metamorfosi scambievole dell' Orzo in Frumento, e del Frumento in Orzo *L. 2. c. 3. Quidam etiam ex bordeo triticum, & ex tritico bordeum gigni, eodemque fundo, id fieri, ajunt*: ed altri senton, che anche l'Orzo si muti in Loglio, e che queste mutazioni succedano negli anni piovosi, e con ispezialità nei terreni umidi: *Nullum, dic' egli L. 8. c. 6., ex seminibus corruptum mutari in aliud, aptum est; præterquam triticum, atque ordeum, que mutari in Lolium asserunt, magisque triticum. Idque imbribus frequentantibus fieri, & præcipuè locis humidis, & imbre dilutis.* Se tali metamorfosi abbiano a tenerfi per vere, o per false, io non so, con ragioni, e sperienze, che sieno indubitate, determinarlo; però con grandissima probabilità le ho per apocrife: ma più che ne cerco sincere relazioni per provarle insufficienti, più mi trovo imbarazzato; e m' imbarazza la voce assai comune, derivata dai tempi antichi fino al dì d'oggi nella maggior parte degli uomini di campagna, li quali l'attestano come cosa certa; o perchè così sempre hanno sentito dire da altri, o perchè taluno eziandio se ne protesta ocular testimonio. Ne ho voluto dimandare ad al-

cuni.

tutti praticissimi Uomini, che hanno menata la maggior parte della lor vita nella cura de' seminati, e molti di essi hanno risposto di sì. Ho trovato però alcuni altri o campagnuoli, o assai esperti nella campagna, i quali non aderiscono a questi tralignamenti, e li stimano meri pregiudizj delle rozze teste de' Villani. Veggo di più il gran Marcello Malpighi, che almeno ha per incerto il fenomeno, e par che inclini a negarlo, per isperimento fattone da se, e da certi suoi amici: così egli scrive nella risposta al Sig. Giov. Battista Triumfetti: *Constat vegetatione, metamorphosi, inedia plantas in alias degenerare; & probat exemplo plurium, & precipue Triticum in Lolium, & Lolii in Triticum versi.* Al che risponde il Malpighi: *Primo itaque nondum certum est de integritate, & successu experimenti; nam facienti mihi, & amicis tritici metamorphosis non successit. Oper. posth. fol. 68. Londini.*

239. Alcuni pretendon comprovare una tal metamorfosi con dire, ch' essi avendo scelte le spighe del frumento d'una in una, per servir di semenza, pure in quel terreno, ov' era stata seminata tal semenza, che dovea tutta germogliar di frumento, si è veduta nascere qualche porzion di Loglio. Dico tuttavia, che l' loro sperimento è assai rozzo, e fallace: perchè so quanto siano grossolane le sperienze, che passan per mano de' contadini; dicon essi, d' avere scelte d' una in una le spighe, e le hanno scelte a dieci, ed a venti la volta, o anche ad interi manipoli, ed in quelle spighe, chi sa quante spighe di Loglio si sono trascurate, e vi son passate nascoste? Chi sa pure quanti grani di Loglio trovavansi restati nel suolo dell' aja, ove le scelte spighe del buon frumento furon triturate, o ne' sacchi, o nel suolo istesso del magazzino, trascuratamente spazzato, e chi sa in quante altre maniere potè il Loglio colla buona semenza framischiarsi? Perché dato, e non

conceduto, che la semenza sia stata di mero frumento sceltissimo, posson anche trovarsi molti grani di Loglio, e forse ancora le sue radici vive dagli anni passati in quel terreno, onde poi sorge il Loglio insieme colla scelta semenza. Le spighe del loglio sempre che si veggano, si scartano dai manipoli, e si gettano in terra, e molta quantità ne rimane sparfa per que' terreni, che di poi torniam noi a seminare. Or di questa ria semenza che se ne fa mai? rinasce' ella, o no? S'ella rinasce, si moltiplica sempre più; ed ecco il terreno tutto di Loglio infetto, e che sempre ogn'anno ripullula, e vieppiù si moltiplica, e sparso per ogni terreno, come tanti altri semi cattivi, non manca mai di rinascervi insieme col buon frumento. Se nasce nel terreno coltivato infra le biade, se vi restano quivi caduti i suoi grani, se i grani vi rinascono, ancorchè il terreno vi rimanga incolto; tornerà esso a nascer quivi medesimo insieme colle biade, quando un'altra volta vi si farà il seminato.

240. Ed intorno a ciò ho io sempre avuto sospetto, che 'l Loglio rinasca forse ogn'anno, eziandio nel terreno incolto, e nelle stesse Invernate secchericce, ancorchè i contadini dicano comunemente di nò, o che almanco ne nasca pochissimo: ho io dubitato, che il Loglio senza coltura, e col patimento della siccità venga sì magro, e sì tramutato, dall'apparenza sua propria, ch' appena si possa per desso riconoscere, e con ciò inganni gli occhi de' Rustici grossolani, e disattenti, sino a parer, che non vi sia, mentre vi è così notabilmente travisato. Molto più mi son confermato nel mio sospetto per quel, che asserivami un Uomo assai esperto di campagna, il qual disse mi, che nel terreno incolto, e negli anni meno piovosi nascer suole in vece di loglio il Logliolino; ed egli era di parere, che 'l loglio si mutasse in Logliolino, la di cui pianta è simile a quella del loglio; ma perchè è più piccola, di foglia più stret-

ta, e di semi più minuti, i quali per ciò cadono i primi nel crivellare il frumento, e non vi restano come il Loglio framschiati; quindi è, che gli uomini di campagna o non l'hanno per Loglio, o non lo curano, e non l'odiano come pernizioso, e spacciano a noi poscia la carota del frumento mutato in Loglio; quando altro non farà forse il mistero, che il Loglio rinasca ogn'anno in ogni terreno, ma nella terra incolta, o anche nella colta, se sia l'anno secco, rinasca travisato da Logliolino scarno, piccolo, e sparuto; ma se poi essi incontra la coltura, e le copiose piogge, tanto che v possa crescere a giusta forma, e statura, vi riassume le naturali fattezze di Loglio, e nel visaggio suo proprio come totalmente nuovo vi ricomparisce.

241. Ma quando dipoi vera fosse l'altra parte del proposto disgiunto, che la ria sementa del loglio non ripulluli nelle terre incolte, e negli anni secchericci; uopo è dire, che o viva si conservi la stessa semente del loglio, o vive restino le radici della sua pianta, e che poscia succedendo l'anno piovofo, coll'ajuto della coltura, rinasca la semente, o ripullulino le radici. Il sistema ora proposto mi si rende assai verisimile per alcune riflessioni, che vo facendo; perchè da una parte certo è, che nessuna pianta nasce, la qual non abbia origine dal seme, ed è pure induzione universalissima, che ogni pianta venga dal seme della sua specie, non già dal seme d'altra specie da se aliena; nè senza un positivo, e sodo sperimento da tal legge universalissima può darsi eccezione al solo loglio, o a poche altre piante per la sola voce del volgo, che così spaccia, sì leggiero, e sì facile a spacciar maraviglie. Il volgo non ha creduto sempre, ed anche oggidì non crede, dopo tanti reclami de' moderni Filosofi, che nascano le cattive piante, e l'Loglio medesimo dal solo terreno senza semente, che ve le produca? e così egli è da dir-

dirsi, che sbagli per una simile incuria nel caso nostro; che come non accorgesi delle semenze, che cadono, e restano sul terreno, onde ne germogliano l'erbe cattive; così non si avvede del loglio, e delle sue radici, che restano, onde poi venga quello insieme col frumento a tempo propizio riprodotto.

242. Dall'altra parte tengo io gran sospetto, che i grani del loglio sien durissimi a corrompersi; e però possano per uno, e più anni intatti, e vegeti perseverare, finchè arrivi loro il tempo propizio, che li può far germogliare. Il mio sospetto è fondato nell'effetto medesimo, che veggiamo: il Loglio non suol troppo nascere negli anni di siccità, ma sol ne' piovosi nasce in molta copia; onde Teofrasto dice: *Lolium verò aquam vehementissimè amat. L. 2. C. 21.* dunque per ischiudersi, e cacciar fuori il suo germe, ha esso bisogno d'esser dall'acqua lungamente macerato: ma se lungamente macerato non si corrompe, ed anzi allora nasce più lieto; molto meno si corromperà negli anni secchericci, quando l'umido non arriva troppo a macerar, e penetrar le sue duplicate spoglie assai dure, e serrate, per introdursi nella sostanza de' Lolj, ed eccitarvi una moderata fermentazione, ch'è quella, che i semi fa germogliare, o una più violenta fermentazione, ch'è quella, che li corrompe; e però sembra ragionevole il mio sospetto, che'l Loglio aspetti un Inverno acquazzoso per germogliare, ed intanto per un anno, e forse più se sia scarso d'acqua, bell' e vivo si mantenga. Non è nuovo, che alcuni semi sieno difficilissimi a schiudersi, nè germinano se non dopo una lunga macerazione: così è la semenza de' Ranuncoli, la qual bisogna tener sempre bagnata all'ombra, ed al fresco, e con tutto ciò non spunta ella da terra, se non che per ordinario dopo due mesi, e qualche volta in tempo di siccità mi è nata, dopo tre mesi, e dopo un anno nel secondo inverno

nacque una volta al P. D'Ardene, com' ei racconta *pag.* 237; e pure questi semolini son di spoglia estremamente sottile: così è il seme del Quamoclit, o sia Gelsomino vermiglio, o Convolvolo Americano, del qual parleremo nella Coltura particolare alla parola *Convolvulus*, e così è il seme della Fritillaria, del qual pure a suo luogo parleremo; il primo tarda a nascere: ora uno, ora due, ed ora tre anni, e l'altro nasce stabilmente dopo tre anni; e così costa di altre semenze tenacissime a germinare; o che non germinano se non se in certe sole circostanze, che lor convengano.

243. A proposito mi è stato raccontato da un perito Coltrivator di campagna, che non avendo egli altro che seminare in un pezzo di terreno rimasto gli vuoto, vi gettò dentro la crivellatura del frumento, che sola gli era rimasta, da servire almeno per pascolo da poter dare al giumento. Di questa sementa la maggior parte era loglio, e la minor parte era frumento magro, e mal granito, però con sua gran meraviglia nacque il solo solo frumento, e vi riuscì gagliardissimo, e diede un'abbondante raccolta, e di tanto loglio non ne sortì un solo filo d'erba, nè mai per quell'anno vi comparve, ed appunto corse quell'Inverno scarso di piogge. Tornò egli a seminar grano sulla stoppia del medesimo terreno, e corse anche secchericcio quest'anno, n'ebbe altra buona raccolta, senzachè il loglio vi comparisse, aspettando verisimilmente ancora vivo un'Inverno più rigida per germinare. Se poi vi sia germinato, o no? egli nol fa ridire, perchè lasciò a riposo quella terra, nè pensò più al loglio; che non curava, come suol fare questa sorta di gente rusticana, che bada solo all'utile presente, e non bada mica a quelle utilità, che arrecar posson le giuste notizie sperimentali per lo buon regolamento dell'Agricoltura.

249. Può similmente pensarsi delle radici del loglio,

glio, che fieno di quelle razze, che conservansi vive per uno, e per più anni, e ch'esse ancora sieguano l'indole della lor sementa, cioè germogliano solamente con le grandi piogge continuate. Ven' è qualch' esempio nell'Avena, i semi della quale una volta che sieno caduti nel terreno, vi germogliano per tre anni susseguenti; poichè ogni seme si compone di tre germogli, ed un solo ne germina nel primo anno, interì conservandosi gli altri due, un altro ne germina nel secondo anno, e l'ultimo rimane fino all'anno terzo per germinare. Laonde non è da stimarsi cosa singolare, che o i semi, o le radici del Loglio possano mantenersi interi, ed intatti, fin che le arrivi dopo uno, o due anni una invernata piovosa.

245. Nè qui ometter voglio, che non è il Loglio solo, ma vi sono altre specie di piante, le quali per ordinario non nascono, che in certe determinate lor favorevoli circostanze: così stimasi comunemente dell'Orobanche, detta altramente Pisciacane, o Coda di Leone, e da noi qui chiamata Lupa, la qual suol nascere vicina, ed aggrappata alle radici delle fave, e di altri legumi, i quali strangola, secondo la frase de' Rustici, o più tosto ne consuma la pianta, sottraendo per se tutto l'alimento: di questa dicono i Contadini, che non sarebbe quivi comparsa, se nel terreno non si fossero le fave seminate. Stante ciò non possiam noi dire, che tal erba maligna nasca dal solo terreno senza seme previo, come credono gl'imperiti; ma è uopo dire, che o nel precedente anno, o più anni addietro stata sia quivi, o nelle vicinanze quell'erba, e v'abbia lasciato il cattivo seme, senza che i Villani l'abbian saputa riconoscere, oppure potendola riconoscere, senzachè v'abbiano fatta attenzione, ovvero bisogna dire (e questa pare a me la più vera opinione) che i semi suoi, i quali son realmente piccolissimi, e qual po-
vere

verè numerosissimi, e leggerissimi, come ho io veduto; e lo nota il Turnefort, vengano altronde da altri luoghi, ov' ella nasce, sparfa dal vento in ogni terreno, e però nascono frequentemente in quello, ove seminiamo i legumi. E perchè l'Orobanche ama il grasso, che si suol adoperar pe' legumi, e gode della medesima lor coltura, perciò quivi ella germina, e senza l'occasione delle fave non sarebbe quivi forse germinata. Dico forse, perchè nasce anch' ella in altri terreni, sola senza i legumi, ove la qualità della terra sia opportuna, e le circostanze alla sua indole sien confacevoli.

246. Che che ne sia però di queste tali piante, delle quali non son io bene informato; tornando al loglio, del quale ancora avrei voluto, e non ho potuto aver migliori notizie, affermo un'altra volta, che giudico falsa la trasmutazione del frumento in loglio; (e così intendo di altre simili trasmutazioni) ma dico falsa solamente quella, della quale ho sin' ora parlato, cioè che seminando frumento ne nasca loglio. Oltre però di questa, ne dicono un'altra dell' istesso loglio i Contadini, e me l'hanno moltissimi Uomini di campagna più volte indubitamente confermata, cioè altri come sentita dire da persone degne di fede, che l'hàn veduta senza equivoco, ed altri come da loro medesimi osservata. Un di loro attestato mi ha, di essergli stata data in mano da' mietitori una spiga, la metà della quale era di loglio, e l'altra metà di buon frumento. Un altro asserisce, d'aver veduta una intera spiga piena di loglio, vegnente dal gambo, e dal cesto del frumento, la di cui pianta si differenzia molto notabilmente dal loglio, e non v'è pericolo, che i pratici la confondano. Un terzo savio, perito, e capacissimo Agricoltore, dava per verissimo il fenomeno, di cui parliamo, non solo per le altrui attestazioni, delle quali molte ne avea sentite, ma per quello, che veduto avea esso medesimo; e mi raccontò,

che una volta i suoi Mietitori trovarono; e diedero a vedere a lui nell'atto della mietitura un gambo di biada con due spighe in cima, sorgenti da uno stesso gambo; alla qual rarità, non per affatto nuova, s'accoppiava l'altra più portentosa, che una delle due spighe era di vero loglio, e l'altra di perfettissimo frumento.

247. I tralignamenti di questa sorta si rendono a me più credibili, ed io li tengo per veri; perchè son presso di me ben contestati, e di que' primi più ragionevoli: ne' primi pretendesi, che 'l germe già concepito nella semenza, dopo già formata della sua specie l'organizzazione, non solo incoata, ma sino a certo segno eziandio tanto inoltrata, ch'ella è già una piccola pianta, intera, e perfetta, almanco ne' primi suoi organi fabbricieri; ma di poi per un lieve accidente, (il qual non si sa onde abbia tanta possanza) disfatto, o almeno grandemente alterato tutto quel mirabile ordigno già fabbricato, sene rifaccia un altro tutto diverso, e quel germe, o più tosto quella piantarella, che già era tutta di biada bell', e compiuta, si trasformi in loglio di struttura interna, ed esterna, e di specie notabilmente differente. Non però avvien così ne' secondi tralignamenti, ne' quali non si disfà il già fatto, ed in tutt' altro si rifà per un mero accidente, l'umido, che soprabbondi; ma si lavora da' fondamenti la nuova fabbrica in virtù di una causa affatto proporzionata, ed abile a fabbricarla. Supposta dunque la verità del fenomeno tanto ben contestata, che nelle spighe della biada siavi trovato il loglio, non può assegnarsene altra cagion più propria, e proporzionata, che la virtù, e l'azion delle polveri seminali del loglio, quand' era in fiore, passate, ed arrivate alla spiga della biada nel tempo appunto della sua fioritura; ed in virtù di queste polveri potè la spi-

ga impregnarsi di feto straniero , ed i grani del loglio in luogo del frumento poteronsi concepire .

248. Qui però è da sciorsi una difficoltà per questo, e per altri simili casi. Le spighe del grano son da se ben doviziose delle proprie polveri , e quando ad alcuna ne manchino per accidente , che si può dare , ne può esser ella ben provveduta da mille spighe vicine della sua spezie ; e però dovrebbe più tosto venir sempre impregnata delle polveri sue , o prestate dalla sua razza , come a se più connaturali , che delle polveri del loglio meno a se confacevoli . Ma l'obiezione non ha forza per un caso si raro a succedere , come questo : benchè sia verissimo , che le polveri della propria spezie prevalghino sulle altre di spezie impropria , ed in pari concorrenza quelle impregnino , e queste nò ; non pertanto può darfi l' accidente per qualche rara volta , che ad alcuna spiga , o ad alcuni suoi grani manchino affatto le polveri della sua spezie , e che a tempo congruo vi arrivi qualche briciola di polvere straniera , abile a secondaria . Perocchè spesso anche succede , che una intera spiga riesca vota , o che vi manchino molti grani ; ciò che può succedere alcuna volta non per malattia della spiga , ma per la sola mancanza delle polveri femminali . Avvenga per esempio , che in tempo della fioritura cada una pioggia dirotta , e diluisca , e seco meni le polveri femminali ; allora sarà il caso , di cui si è parlato nel Trattato I. , che per indigenza delle polveri fecondanti molti grani non si concepiscano nella spiga , o ella eziandio tutta vi si sconci : ora in questo caso , se ne' di seguenti truovisi a fiorir qualche spiga di loglio vicina , ed una porzioncella delle sue polveri venga portata dagl' Insetti sulla spiga della biada , che stà in procinto di concepire ; potrà ella concepire un mostro di terza spezie , il qual riputato sa

rà come vero loglio, se più di loglio avrà, che di frumento l'apparenza -

249. Ammesso per buono questo primo esempio, che mostra potersi dare i mostri totali di due spezie di piante disparate, quali sono il loglio, e 'l frumento; può anche ammettersi per vero, e buono quell'altro, che vien riferito nell'Istoria della Real Accad. Parig. ann. 1719. Il Sig. Marchant Botanico versatissimo trovò nel suo giardino una nuova pianta da se non mai conosciuta, che rapportava egli al genere delle Mercorelle, e per la similitudine, che ne avea, chiamolla *Mercurialis foliis capillaceis*, perchè ornata di sottili fogliuzze, come capelli. L'anno veggente nel medesimo luogo ne vidde nascer sei altre, delle quali eran quattro simili alla precedente, e due assai differenti, di modo che poteano costituire un'altra nuova spezie di Mercorella, e chiamolla *Mercurialis foliis in varias, & inaequales lacinias quasi dilaceratis*. Le dette piante moltiplicaronsi anche più sino ad occupare in quattro anni sette in otto piedi di terreno: tutte fiorivano, ma con sua gran maraviglia cercando in esse, e ne' lor fiori la semenza, non fu mai possibile, che ve l'abbia potuto ritrovare. Or se queste piante erano realmente nuove al mondo, non v'ha dubbio, che doveano esser mostri totali di una terza spezie, venuta dal commischiamiento accidentale della Mercorella con qualche altra pianta notabilmente diversa, dalla qual doveano le novelle piante la notabile diversità della Mercorella ereditare. Ma che sieno state veramente nuove, me 'l persuade l'autorità del Sig. Marchant, e le congruenze, che lui indussero a giudicarle mostri di nuove forti. Era il Marchant un perito Botanico dell'Accademia Parigina, e sapea ben le spezie delle piante o da se, o da altri sino al suo tempo conosciute; nè già trattavasi di qualche pianta esotica, nata, ed osservata da lui in qualche paese indiano, la qual

potesse per avventura non essere stata conosciuta da verun Botanico; ma trattavasi di una pianta nata intorno a Parigi, ove sono stati sempre de' Botanici versatissimi, i quali avrebbon sicuramente osservata, e descritta questa tal specie di Mercorella; e però il valent' Uomo attesta alla presenza di tanti Savj, e Botanici dell'Accademia, ch' eran quelle piante per affatto nuove, e non mai descritte per l'addietro da verun Botanico. Quindi giudica egli con ragione, che come ne' Ranuncoli, negli Anemoni &c. si fanno sempre mille variazioni di colori, e di forme nelle novelle piante nate dal seme per qualche mistione, che facciasi frà le loro diverse specie, cosa, la qual egli forse a suo tempo non ancor sapeva, ed ora già sappiamo, che si fa colle polveri femminili de' fiori; così, soggiugn'egli, nelle Mercorelle, ed in più altri generi di piante è credibile, che facciansi de' mescolugli, onde poi ne sorgan di nuovo le terze specie differenti non mai prima da' Botanici conosciute.

250. Quindi forma un suo sistema, che ha qualche cosa del verisimile. Vi è luogo, dic' egli, da sospettare, che l'Onnipotente abbia creato da principio tutti i primi individui delle piante per modelli dei loro generi, e non già che formate abbia tutte le particolari specie di tali generi, postochè dalla mistione de' generi creati nascer poteano le particolari specie. Da' capi di generi poscia col tempo se ne son fatte di mano in mano molte nuove specie diverse, le quali sino al dì d'oggi son tante moltiplicate, che in qualche genere sono arrivate sino a 200. Gli antichi Botanici non han fatta menzione, che di circa 400. Capi di generi, a' quali agglungon poco numero di specie; e noi ora ne abbiamo generi più di 800. con 13 o 14 mila specie differenti.

251. Per verità, che'l numero delle piante odierne così esorbitante sopra le annoverate dagli Antichi, è an-

è anch' esso un buon argomento , e se ne servono i moderni Botanici , a provar l' introduzione d' altre nuove piante di terza specie , la qual si è andata facendo di mano in mano col decorso de' secoli : ed ancorchè dal catalogo delle moderne sene levino alcune Indiane , che furon solamente note dopo la scoperta dell' Indie , e se ne levino molte altre , che la negligenza degli antecessori potè aver lasciate a noi , per iscoprirle ; ciò non ostante troppo enorme vien comunemente riputato il divario della metà più de' generi , ed a migliaja , e migliaja più il divario delle specie dentro i generi contenute ; maggiormente che molti de' generi , e moltissime delle specie moderne non nominate dagli Antichi , non son già mica piante rare a vederfi , ma oggidì si trovano sparse in ogni campo , son ovvie in ogni paese , ci stan di continuo sotto agli occhi , e si calpestan co' piedi . Ma se gli Antichi ci diedero ancor notizia di molte piante rare , esotiche , ed Indiane , e ne andarono spiando da per tutto ne' più lontani paesi ; possiam noi creder , che abbian sì negligenzemente trasandate , e lasciate in obliuione tante , e poi tante sorti di piante , che le stavan pronte sù gli occhi ? non è mai ciò credibile ; e però è da dirsi più tosto , che le antiche col mutuo lor mischiamento si son diramate in terze specie , le quali sono andate novellamente sorgendo dopo il novero fatto da que' primi Botanici , ai quali perciò dovettero esser queste del tutto ignote .

252. Al fatto argomento se ne può aggiugnere un altro , che pur comprova la notabile real mutazione , che si è andata facendo ne' generi delle piante . Agli Antichi non furon note moltissime delle piante odierne , ed all'incontro non son note a noi alcune delle piante descritteci dagli Antichi . Quantunque chiarì sieno i distintivi , che ce ne diedero nelle lor d
scri-

descrizioni; pure i nostri Botanici non han saputo mai riconoscerle ai dati contrassegni; e quindi son nate fra i Botanici tante liti, di cui son pieni i lor libri, per decider qual sia delle piante odierne questa e quell'altra descrittaci da Aristotele, da Teofrasto, da Plinio, da Virgilio, da Palladio, Columella, Apulejo, Dioscoride, Ateneo, Avvicenna &c. delle quali controversie intorno a' nostri fiori di delizia molte sene potran leggere presso il Sig. Clarici. Ma non par, che possan risolversi in altra maniera più acconcia tante lor quistioni, se non se dicendo, che alcune piante, di propria natura più facili a far de' cambiamenti, si son tanto mutate pian pianino coll' andar del tempo, che travisate già del tutto, o quasi totalmente, ora più non si riconoscon per quelle, ch'erano nella prisca età, quando ci furon descritte. Ma qual origine più costante può assegnarsi a questi cambiamenti delle antiche piante, ed a quella tanta molteplicità di spezie delle moderne, fuorchè le mistioni, che si son andate facendo di una spezie coll'altra per mezzo delle polveri seminali? Quindi tornando un'altra volta alle Mercorelle del Marchant può conchiudersi, ch'esse sieno state realmente spezie nuove, e mostri totali, come pretendiam di provare, per la molta diversità, che aveano, anche dalla Mercorella, e da tutte le piante note, come appare dalla lor figura espressa in rame. Aggiungasi, che mostri totali le dichiara di più quell'altra notevole particolarità, di non aver potuto in esse nessuna femenza scoprire; ciò che vieppiù accredita la lor bastardigia; giusto come negli animali i muli, ed i mostri di terza spezie per ordinario non generano.

353. Un altro mostro di tal sorta colla medesima circostanza della sterilità, ci vien riferito nello spettacolo della Natura, industriosamente procurato da un Autore Inglese, Accademico di Londra, il quale per

per aver piante di fiori di terza specie, usò industria simile alla nostra, ed afferma, di essergli sortito d'ottenerele, ma che gli erano riuscite infructuose senza produrre veruna semenza. Ecco le parole del Sig. Pluche, *Tom. 3. Dial. 2. 3*. Ma quel, ch'è ancor più mirabile, ci raccontò; d'aver fatta la stessa pruova sopra due fiori totalmente diversi, e d'aver ravvivato ne' fiori indi nati il composto di tutt'è due, sicchè non avea mai veduti i compagni; ma soggiunse, che da questi nuovi fiori non avea potuto raccogliere alcun seme, e che in capo all'anno gli sen'era spenta la razza. Questo qui par, che sia un esempio decisivo de' veri, e totali tralignamenti, e probabilissimamente sarà tale, e sarà stato ben esaminato dalla Real Società di Londra, che lo rapporta nel *Tom. I.* e la sterilità del nato mostro lo appalesa totale; ma io per meglio assicurarmene, avrei voluto leggerlo in fonte, ciò che non posso, per non aver quell'opera, e bramerei almanco sapere, quali sieno state le due specie diverse delle piante genitrici, per accertarmi del tutto, se sieno state di quella maggior differenza fra di loro, che basti ad avverare il totale tralignamento.

254. Resta di più a sciorre un altro dubbio circa la sterilità di coteste piante: imperocchè se non producono semenza, come mai poteron moltiplicarsi tanto le predette Mercorelle, che in quattro anni si stesero ad occupar da otto piedi di terreno, sempre nuove rinascendo: nè sembra verisimile il pensar, che sien si propagate colla nuova germinazione delle radici; perchè la Mercorella non è delle piante perenni, ma è pianta annuale, cioè la sua radice non sopravvive, e con tutto il cespo dopo sei mesi sen muore nell'Inverno. Quindi ragionevolmente giudica il Sig. Marchant, che le spurie Mercorelle producesser di fatto qualche semenzuola, però così piccola, e così occulta, ch'ei non

non l'abbia potuta ravvivare. Aggiungasi di più, che altrimenti se tutte le spurie non generasser prole, o colle sementi, o almeno colla propagazion de' bulbi, e delle radici, subito passato un anno si perderebbono, come quelle dell'Inglese, e caderebbon gli argomenti ora fatti, cioè non avremmo noi tante altre spezie oggidì incognite agli Antichi, le quali, è sorda opinione di più gravi Botanici, che sien sortite di nuovo da due spezie disparate. Egli è dunque da dirsi, che come avviene negli animali, così avvenga nelle piante, che i mostri di terza spezie per ordinario fogliano esser infecundi, quando sieno un misto di due spezie molto dispari, ed eterogenee; sebbene qualche rara volta i muli, e simili bastardi, si fa di certo, che abbiano generato: ma se le due spezie non sieno troppo fra se dissimili, possano i loro spurj più frequentemente, o anche sempre generare, come le Licishe nate da Lupo, e Cane; e così dicasi delle piante, le quali siegno in tutto il resto, come si è osservato, e così parimente in questo caso l'analogia degli animali.

C A P O XIX.

Confermasi la realtà de' mostri di terza spezie, particolarmente ne' generi degli

Agrumi.

255. **A** Provar più sodamente l'esistenza de' mostri di terza spezie ne' Vegetabili vien destinato il presente Capo quasi tutto sopra gli Agrumi, ne' quali è così patente, che diensi più spezie, miste di due, o anche di più generi, che forse non v'è alcuno fra i Botanici, che lo metta in controversia.

T. II.

B b

e nol

e nol consenta. Nella produzione di tai mostri concorrono in queste sorti d' alberi delle circostanze assai favorevoli ; cioè fioriscono essi circa il tempo medesimo nella Primavera , o anche di nuovo insieme nell'Autunno ; ed è molto poca , nè troppo almeno disparata la diversità de' lor generi più principali : son fra se , come congeneri di natura , e similissimi di complessione , laonde par certo , che possano , e debbano più agevolmente , che altri generi , ammetter gli uni scambivolmente la fecondazione degli altri col passaggio delle polveri seminali da' fiori d' una specie a' fiori dell' altra . Di fatto poi trovansi fra gli Agrumi non poche razze mostruose , e moltissime altre , così simili alle compagne , e partecipanti tanto delle altrui forme , e qualità , che passano propriamente altrettanti mesugli di terza specie , originati da due , o da più differenti specie fra lor confuse . Il Cedro , il Limone , e l' Arancio son è vero tre generi fra se notabilmente diversi ; ma insieme anno assai del simile negli accidenti estrinseci della pianta , nel frutto , nel fiore , nel seme , nelle foglie , nelle spine , ed in tutto il legno , siccome nelle intrinseche qualità dell' odore , sapore , virtù medicinali , e tutti presso a poco esigono la coltura medesima , patiscono delle medesime malattie &c ; quindi non è gran fatto , se di piante così omogenee di costituzione si presumano li scambievoli maritaggi , quando per altro ne confermano la presunzione le molte specie congeneri , le quali mostrano nelle proprie fattezze , che sieno specie intermedie fra quelli generi ; e mentre partecipano tanto evidentemente della lor forma , figura , ed indole , ci fan prudentemente giudicare , che sieno venuti così misti della commistione de' medesimi genitori .

256. Quando Iddio da principio non avesse creato altro , che questi tre soli generi , dal mescolamento de' medesimi tre ne sariano potute sortire tre altre nuove

spezie ; cioè una mista di Cedro , e Limone , una di Cedro , ed Arancio , una di Arancio , e Limone : così di nuovo da queste sei combinate insieme , ne poteron sortire altre quindici , e così un'altra volta dalle quindici , e dalle susseguenti , continuandone la combinazione , poteron derivar tutte quelle numerose varietà di razze , che oggi ne abbiamo , e più altre , che sempre nuove ne potran sortire . Che se pochi sembrano tre soli generi originarj , potremo aggiugnene altri due la Lumia , e la Lima , le quali son collocate da più Botanici in generi diversi dai tre sopradetti .

257. Ella è tale la partecipazion de' suddetti generi , la qual mostrano avere le spezie intermedie , e tanta n'è di queste a quelli la somiglianza , che non fanno i Botanici determinare , sotto qual genere arrolarle , se sotto a quel de' Cedri , o de' Limoni , o degli Aranci , tanto si confondon esse coll' uno , e coll' altro genere , di cui partecipan le fattezze ; e ne partecipano tanto notoriamente , che tutti , o quasi tutti convengono i Botanici in asserir , che dette spezie sien miste di due generi , e sol v'è fra essi qualche disparere circa la maniera , come siasi fatta la mescolanza , ma pur si ha per cosa sòda , che son piante di terza spezie . Certe loro razze lo mostrano così evidentemente , che par non sene possa prudentemente dubitare , delle quali ne rapportano il prolisso novero il P. Ferrari nell' Esperidi , ove tratta diffusamente degli Agrumi , ed il Clarici Par: 4, L. 1, C. 15, ed io tralascio di riferirlo , come cosa molto certa , e notoria .

258. A tanta varietà di mesceglj se aggiungansi que' varj mostri , che tanto ammiransi negli Agrumi , verrà maggiormente confermata la composizione di due , o anche di più generi in una stessa pianta , ed in un medesimo frutto . Per averne qualche saggio ne cito due , o tre : Mostri sono i fiori doppj , e negli Agrumi ne sono molti Ce-

dri, Limoni, ed Aranci di fior doppio; e questi so-
 glion produrre le frutta similmente doppie: v. g. il Ce-
 dro dal fior, e dal frutto doppio contiene dentro di se
 un secondo cedro, e tal volta un terzo; e la sua dop-
 piezza può presumersi originata dalla missione di Cedro,
 e di Limone, essendo una cosa di mezzo fra l' uno, e
 l' altro, e tanto partecipa d' entrambi, che l' Ferrari lo
 riduce alla spezie de' Limoni, ed il Volcamero, e Cla-
 rici alla spezie de' Cedri. Ma chi potrà dubitare, che sia un composto di
 Arancio, e Cedro un raro mostro, che qui abbiamo?
 Il P. Boeccone nella descrizione, che ha fatta delle pian-
 te rare di diversi Paesi, quando tratta di quelle della
 Sicilia, riferisce di un *Arancia letifero*, che dentro di se
 stesso un Cedro produce, che viene parimente rappor-
 tato dall' Ermanno nel Catalogo dell' Orto Academico di
 Leiden, pianta veramente rara, che col nome di *Li-
 mon Cedro* si coltiva in questo Clima felice, particolar-
 mente ne' Giardini di Messina, e di Reggio in Calabria.
 La corteccia di questo frutto all' aspetto, odore, e sa-
 pore un Arancio rappresenta, ed è dell' ordinaria gros-
 sezza, levata questa si vede una tenue pelle, che rac-
 chiude una bianca midolla di sostanza polposa affatto di
 Cedro, soave, e gustosa, racchiusa dalla Natura sot-
 to la scorza d' Arancio, pianta dice il Clarici da desi-
 derarsi in qualunque giardino. Mostrosissimo è sopra tutti l' Arancio di Bizzar-
 ria, il qual mostra evidentemente la composizione di
 più generi, eziandio di quattro, come può costar dal-
 la seguente notomia. Si fattavi sopra dal Sig. Clarici.
 Il primo frutto, che abbiamo tagliato, era rotondo, e
 simile all' Arancio, ma esternamente mischiato di colore
 più di Limone, che d' Arancio. La parte interna di for-
 ma della corteccia di Limone era più bianchiccia dell' al-
 tra, e sopra la parte di color d' Arancio, la qual
 era

era gialliccia, come pure la è negli Aranci. Questa diversità di colori, e di corteccia non era posta con alcun ordine, cosicchè la metà fosse Arancio, e l'altra metà Limone, ma il tutto confuso, e framischiato, d'onde chiaramente appare non esser quella una mistione di frutto; mentre se tal' ella fosse, ne riuscirebbe una parte tutta Arancio, e l'altra tutta Limone.

261. Altro frutto medesimamente rotondo, abbiato tagliato, di cui una parte era Limone, e l'altra Arancio, interamente distinta dai soli colori; cioè sotto il Limone il giallo assai più pallido di quello, ch'era sotto della scorza d'Arancio.

262. Il terzo frutto tagliato era parte Cedro, e parte Arancio, cioè due parti di Arancio, e due di Cedro poste in croce. L'Arancio era contenuto fra le due parti di Cedro, e questo fra le parti dell'Arancio. Internamente la parte di Cedro avea per sotto una grossa corteccia. La parte d'Arancio era sottile, e quella di mezzo sugosa, e tutta d'Arancio. Dal che pure si vede non potersi dare la mescolanza de' frutti, mentre senz'ordine tanto internamente, quanto esternamente son poste cotali inegualità.

263. Il quarto era una parte di Cedro verrucoso, tantochè sembrava Lumia verrucosa, e l'altra parte d'Arancio, ma la maggior parte era Cedro. Dividevasi in quattro parti, poste inegualmente, e quasi in croce. La corteccia della parte del Cedro era erassissima, e quella dell'Arancio era tenue. La parte poi interna vedevasi di color diverso, l'una più gialliccia dell'altra, ma senz'ordine, cosicchè la parte posta sotto il Cedro era più bianca, e l'altra sotto l'Arancio più gialla.

264. Il quinto frutto dividevasi esternamente in tre parti; l'una delle quali era Limone ordinario, e l'altra

tra Limone corniculato, e queste divise per due parti d' Arancio; in mezzo però dell' una di queste v' era una particella di Limone. La corteccia era simile in tutta la circonferenza, e medesimamente simili erano i ricettacoli degli otricoli, detrattono uno posto sotto il Limone corniculato, il quale si vedeva più bianchiccio, dissimili bensì di grandezza, ma senz' ordine.

265. Il sesto era tutto Arancio, internamente simile a quello di Portogallo, con il colore, e forma degli otricoli dell' Arancio; il sapore pur d' Arancio, ma più austero, il che fors' era causato dal non essere il frutto assai ben maturo, e con poco di sugo.

266. L' ultimo era tutto Cedrato, dal quale variava solamente nella corteccia meno grossa, e nel sapore, che all' Arancio s' accostava, e nel seme di quello del Cedrato più rotondo.

267. Dopo la notomia de' frutti l' Autore ne descrive la pianta, e la coltura così. Suole crescere all' altezza di mediocre albero, come crescono le altre cognate piante, che stan collocate ne' vasi, ne' quali deve piantarsi. Produce rami spessi, ed ornati (fino che la pianta è nel suo vigore) chi di foglie d' Arancio, chi d' Arancio, miste con quelle del Cedrato, e chi sol di Cedrato, e queste hanno la loro inegualtà, essendovene di lunghe, di carinate, e di crespe. Due volte all' anno getta i suoi fiori, cioè da Primavera, e d' Autunno. Sono anche questi dissimili, essendovene alcuni, che nel dritto bianchi han poi nel rovescio di rosso colore tinte le foglie, e questi per lo più in Cedrato si ligano; altri di color pallido, ma più grandi, ed avvenenti, producono il frutto misto. Ven' han un pur molti, che al tutto candidi, sono produttori d' Aranci, ed altri, che privi di tuba, e per ciò sterili, cadono infruttuosi. Ma la mirabile struttura di questa pianta consiste nella diversità delle frutta. Alcune sono un Arancio,

cio in figura di Limone; altre s'osservano fra l'Limone, e l'Arancio d'una mista natura, delle quali alcune, che in mammelle finiscono, alle Lumie s'affomigliano altre sono Lumie, altre Aranci volgari con corteccia granellosa, e midolla di cedrato, vedendosene pure alcune esser Cedrati o lisci, o scabri nella corteccia; altre poi sono miste inegualmente di Cedrato, e d'Arancio: però il tutto senz'ordine, spuntando Cedrati, dove sono foglie d'Arancio, e vicendevolmente Aranci, dove sono foglie di Cedrati frammeschiandosi spesso foglie diverse, e diverse frutta, e ciò senz'altra regola. La parte pure interna, come abbiám veduto, ell'è varia con pochi pallidi, ed infecondi semi. Nel di più se le ha da fare la medesima coltura, che con gli Aranci si pratica. Propagasi per via d'innesto, sebbene questa operazione è assai incerta, mentre alle volte s'innesta quella gemma, che solo Aranci comprende. Onde meglio avverrà, valendosi delle Margotte, con sceglier quei rami, che vario frutto, varie foglie, e varj fiori producono.

268. Ella è per verità una specie d'Arancio, mentre le foglie per lo più sono d'Arancio, e quelle, che più lunghe al Cedrato s'accostano, anno ad ogni modo per la maggior parte, come que' dell'Arancio, piccole appendici circa il picciuolo. Quindi è, che mancando questa pianta di coltura, l'umore che per la sua abbondanza spiegava gemme differenti, restringendosi le fibre (il che sovente per l'età accade) spiega sol quelle gemme, ch'han le parti più proporzionate alle particelle del detto umore; e per ciò spiegansi più facilmente le gemme d'Arancio, che l'altre di differente struttura, perchè non così agevolmente ammetton queste il sugo d'Arancio, quando questo non sia soprabbondante, ed accompagnato da molto moto; onde dalla natura di questa pianta abbiám appreso, come si possa ridurre la Bizzarria a spiegare i suoi mirabili

pomi, quand' o per negligenza di coltura avesse degenerato, e ridotta si fosse a produr soli Aranci. Si troncano per ciò fare tutti li rami, immediatamente sotto l' ultime foglie, acciocchè l' umore ascendendo con empito, entri per tutte le gemme, e spieghi anche quelle, che mostruosi frutti abbracciavano.

259. Da tutto il riferito sin quà, possiamo indubitabilmente concludere col sentimento comune de' migliori Botanici, che negli Agrumi si verificano con tutto rigore le terze spezie; nè altro resterebbe, ad averne una piena evidenza, se nonchè qualche curioso sperimentatore ne facesse seria pruova nella maniera da noi proposta. Poichè portiamo opinione, anzi togliam per certo, che cotali meschiamenti di generi, o spezie non si son fatti, nè per via d' innesto (come pur sostiene il Barone di S. Giacomo Agricolt. par. 2. c. 3. con altri Moderni più sensati;) nè per verun' altra congiunzione artificiale, ma son venuti più tosto così dalle lor semenze; e le semenze così sono state concepute, perchè nel talamo del fiore si son celebrate nozze spurie di due, o più generi differenti. Il Sig. Clarici parlando della Bizzarria in qualche parte ci favorisce, mentr' egli sostiene con impegno, che sia tale la Bizzarria non per industria d' arte, o per occasione dell' innesto di Cedrato sopra quell' Arancio, da cui ella nacque la prima volta; ma sia così fatta originaria di sua natura. Pruova egli bene, che dall' innesto non riesce mai, che lo sviluppamento di quella gemma, che vi s' incalma, ed eccetto al più qualche mutazion di sapore, che pur di rado succede, per la qualità del fluido nutritore, che dalla pianta incalmata vien preparato, altra notabile alterazione mai non si osserva. Così medesimamente le congiunzioni delle gemme, delle verghelle, marze, e calmelle, de' semi &c. o non riescono a praticamente eseguirsi, o se riescono, non pro-

producono il frutto di due composto, ma ciascuna parte della diversa composizione produce il suo diverso. Di poi egli, che ammette gl' Inviluppi, e gli sviluppi delle gemme, sostiene che nella pianta della Bizzarria furono così fabbricate le gemme, ed ivi chiuse, ed inviluppate da Dio, quali ora si vanno sviluppando alla giornata, miste di più generi di Agrumi. Ma noi, che abbiamo efficacemente rigettato nel Tratt. I. il sistema degli Inviluppi, e Sviluppi, diciamo, che anche la Bizzarria, come tutte le altre spezie d'Agrumi, sia venuta originariamente da semenza spuria, nel fiore dalle polveri femminali adulterata.

270. Non può dubitarsi, che siavi nella Bizzarria una mescolanza di più generi; dacchè produc' ella quattro varietà di frutta, Aranci, Cedrati, Limoni, e Lumie: ma che 'l mescolamento non siasi fatto per lo innesto del Cedrato, (che sembra l' unica maniera, ch' altri potrebbe sospettare come più verisimile) oltre il già detto, può anche provarsi così. Dato, e non concesso, che coll' innesto siasi potute confonder le fibre, e gli organi dell' Arancio con quelli del Cedrato; in tal caso non avria potuto altro produrre, che soli Aranci, e Cedrati: come dunque produce altresì Lumie, e Limoni, i quali non erano entrati mai in quella confusione? *Nemo dat, quod non habet*: laonde uopo è, cercare altra origine, a cui convengano con proprietà tutt' e quattro quelle differenti produzioni: altra però non ne apparisce, che sia tanto propria, e connaturale, quanto questa da noi assegnata.

271. Ecco il sistema più ragionevole, che può formarsi della prima origine della Bizzarria. Potè darsi il caso, che un fior d' Arancio si fosse trovato in modo straordinario disposto, a concepire indifferentemente, e con egual prontezza, così della propria spezie, come

T. II.

Cc

del-

delle aliene; e che allo stesso for d' Arancio pervenute sieno per mezzo degl' Insetti, e sieno state aggiunte alle proprie polveri femminili, le polveri di quelle tre specie, cioè del Cedrato, del Limone, e della Lumia, e quindi ciascuna in particolare, e tutte insieme allo stesso tempo abbiano operato l' effetto suo proprio sull' istesso grano di semenza; cosicchè uno de' grani contenuti nel frutto potè concepire il suo germe misto, e composto de' germi delle quattro varie razze, che unitamente concorsero a generarlo, e così poi seminato, e nato cotesto grano, potè quindi aver sua origine con tutta proprietà, e naturalezza la Bizzarria.

272. Ma ella è da conciliarsi questa origine con quella, che ne apporta l' Istoria presso il Clarici, riferita da Pietro Nato Medico Fiorentino, il qual ne fu osservatore, e testimonio di presenza. *Phytologica observatione de Malo Limonia Citrata Aurantia Florentie, vulgò la Bizzarria, pag. 16, & 17. Cultor ingenuus Vireti illius, vocati, della Torre degli Agli, ubi primùm natalis exitit hujus arboris origo, clari fmo Hero suo omni asservatione affirmavit, se nulla malorum adoptione, nullo factionis artificio, nulloque adulterii ingenio, sed solo eventus, genioque natura eandem fuisse consecutum... Diutina malorum auctorum observatione, meoque intuitu didici, ex latere inveterata inoculationis &c. ipsam sponte sua prodisse.*

273. Abbiam dunque dall' Istoria, che circa l' anno 1644. la prima Bizzarria, onde poscia si son propagate tutte le altre, non nacque dall' innesto, ma a lato dell' innesto nacque dall' Arancio. Or dico io, che quello non era un mero Arancio, ma era realmente un vero Arancio di Bizzarria, così nata dal seme, e così concepita nel fiore prima, e poi nel frutto dell' Arancio, onde fu tratto quel seme. La maniera ordinaria, per moltiplicar gli Agrumi, ella è di seminare i granelli degli Aranci, e dopo tre, o quattro anni, che son cresciuti

sciuti ; prima che possan produrre il proprio frutto , vi si fa sopra l' innesto ; cosicchè il proprio lor frutto non vi si vede mai sopra , se non nel caso , che vi si lasci crescer per trascuragine qualche gemma del salvatico .

274. Or questo appunto dev' essere stato il caso , raro sì , ma naturalissimo della Bizzarria ; fu seminato il suo seme , come di Arancio , e prima che abbia potuto mostrar colle sue frutta , ch' era realmente una Bizzarria , vi fu fatto sopra l' incalmo del Cedrato : ma quando poi trascurò il giardiniere , e lasciò crescere , e fruttar la di lei propria gemma , potè allor mostrare colla varia , e capricciosa mistion delle frutta la rara , e mirabil concezion del suo germe , così fatto originariamente in virtù delle differenti polveri seminali , che vi concorsero a generarlo . Dio sa , quante altre maravigliose Bizzarrie , non che sol negli Agrumi , ma in ogni gener di frutta , avrem noi ora , se fosse stata in uso , e frequente una simile trascuratezza , o più tosto l' arte proposta , per far sortire in ogni genere delle nuove spezie utili , e capricciose .

C A P O XX.

Metodo pratico per far sortire dalle semenze nuovi mostri di fiori , o frutti .

275. **N** On può negarsi , che la Natura nel decorso di molti secoli molte nuove spezie avrà da se spontaneamente introdotte ; ma è credibile , che ancor non poche altre ne restino ad introdurre : conciosiacosachè per la loro introduzione incontra la Natura , senza l' ajuto dell' arte due gran difficoltà : l' una è comune per tutte le piante , poichè tutte sono state da lei provvedute dello proprie polveri seminali , e queste , come si è altrove riflesso , come

proprie, ed omogenee, soglion essere più attive delle polveri di straniera razza, e quelle prontamente vi allignano, di se impregnando il fiore; e le straniere non così facilmente vi trovano luogo, se non quando per avventura manchino al fiore le polveri proprie, e di tutta la sua razza; e però raro debb' essere il caso, che la Natura da se qualche nuovo mostro produca. Che se in pochi generi, come quello de' Cavoli, e Broccoli, e come quello degli Agrumi la stessa Natura produce più frequentemente delle novità, ciò succede, per chè fra quelli non è gran cosa disparata la diversità de' generi; e quindi l'attività delle aliene polveri può agevolmente uguagliar quella delle proprie, o eziandio ajutata dalle circostanze può superarla.

276. L'altra difficoltà, che la Natura incontra, è particolare per le piante arboree da frutto, ma siamo noi stessi, che le facciamo la difficoltà. Le nuove spezie si possono unicamente concepirsi nel fior del frutto, come si ha detto; e però sperar si possono unicamente dai soli semi, che stan nel frutto, e sperar debboni rarissime volte, per la prima difficoltà, che venghiamo di dire: ma noi, per aver alberi fruttiferi, non ci prevalghiamo quasi mai de' lor semi, eccettuato che rare volte: dunque sarà rarissimo il caso, che ne sortisca per opera della sola Natura qualche albero di nuova spezie mista di due. Negli Agrumi, ne' quali giustamente presumesi, che non troppo militi la prima difficoltà, e la seconda vien da noi soventemente tolta per l'uso, che abbiain frequente, di seminare i semi, ha quindi potuto benissimo la Natura le spezie de' mostri in gran numero moltiplicare; ma negli altri generi, pe' quali milita l'una, e l'altra difficoltà, è stato quasi un miracolo di Natura, se sortito mai ne sia alcuna rara spezie coll'ajuto di qualche fortuito accidente, che si è potuto dare nel corso di tanti secoli, quanti dalla creazione ne son trascorsi.

Con

277. Con tutto questo però son io di parere, che in tutti que' generi di frutti, ne' quali contengonsi molte varie spezie, non poche di esse sono state già nuovamente introdotte dalla congiunzion delle antiche primigenie: così tanta varietà di Uve, che abbiám oggi di, di Pere, di Mele, di Frumenti &c. potè non essere stata da principio, e potè andarsi facendo, e diramando pian piano in quel gran numero di spezie, che or godiamo. Ma se si sono realmente fatte dalla sola Natura con tutto l'ostacolo delle due esposte difficoltà; quand' ora ambedue le difficoltà sian da noi levate via coll'arte presente, che a levarle insegna; potremo arricchirci di molte altre nuove spezie, combinando fra se le antiche, e le nuove colle antiche, tornando sempre a ricombinare. Avvenir potrebbe d'ogni sorta di frutti a un bel circa quel medesimo, che avvenuto è d'ogni genere de' nostri fiori, i quali dopo l'uso introdotto di moltiplicarne le piante per via di semenza, si son essi propagati in tanto gran numero di varie razze, che quasi è venuto meno il vocabolario, per dare a ciascuna il proprio nome, come da principio costumavasi, quand' eran poche; ma ora per l'eccessiva moltitudine i più sfaccendati Fioristi son costretti a lasciarle innominate.

278. Il moltiplico di tante nuove spezie di frutti, che può sperarsi, è un lavoro molto più importante, e non è mica da compararsi, col guadagno di nuove spezie di fiori; e però se per la mera delizia d'un fiore si può usar l'industria dell'arte, per agevolâr la Natura contra l'esposte difficoltà; perchè non si dovrà fare il medesimo per lo sodo acquisto di nuove spezie di frutti? Sarà tolta via la prima difficoltà con niente altro, che con troncare al fior nascente di un Pero, di un Melo, di un grappoletto d'Uva &c. le stamiglie, prima che gli Apici dian fuori le polveri; e poi colti da un al-

tra spezie di Pero, di Melo &c. due, o tre fiori, sparger delle polveri di questi sulla tromba di quello, e ciò replicar l'indimani qualche altra volta per maggior sicurezza, tenendo in tanto coperto di velo quel fiore, acciocchè gl' insetti non vi portin polveri della sua spezie, per alcuni giorni, finchè 'l frutto paja di già conceputo: con ciò, senz' altro, sarà terminata l'operazione, la qual potrà farsi medesimamente con una decina di fiori dello stesso albero, per aver più certo fra molti fiori, delle semenze spurie il concepimento.

279. Verrà pur tolta la seconda difficoltà con un poco di flemma, e longanimità: si privavan già i Fioristi di tante vaghe spezie di fiori, quante oggidì se ne son guadagnate col lucroso traffico delle semenze; perchè ne sapevan l'arte, di farle copiosamente fruttare, nè avean la pazienza d'aspettar per uno, o più anni, finchè le novelle piante fiorissero: ma pure avendone poi sperimentata l'utilità si son iti animando a far uso delle semenze: siccome riferisce della sua Francia lo Spettacolo della Natura *Tom. 3, Dial. 2.* Si facevan dice, venire di Fiandra, e d'Olanda i fiori più rari. Si trovavano allora ne' Paesi Bassi moltissimi Dilettanti, che facevano ad ogni tratto delle nuove scoperte di fiori di qualunque generazione, per l'uso, che avevano di seminarli. La loro Nazione era l'unica a tenere un tal metodo; o sia, che la Francia non ne avesse veruna idea, o sia che lo spirito focoso della Nazione malagevolmente s'adattasse a far certe prove, il di cui esito richiedè comunemente lungo tempo, e pazienza. Si stufò alla per fine d'andar comprando con tanta spesa dagli stranieri quelle delizie, che si potevano avere con niente in casa propria: e i giardinieri di Parigi, e d'altre Provincie, ma spezialmente quei di Normandia, e di Caen, si diedero a seminare de' fiori, come i Fiamminghi, ed anche in maggior copia di coloro; sic-

sicchè ajutati dalla dolcezza de' loro climi superarono in ogni conto i fiorami, che ci venivano da' Paesi Bassi. Adesso non abbiám più bisogno di ricorrere agli stranieri; ma bensì gli stranieri han bisogno di ricorrere a noi. Or dico io, se con tutta la pena di dover aspettare i fiori eziandio per più anni, come avviene specialmente co' Tulipani, si è tanto bene avviata la pratica delle sementi; perchè non avrem noi un poco più di tolleranza pe' fruttì, che tanto più ne meritano, quanto n'è il pregio eccessivamente maggiore?

280. Ecco qui tutto quel, che dee farsi; dopo la prescritta operazione, segnato il fiore con qualche distintivo, per saperlo dipoi riconoscere, e maturato perfettamente il suo frutto, quando già cade da se, ovvero è per cadere, si conservi in luogo asciutto, e s'esso contiene semi, o nocciolo dentro di se, si serbino questi, e mangisi il frutto, il sapor del quale potrà per avventura essersi alquanto alterato dal suo consueto; ciò che io ancora non so per isperienza, ma ho qualche sospetto, che le polveri d'altra specie, benchè non alterino mai l'esterna forma del Ricettacolo, pure possano forse alterarne i sughi, e'l sapore. Poscia si semini nell' Ottobre dopo le prime piogge in buona terra di ortaglia: nato e cresciuto si trapianti l' alberetto, se sia duopo, nel secondo Inverno, che verrà; e quando attosia a farvi sopra l'innesto, s'innesterà con prender dalla sua medesima scorza le gemme, e le marze de' suoi stessi rami, ed altr'innesti collè gemme prese dallo stesso arboscello, potranno farsi sopra altri alberi della sua specie, ancorchè salvatici; e così a suo tempo potranno averfi bell' e buoni fruttì di nuova specie, mista di due. V'è necessità dell'innesto, perchè, come ogn' un sa, gli alberi provenienti dal seme, o dal nocciolo, ad onta del gentil ceppo, da cui trassero il generoso natal, s'insalvatichiscono, ed han bisogno dell'ajuto dell'

innesto, che gl' ingentilisca, per la ragione da noi assegnata,

281. Conosco io benissimo quel, che manca per ultima conferma di tutto questo discorso, e per ultimo più gagliardo stimolo, che animar possa i dilettanti Agricoltori, a metter mano all'esecuzione; manca una serie di sperienze, che avrei dovuto io stesso fare, e che dovrei qui addurre, come sono stato solito praticare per lo passato, ancorchè in materie meno di questa importanti; ne conosco la mancanza con molta mia pena, nè mi truovo in istato da ripararla: non ho mai avuto in casa un giardinetto, anzi neppure ho più luogo comodo, ove tener vasi di fiori; e poi a vederne l'esito pe' frutti, passeranno alcuni anni, quando già quest'Opera sarà stampata.

282. Nelle piante a fiore solamente ho tentato tre volte, per ottener de' mostri totali di due spezie dispartite; ma sempre mi è andato in fallo il tentativo: poichè ad aver questi, difficilissimi a riuscire, per la disparità delle due differenti nature, che debbono insieme accozzarsi, e convenire in una, fa uopo di andar tentando per molte spezie, finchè due se ne incontrino d'indole amica, e di sociabile complessione. Fu fatto da me il primo tentativo col Ranuncolo, e coll'Anemone, troncando ad ambidue le stamigne, e dando all'uno scambievolmente le polveri dell'altro; ma il Ranuncolo si sconcio per affatto, e l'Anemone, che concepì alcuni pochi grani, potè concepirli senza dubbio per influxo delle polveri de' vicini Anemoni sulla stessa pianta; giacchè ne germinaron pochi Anemoni scempi di bassa condizione, senza verun lineamento, proprio di Ranuncolo. Altre due volte procurai di far concepire seme illegittimo a' Garofani Ortensi colle polveri de' Garofani d'Inghilterra, e scambievolmente a questi colle polveri dell'Ortense; ma di entrambi ne vennero i semi così scar-

scarni, e mal graniti, che sembravan già un aborto prima di seminarli, ed in effetto seminati non germogliarono.

283. De' Ranuncoli, ed Anemoni non è da maravigliarsi, che non possano convenire in una terza specie; perchè son pur troppo disparati, e positivamente nemici di natura, tanto che avvertono i Fioristi, a non piantarli vicini, perchè l'uno nuoce all'altro per le contrarie lor qualità. Ma delle due specie di Garofani mi son molto maravigliato, che l'una specie non ammettesse l'altra, mentre pajon di natura, e di accidenti quasi del tutto simili, ed omogenei: simili sono in tutta quasi l'esterna apparenza della pianta, del fiore, e della semenza, e però i Botanici li aggregano sotto il medesimo genere, ed affatto simile n'è ancora la figura, e forma de' grani delle lor polveri; che ho voluto osservare anche col Microscopio; ma pure o sia, che le intrinseche lor complessioni mal convengan fra se; o sia più tosto, che i Garofani sogliono esser difficili a concepire i semi, ancorchè fecondati dalle lor polveri naturali, e però debbono esser più restii alle polveri aliene; o sia stato altro accidente contrario, che io non so: il verò è, che io resto con la pena, di non aver potuto con veruno sperimento, che fosse stato mio, comprovare indubitatamente l'opinione delle terze specie disparate; che pur sostengo per vera, come la provano le addotte ragioni, e sperienze.

284. Se nell'avvenire avessi io mai il comodo, di poter intraprendere tal sorta di sperimenti, ecco quel che farei: (e ne suggerisco l'idea, per chi ne avesse voglia d'intraprenderli, e si compiacesse di comunicarmene l'esito, per darlo al pubblico in qualche ristampa.) Prima d'ogn'altro anderei facendo de' maritaggi tra fiori, e fiori di specie le più consimili dentro lo stesso genere; come sarebbe tra una specie, e l'altra di Pe-

si fra di loro, di Meli fra di loro; e così di Granati, di Viti, di Zucche &c. e pe' fiori di delizia, tra una specie, e l'altra di Tulipani li meno differenti, tra Narciso, e Narciso, tra Rosa vermiglia, e bianca, ovvero gialla, e così di più altre forti le meno fra se lontane, e di queste certo è, che di tutte, o della maggior parte ottener se ne possono molte varie misture. A coteste aggiugnerei gli Agrumi, per confermar collo sperimento quelle tanto ammirabili, e varie lor composizioni, che si hanno per vere di comune consenso per l'evidente unione, che mostrano avere in se stessi di più frutti confusi in uno, e anche patentemente distinti. Lo sperimento servirebbe non solo per far guadagno di nuove razze; ma pure per confermar senza replica, che la causa di tanti lor mischiamenti non è stata mai altra, che la sola, sola mistione delle polveri sopra i lor fiori. Quindi passerei ad altre specie, che pajon aver fra se qualche maggior disparità, e alla perfine tenterei la sorte, per aver mostri più rari, e sorprendenti fin dalle specie totalmente disparate; e di questi riusciran sicuramente vani più tentativi, ma fra i molti sortir ne potrà qualcheduno con felice riuscimento.

285. Nè voglio lasciar di avvertire tre cose utili a questa pratica: I. che di tutte quelle specie, le quali ammettono scambievolmente l'innesto, v'è fondamento da presumere, che si confacciano le lor nature, e che però ammetter possano ne' lor fiori l'innesto scambievole delle polveri, e concepirne l'impregnatura: ma di quelle specie altresì, tra le quali non suole per ordinario l'innesto allignare, e che però mostrano contrarietà di natura, non è affatto da disperar, che possano per avventura i lor fiori alcuna rara volta concepire feto straniero; come tal volta dicevi riuscito qualche straniero innesto, qual sarà quello riferito da Palladio, e da noi addotto nel Tratt. 1. par. 2, n. 233. del Pi-
sta-

fiacchio, il qual non ha niente di parentela col Mandorlo, e pur dicessi, che inserito sopra il Mandorlo siavi allignato.

285. II. Avverto, che sebbene detto abbiamo, che bisogna impedire ogni azione di polver propria al fiore, il qual vuolsi, che concepisca dell' aliena, acciocchè la propria, come più confacevole, non prevenga, ed impedisca l' azione della straniera; non per tanto però è da provarsi ancora, di lasciare ad alcuni fiori qualche porzion delle proprie polveri, con la condizione, di applicar loro le straniere, prima che sieno aperti gli Apici proprj, affine di prevenir l' azione delle proprie polveri, le quali in tal caso non potran nuocere, se l' azion delle straniere sarà compiuta; e se tuttavia non lo farà, potrà forse la virtù delle proprie polveri servire alla virtù men proporzionata delle aliene, di aiuto, e disposizione per corroborarla, o per concorrere insieme, e attemperarne il concorso.

287. Dico questo non senza qualche motivo per una riflessione, che vo facendo. I fiori da semenza vengon misti, varj, e diversi dalle fattezze, e dal color proprio della madre, secondo la varietà delle polveri, che arrivano da' vicini fiori al fior materno, come si è già dimostrato; e ciò succede, ancorchè questo fiore sia dovizioso delle proprie sue polveri, le quali dovrebbero avere almeno almeno qualche poco di prevalenza sopra le altrui, ancorchè della medesima specie; ma pur si vede in effetto tal, e tanta variazione ne' figli dal colore, e forma della genitrice; che anzi par, che prevalga l' azion delle polveri altrui all' azion delle proprie. Or chi sa, che le polveri proprie non servano per avvalorar lo spirito fecondatore delle polveri d' aliena specie, o almeno per farle strada, e penetrar insieme nel talamo de' semi, ove questo da se solo arrivar non potrebbe per la sproporzion de' pori? Noi non sappiamo.

tutte le occulte maniere, come opera la Natura; e però quand' ella fosse restia a darci le terze spezie nella prima maniera, sarà forse costretta, a concederle colla seconda.

288. IH. Avverto a non abbandonar l'impresa, subito che un tentativo non sia riuscito la prima volta; ma bisogna tornare a rifarlo più volte sopra molti fiori, ed in diversi tempi, così ne' primaticci, come ne' tardivi, ed anche per diversi anni, scegliendo sempre i fiori, e gli alberi più vigorosi: perchè se la concezione di feti naturali, e legittimi ella è in alcune spezie rara, e difficile, e sol ne riesce in certe più favorevoli circostanze, come detto è de' Garofani; molto maggiormente ha da pensarsi de' feti spurj, e mostruosi, che assai più malagevole debba esser il lor concepimento, cioè in certe sole più favorevoli congiunture, in un tempo, e non in un altro, in questo, e non in quel luogo, e clima, in un fiore, e non in un altro, il qual può trovarsi più, o meno disposto; e così dicasi di parecchi altri accidenti, che possono incontrarsi ora propizj, ed ora disfavorevoli: e però ad incontrar fortunatamente i propizj, uopo è replicar per più fiate, ed in tutte le varie guise i tentativi. Non si offerisce mai pronto, e facile tutto quel, ch' è raro; e se facile fosse ella de' mostri, totali la produzione si nelle piante, come negli animali, l'avrebbe tutti a quest' ora fatti da se sola preventivamente la Natura nella varia combinazione di tanti accidenti, che si son potuti dare nel giro di tanti secoli, che son trascorsi.

289. Finalmente in difetto de' miei sperimenti confermo, e conchiudo questa materia, con appellare alla sempre costante Analogia tra la generazione degli animali, e delle piante: dacchè se l'una, e l'altra generazione si è veduta sin' ora in tutt'i due Trattati correr di pari passo, puntualmente conforme, non che nel me-

glio,

glio; e nel più sostanziale, ma pur anche ne' minimi suoi accidenti; la medesima Analogia ci guida, e porta quasi per mano a riconoscere, così nell' uno, come nell' altro genere i parti spurj, e mostruosi. Eccone qui esattissimo il parallelo: 1. Due animali della medesima specie, ma di razze notabilmente differenti, come un Cane d' acqua, ed una Levriera, generano i figli partecipienti di ambidue le differenti qualità: e così due fiori di piante della medesima specie, ma di razze notabilmente diverse, come Garofano scempio bianco, e Garofano doppio rosso maritato insieme coll' applicazione delle polveri femminili, producon figli, ne quali veggonfi chiaramente copiate le qualità diverse di entrambi. 2. Due animali di specie, o anche di gener diverso, ma di poca differenza, generano parti di terza specie di due composta, come i Lupi simili ai Cani, se si congiungano a questi, generano le Licifche: così gli Asini, ed i Cavalli di nature alquanto più dispari, generano i Muli: e così parimente due fiori di specie diversa, o ancor di genere, ma poco differente, fra lor maritati producono similmente le terze specie bastarde; come i Cavoli, e Broccoli ordinarij d' ogni specie fra se, e con il Cavolfiore, e Cavolcappuccio viceevolmente s' impregnano, e la prole ne vien bastarda: così pure negli Agrumi l' Arancio, il Limone, e l' Cedro, che son certamente di specie, e di gener poco fra se diversi, hanno date gran numero di specie medie, di due, o di più generi frammischiate. 3. Due animali di genere del tutto differenti generano tal volta do'rari mostri, come il Jumar, tenuto in uso da' Turchi, ne viene dall' unione del Toro con la Cavalla industriosamente procurata; e tali sono i mostri sempruovi, di cui ne abbonda l' Africa, andati già in proverbio: *Numquid aliquid novi fert Africa?*

290. Questi son per verità più difficili, ma pur tal

vol-

volta o l'accidente, o l'industria li fan sortire. Il Cane, e la Gatta non son nature delle più disparate, e far lor contrarie? ma pur mi è stato riferito da Persona dotta, ed autorevole, che un Cane, ed una Gatta di sua casa allevati insieme molto familiarmente dalla picciolezza, passavano fra di loro tutta la buona amicizia, mangiavano insieme senza rancore, si trastullavano insieme, ed insieme ancora giacevano; ma una delle volte, che dal troppo trastullare trovaronsi smoderatamente riscaldati, così alla cieca s' accoppiarono, onde la Gatta ne ingravidò, e venuta al parto, si sgravò di figli mostruosi, che dell' uno, e dell' altra partecipavano. Or al totale compimento della perfetta Analogia restano a verificarsi nelle piante simili razze di mostri venienti da due generi disparati: ma quando ogni altro mancasse, l' Analogia medesima ne fa pruova, e come in tutte le materie fisiche, così in questa la sola Analogia valer può, e dee per ottimo argomento. Mentre ci guida ella, e porta fedelmente così vicini all' ultimo termine, segno è chiaro, che al termine s'iam pervenuti; e se qui vicino ci lascia, e par che ci abbandoni, non è ciò, perchè ne dismette la guida, ma perchè ci ha di già condotti sino all' estrema foglia, là ove altro non rimane a noi, per entrar sicuri nel sacrario della verità, che dare un sol passo di giusta, e prudente presunzione.

291. Del rimanente non mancano ancor le sperienze, che giustificano la ragionevole presunzione. Di tal sorta di mostri è il riferito Loglio, nato nelle spighe del frumento; giusta le attestazioni di più sinceri, ed oculari testimonj; e di tal sorta erano le Mercorelle del Signor Marchant, e tali erano verisimilmente le piante spurie dell' Inglese Sperimentatore, e quell' e queste pubblicamente esposte nelle due più celebri Accademie di Parigi, e di Londra: e però è da conchiudere as-

solutamente, che possan darfi, avvegnacchè di rado, come negli animali, così nelle piante, i mostri eziandio totali di due spezie, o generi notabilmente disparati.

CAPO XXI.

*Apologia intorno all' esposto secreto della
doppiezza de fiori.*

292. **G**l' à da gran tempo i Dilettanti de' fiori ansiosamente desideravano l' arte sempre cercata, e non mai forse trovata, o non mai resa pubblica, per far nascere i fiori doppi, e semidoppi, di bei colori, e nuove forme: & Chi ci palesi (così esprime il P. Ferrari i suoi, ed i comuni desiderj L. 4, c. 8) quest' arte occulta, da cui i fiori notabilmente accresciuti quanto al numero, e copia delle foglie, mutino la forma, e sembianze loro? Ma io temo, che ora già publicatane l' arte, e appagatone il desiderio, non avvenga quel medesimo, che suol succedere nelle nuove invenzioni, cioè che son elleno prima l' oggetto del comune desiderio, e nel primo ritrovamento la comune lode si meritano, o anche l' ammirazione: dura però l' aura favorevole, mentre tuttavia sene mantiene occulto il secreto, e 'l solo suo buon effetto, ed utilità dal geloso inventore sene appalesa; ma quando poscia ne ha egli con animo generoso propalato l' arcano, presto succede, che o lo piglia a carpir l' invidia, la gara, e l' emulazione, oppure l' uso medesimo a tutti già reso comune, rende vile, come già volgare, quell' arcano istesso, il di cui uso frequente ne dovrebbe accreditar maggiormente il merito, e l' utilità.

293. Non troppo io mi curerei della lode di aver prodotta in quest' Opera qualche cosa di nuovo, ma spiace-

creerebbemi pur troppo , di comparir furatore delle altrui fatiche , e delle altrui nuove invenzioni , come potrebbe per avventura spacciarmi lo zelo , che altri abbia per lo amor della verità , giusto nella intenzione , ma non sempre giustamente applicato . Può darsi 'l caso , che alcuna delle scoperte sia stata fatta preventivamente da altri , senza io saperlo ; e non è mica raro , che due o più Scopritori , senza che uno sappia dell' altro , convengano appunto nel medesimo scoprimento ; ma in questo caso ecco il pericolo , al quale sto io esposto , che mi si dica , d' avermi appropriato il ritrovato altrui ; come realmente da qualcheduno mi è stato detto , ora da scherzo coperto con aria di verisimilitudine , ed ora da serio , per essersi da taluno così falsamente appreso . Ma siccome io intendo , d' essere stato fedelissimo per lo corso di tutta quest' Opera , in tributare a ciascuno la giusta lode , che meritano le sue fatiche , citando scrupolosamente gli Autori , di cui erano le scoperte , o i suoi documenti ; così ora vorrei avere il merito d' esser creduto , che ove non ho citato verun Autore , il qual forse alcuna cosa prima di me abbia detta , oppure scoperta , non l' ho fatto che per condonabile ignoranza , per non averne avuta la notizia .

294. Le savie opposizioni fattemi dal Sig. Marchese di Sortino D. Ottavio Gaetani , perito Fiorista , e mio buon amico e padrone meritano qui d' essere riferite , per dar loro risposta , non sol perchè potrebbero ad altri le medesime sovvenire ma pur perchè contengono delle utili istruzioni . Ha egli opposto , che il segreto dei fiori da semenza contienfi bastantemente espresso nello Spettacolo della Natura , e da quello l' abbia io potuto imparare . Direbb' Egli bene , quando intendesse parlar dello Spettacolo reale della Natura , non già dello scritto del degnissimo Sig. Pluche , del quale schiettamente asserisco , che non sono stato lettore prima della mia

scop-

scoperta, ma sono stato bensì spettatore assiduo per anni venticinque del vaghissimo Spettacolo, che la Natura ci dà ne' fiori a contemplare; e lo sono stato non per sola mia inutil delizia, ma per gire osservando, e scrutinando attentamente de' fiori l'indole, le proprietà, e tutto il progresso della generazione de' semi: per questo si è da me potuta scoprir qualche secreta maniera, come occultamente opera i suoi mirabili lavori la Natura, per farla noi operar con industria, ed arte; quel, che pretendiam o di più bello ne' fiori doppi, e semidoppi, o di più utile ne' frutti, per averli graniti, ben condizionati, ed in abbondanza, ed eziandio di nuova spezie mostruosa.

295 Quando pur fosse vero, che nel detto libro tutta si contenesse la nostra scoperta, oppure tal sua parte principale, onde tutto il resto se ne potesse agevolmente inferire, allora sarebbe il caso di ricorrere alla prevenzione poc' anzi esposta, d'esserci due incontrati, a fare il medesimo scoprimento, senza che uno saputo lo avesse dall'altro. Così poteva decidersi la gran lite, che fu già tra il famoso Galileo, e 'l celebre Matematico P. Scheiner, per la scoperta delle macchie Solari, chi de' due ne' sia stato il primo scopritore: posto che ambidue furon de' primi a far uso del Cannocchiale, circa quel tempo inventato, potè ad ambidue venire il pensiero medesimo, d'osservare il Sole, e vedervi le macchie, senza che lo Scheiner abbia furata dal Galileo la notizia, come il Galileo poco fondatamente pretese.

258. Confesso, che in quell'ultimo anno della mia permanenza in Malta, trovavasi colà venuta quest'Opera, ed io ne sentiva dir molte lodi, ma non l'ebbi mai nelle mani, nè mi venne mai curiosità di leggerla; sì perchè fui vessato da lunga malattia di un'anno, e sì perchè allora non ancor capiva sufficientemente la

T. II.

E c

Frau-

Franzese favella, nè credo, che l'Italiana versione fosse stata stampata a quel tempo, o che fosse arrivata in Malta. Se alcuno avvisato mi avesse, che quel libro trattava per sé della coltura de' fiori, e accennava la virtù, che tengon le polveri loro, per far^{si} concepire i semi, avrei sicuramente avuta la curiosità di leggerlo, per trarne qualche nuovo lume, che per sorte vi si contenesse. Ma me ne dieder la prima notizia in Palermo alcuni amici, e l'istesso Sig. Marchese dopo che io già per parecchi anni mi trovava aver esercitata la mia scoperta, e dopo ch'esso medesimo l'avea messa in pratica, come l'era stata da me insegnata: altra prova di ciò che asserisco, non ho, se non la buona fede, e la sincerità, di cui pregiar deesi ogni uom' onesto.

296. Del rimanente riferirò qui tutto quel, che dice il Sig. Pluche sopra tal materia, acciocchè veggasi essere stato un equivoco quello del Sig. Marchese, per non aver forse letto l'Autore con la dovuta attenzione, o più tosto il suo è stato uno scherzo meramente giocoso, come ora confessa convinto della verità. E' cosa solita fra noi due, che uno stuzzica l'altro, come può, colla pretesa di farlo vogare un poco, quando soventemente venghiamo a disputa di bellezza, o pregio de' novelli fiori da seme, se uguagliano o no, e se anche superino le predilette sue razze antiche, con tutto che preziosissime. Or considerando attentamente le parole del Pluche, non vi si troverà un minimo detto, il quale insegna cosa, o dia alcun lume sufficiente intorno alla principal parte, in cui consiste il nostro secreto, la qual'è di far venire, da' semi i fiori doppi, e semidoppi, ch'è quell'arcano più importante, di cui sin' ora erano andati sempre in cerca i Fioristi, e Giardinieri: ma vi si troveranno solamente tre altri lumi, e tutti tre proposti come dubbj, ed incerti; cioè che le polveri de' fiori tengan virtù maschi-
le

le da far concepire i semi, il qual lume; ch'è il principale, aveva io avuto già dal P. Regnault, come sopra ho riferito; e che i fiori nati dal seme vengano impressionati di que' varj colori, di cui forse d'impregnano le polveri de' vicini fiori; e che per ciò colla mistione delle aliene polveri si possan per avventura ricavar le terze spezie bastarde; ma questi due lumi, che formano la parte men principale del nostro ritrovato, e che potremmo dire ancor nostri, per averli noi molto più ampliati, non hanno troppo del segreto: perchè posto il primo lume della virtù fecondante delle polveri, son facili a sovvenire a chicchessia, e non erano il segreto ricercato. Postochè sappiasi, che le polveri han virtù generativa, e fanno altronde dalla sperienza tutti i Fioristi, e Giardinieri, che le piante, ed i fiori, nati dal seme varian da se spontaneamente i colori, e le sembianze, secondo la varietà de' vicini fiori, facil cosa è, che quella varietà all'influsso delle vicine polveri attribuiscono, e la procurino industriosamente coll'applicazione delle polveri dell'uno all'altror fiore, e colla medesima tentino di ricavar le terze spezie bastarde; e questo, e niente più di tanto, è tutto quel, che riferisce il Signor Pluche, e che si può da lui ricavare; ma per la doppiezza de' fiori queste sole notizie non bastano, e ne abbisognano delle altre, alquanto più recondite, le quali non somministra lo Spettacolo della Natura, come ogn' un leggerà ne seguenti suoi detti: Tom. 3. Dial. 2.

297. *2. Cav.* Mi pare, che questa usanza di piantare i fiori dentro i vasi portatili ci presti un altro vantaggio.

Cont. Ditemelo di grazia.

Cav. Eccolo. Si potrebbe accozzarli insieme comunque si vuole, per far che spuntassero da' loro semi con colori diversi, partecipandoseli scambievolmente l'un

l'altro, e conservare ad un ora i più belli da un anno all'altro, col tenerli in disparte.

Cont. In che maniera credete voi, che un fiore possa comunicare, o non comunicare il colore all'altro, e sfargli accanto?

Cap. Jeri passò per quà un Inglese, che avendo sentito parlare de' vostri fiori, dimandò in grazia, di poterli vedere. Il Sig. Priore, ed io ci presimo spasso di fargli compagnia. Il forestiere discorrendo ora d'una cosa, ed ora d'un'altra, ci disse, ch'egli sapeva per esperienza, che le polveri nello scaricare dalle filacciche eran sovente trasportate alla lontana dal vento, e che, influendo nel piuolo d'un altro fiore della medesima spezie, ma di colore diverso, ne fecondavano le semenze, e cagionavano in que' fiori, che indi nascevano, un nuovo colorito.

Cont. Coteffa proposizione par, che possa essere autenticata dalla portentosa varietà de' colori, che si ravvisa ogni anno ne' fiori provenuti dalle semenze di quelle piante, che son contigue, o collocate dentro un medesimo Pane. [Il Pane de' fiori, e delle piante è quella zolla di terra, che lascia le loro barbe.]

Cap. Il nostro Inglese c' informò d'un'altra particolarità, la quale se riuscisse alla prova, potrebbe essere di gran vantaggio. Ci attestò di aver tagliate delle filacciche di varj fiori prima che avessero principiato a sbocciare, e d'aver messi que' fiori in disparte, per vedere, se producevano le semenze, e ci attestò, di non averne potuta raccorre men una. Soggiunse altresì, d'aver tagliate delle filacciche d'alcuni fiori, e di averli lasciati stare dentro il medesimo Pane; e ci assicurò d'aver trovato in ciascuno delle semenze, provenute probabilmente dalle polveri, o granelletti de' fiori contigui. Disse finalmente d'aver tagliate le filacciche di un altro fiore, appena principiato a sbocciare, e d'aver successivamente spolverizzato il di lui

lui pinoto di granellini spiccati dalle filacciche d' un altro fiore della medesima specie, sbocciato affatto; e d' aver trovato un cangiamento notabile ne' fiori provenuti dopoi dal suo seme. Ma quel ch' è ancor più mirabile, ci raccontò, d' aver fatta la stessa pruova sopra due fiori totalmente diversi, e d' aver ravvivato ne' fiori indi nati il composto di tutt' e due, sicchè non aveva mai veduti i compagni; ma soggiunse, che da questi nuovi fiori non aveva potuto racorre alcun seme, che in capo all' anno gli sen' era spenta la razza.

Cons. Se ciò fosse vero, si potrebbe dire, che i detti fiori partecipassero, quanto alla nascita, e quanto alla sterilità, della razza de' muli, i quali si possono annoverare in certo modo tra mostri, mentre provengono da due animali non solamente di diversa specie, ma ancora di differente natura. Del resto, per accertarsi di tutte le conseguenze, e vantaggi, che si possono ricavare dalla cognizione, e struttura de' fiori, convien ricorrere alle sperienze, nè contentarsi della prima, ma reiterarle più volte.

Car. Ho già disegnato, di far tutte queste pruove, e star ben coll' occhio alla penna.

Cons. Tagliate pur delle filacciche a più potere, e fate delle sperienze a basta lena, che non vi perdettero mai nulla. Non abbiate paura di gettar via nè 'l denaro, nè 'l tempo. Io per me &c.

298. Questo è, senza lasciarne un apice, tutto quel che si legge intorno al nostro punto nello Spettacolo della Natura. Dov' è qui la maniera tanto ricercata, di far sortire fiori doppi, e semidoppi dalle semenze? Non ven' ha nè motto, nè parola: nè per allusione, nè per illazione può in verun conto una tal maniera inferirsi; e per inferirla v' è di bisogno di tutto quel raziocinio, che noi abbiain già sopra riferito, ed erano specialmente necessarie le notizie del cattivo influire, che fanno
gli

gli scempi, e della prevalenza delle lor polveri sopra quelle de' doppi, e semidoppi, e che solamente delle polveri di questi, coll' esclusione d' ogni commercio di quelli, sperar si può da' semi la doppiezza. Siccome l' altra maniera di far concepire agli scempi i doppi, e semidoppi, col castrarli preventivamente, e fecondarli colle polveri de' doppi &c. ha bisogno delle medesime notizie, coll' aggiunta delle riflessioni ivi fatte, le quali benchè ora pajan facili, a venire in mente, pure a me non sovvennero, che dopo alcuni anni, quando cominciai a far sperienze su i Garofani, per la malagevolezza, che incontrava ne' lor doppi, e semidoppi a compierne le semenze.

299. Ma insorge il Sig. Marchese dicendo, che non era molto difficile, ad aver tali altre notizie, a far quelle riflessioni, ed a combinarle insieme: ovvero senza di quelle, sogliono i buoni Fioristi lasciar sempre a semenzire i migliori fiori, e ne levan via gli scempi, ed i cattivi; ed ecco, che senza saper altro ne ottengono i fiori doppi, e semidoppi.

300. Rispondendo prima a questa seconda parte, la qual lascia il Mondo nella primiera ignoranza, e lascia intatta la novità della scoperta: non si nega, che potevano a caso i Fioristi ottener buoni fiori da' semi, quando così fossero regolati, e noi stessi ne abbiam portati essempi cap. 12, n. 136, e cap. 13, n. 164. Altro però è operare alla cieca, senza saper ciò che si fa, ed altro è operar per regola colla guida della ragione, come d' ora innanzi operar può il Fiorista: quello è un accidente, che si trovino tutte di buona razza le piante, o è un lume, che può talvolta venire ad uno, e non all' altro: ma pur suol' essere cosa ordinaria, per chi non fa più di tanto, che prescelga, e colga, per seminare, i semi degli scempi più tosto di spiga grossa, e meglio granita, e non tutti quelli de' doppi, e semidoppi, di
pic-

piccola spiga, e di sievole granitura; e quindi resta ingannato un Mondo intiero dalla vana apparenza de' semi cattivi, e dalla vile comparfa de' semi buoni, come altrove si è riflettuto; nè questo inganno, come ogn' un vede, potea levarsi mai co' soli documenti del Pluche.

301. A quel, che dice poscia la prima parte della difficoltà, ch'era facile l'acquisto di quelle altre notizie, che mancano nello Spettacolo della Natura, ma pur erano necessarie alla nuova scoperta, m' introduco a rispondere colla celebre Istoriotta del Nodò Gordiano. I Popoli della Frigia, dovendo eleggere il nuovo Re, ne consultarono l' Oracolo, il quale disse loro, che nel ritornare il dì seguente al Tempio, il primo che incontrassero, il qual menasse alla campagna un pajo di buoi aggiogati all' aratro, costui coronassero per loro Re: ed avendo essi incontrato il primo un Bisfolco nominato Gordio con i predetti segnali, il qual di buon' ora se ne andava a lavorare il suo terreno, lo condussero al Tempio, e lo salutaron Re: quindi egli in segno di gratitudine consecrò, ed appese nel Tempio stesso di Giove l' aratro, e 'l giogo. L' uomo che ingegnoso era, avea fatto quivi un nodo alle corde del giogo, ma così artificioso, ed intrigato, che non se ne trovava il capo, e la maniera da poterlo distrigare; il qual nodo fu reso via più celebre al Mondo, per aver l' Oracolo stesso pronunziato, che chi sciorrebbelo, saria per esser Re di tutta l' Asia. Dopo alcuni secoli, ch' erasi tentato invano da ogni sorte di gente: destra, e sagace del famoso nodo lo scioglimento, colà pervenne colle sue armi Alessandro il Grande, e curioso anch' egli di veder quel nodo, per tentar di sciorlo, miratolo attentamente, e giratolo per ogni verso, s' avvide col suo vivace ingegno, che senza rompere il nodo, non era possibile di trovarne il primo capo, onde cominciò

minciar dovea lo scioglimento , e però con animo fegio , che mai non si lasciò vincere ne' casi più disperati , cavò fuori la spada , recise per mezzo il nodo , e quì dentro nascosti trovando i primi suoi capi , tutto felicemente lo sciolse ; e quindi colle invite sue armi l'Asia avendo a se soggettata , diede all' Oracolo l'ultimo compimento . Altra simile istorietta , che fa pure al proposito , va per le bocche di tutti , di colui , il quale scommetteva con molti , a chi avesse la destrezza di fare star sopra il tavolino un uovo , ritto sulla sua punta ; ma egli , dopochè tutti provaronsi per mille volte , a farlo stare , ma sempre con inutile tentativo , preso l' uovo in pugno , lo scaricò forte sul tavolino , e rottane la punta , fermo lo se sedere .

302. Applicchiam ora l' uno , e l' altro fatto al nostro intento . Tutt' i circostanti , che allora trovaronsi presenti , (e noi con essi ora , che lo sentiam raccontare) restaron prima attoniti , per l' inaspettato mezzo , che fu preso , li di troncato il nodo , e quì di schiacciare l' uovo ; ma poi si risero dell' ingegnoso ripiego , e lo spregiarono , parendo loro , che in quella stessa maniera avria potuto facilissimamente ogn' un d' essi sciogliere quel inestrigabile nodo , e far sedere quell' uovo , Appunto così avviene in quasi tutte le nuove invenzioni ; passano secoli , e nessuno vince la difficoltà , che s' incontra ; si tenta da molti , e nessuno fa star fermo l' uovo , cioè nessuno è abile a trovare , o ad applicare i giusti mezzi per lo intento , che si pretende , e mancherà talvolta per un niente , per una bagattella . Ma succeda , che uno fortunatamente scuopra quel poco che mancava , e ne pubblichi la scoperta ; oh allora diverrà facile a tutti lo scoprimento , e a ciascun sembrerà , che anch' esso poteva esserne scopritore .

303. Per darne un esempio di tanti , che se ne potrebbero addurre : sapessi da Aristotele , che l' aria è un

è un corpo grave, o almanco v'era quistione, e sospetto della sua gravità; e sapeasi che cavando l'aria col suechiar di un cannello, o col tirar su lo stantuffo d'uno schizzatojo, o d'una tromba s'elevava in alto l'acqua stagnante. Or tanto ci voleva a combinar insieme queste due notizie, che sole bastavano, per dir che il peso dell'aria, premendo sulla superficie dell'acqua, la costringesse a salire? Par ora cosa facilissima, da poter venire in mente ad uno Scolare di Fisica; ma pure fin quasi ai giorni nostri saliva l'acqua per non so quale orror del Vacuo, e dopo tanti secoli di Mondo venne ciò in mente al celebre Torricellio, famoso appunto per questo suo nuovo ritrovato.

304. Ancorchè dunque avess'io letto prima lo Spettacolo della Natura, ciò che non fu, ed ancorchè si conceda la pretesa facilità di dedurre le rimanenti notizie, che ancor mancavano; con tutto ciò il nodo della doppiezza de' fiori non era stato tutt'ora sciolto, nè quest'uovo contumace era potuto star fermo in sulla tavola, dopo che cento, e mille avean letto quell' famoso libro, e con essi se lo trovava già letto il Sig. Marchese: con tutta la decantata facilità il secreto, sopra modo desiderato, della doppiezza de' fiori se ne restava tuttavia occulto nelle sue antiche tenebre; segno evidente, che non n'era così facile la scoprirtura, qual si vuole ora, dopo che se n'è fatto palese il secreto. Fra tanti, che letto aveano il libro, e l' passo da noi riferito, v'era stato il P. d' Ardene famoso Fiorista, il qual lo cita più volte nel suo Trattato de' Ranuncoli; ma il P. d' Ardene letto dal Sig. Marchese, che l'ha prestato a me per leggerlo, non solamente non apprese, o non potè inferire dai detti del Pluche, il secreto della doppiezza de' fiori, ma neppure aver potè sicurezza del vero uso degli stami, e degli Apici, e della virtù delle lor polveri, per im-

F. II. F f pre-

pregnare i semi ; ecco le sue parole alla pag. 25: 2. Come il vero destino degli Stami, e delle Sommitadi non sia stato sin' ora molto esattamente avverato dagli Scrutatori de' secreti della Natura ; ciò non ostante, convien che sien essi, come altrettanti artigiani destinati a travagliare secondo la loro abilità, per la perfezion della semenza, a cui questo attrezzo maraviglioso è principalmente ordinato &c. &c. Come dunque potea riuscire sì facile a me ciò, che non potè sovvenire a tanti altri, eziandio impegnati alla ricerca di tal secreto ? Del resto non mi sta bene discuterne la difficoltà ; poichè io non cerco per me altra gloria, che questa sola, che le mie deboli fatiche riescan utili al Pubblico, come sin ora ho preteso.

C A P O XXII.

Risposta ad altre opposizioni contra la qualità de' fiori da semenza.

305. **P**oichè ogni cosa di questo Mondo, per quanto bell' e buona sia, non va mai esente di qualche imperfezione ; ancora i fiori, venuti novellamente dal seme, ammettono i suoi difetti fra le degne lor doti, che li rendono commendabili. Tre difetti vi ha notati il lodato Sig. Marchese . 1. Non rare volte mutansi di colore con qualche scapito . 2. Molte delle novelle piante son di poca durata, e spesso accade, che le buone razze acquistate si vanno a perdere . 3. I fiori totalmente doppi, che sono i più pregiati, vi nascono rari ; e la massima parte riescon semidoppi ; ma questi far sogliono una comparsa efimera per un pajo d' anni, e per ordinario poi scempiano .

306. A dar ragione del primo, la mutazion del colore

lore in alcuni generi è frequente, come ne' Ranuncoli, e Tulipani, ma in altri è rara, come negli Anemoni, e Garofani; e come tal volta è con discapito, così tal' ora è con guadagno. Ne' generi mutabili soglion cambiar colore que' fiori, che nella prima lor nascita dal seme portano un color aspro, e crudo, oppur qualche striscia, o mistione suboscuro d'altro colore, che non è il campo; e gli uni e gli altri col tempo rassfinano più il colore, e manifestano con chiarezza quegli altri colori suboscuro; ed o gli estendono in ampie striscie, o li diradano in punti, e spruzzi per tutto il campo; onde i fiori, che fecer la prima lor comparsa di un colore uniforme, riescon poi coll' andar degli anni variegati, o brinati di più tinte. Di cotesti variegati ne vengon molti, e di colori finissimi dalla semenza, specialmente ne' Ranuncoli, ma pur altri sene aggiungono ne' medesimi, che acquistano coll' età lo screzio delle varie tinte, tal volta con guadagno, e tal volta con discapito, quando i colori perdon di vivezza, e si dileguano col diradarli. Contasi a gran perdita quella del fiocco verde, che soventemente portano nel cuor del fiore i Ranuncoli novelli, e qualche fiata gli Anemoni; sarebbe desiderabile, che quello durasse costante, per l'estrema grazia, e gentilezza, che concilia al fiore; ma perchè quel verde non è altro, che un color crudo, ed indigesto, il qual non si è potuto raffinar, e trasmutare nel proprio color del fiore, per troppa quantità, e crudità dell'umor che succhia, e manda su la pianta novella; quindi avviene, che perduto ella poi dopo uno, o due anni il giovanil vigore, quel gratissimo verde sene sparisce, e l'fior ne viene uniformemente colorato.

307. Ne' Tulipani però la mutazione computasi a gran guadagno; nè posso io meglio descriverlo, che con

i sentimenti esposti nello Spettacolo della Nat. Tom. 3. f. Dial. 3.

☞ *Prior.* Adesso vi spiego il tutto. I Tulipani parte si moltiplicano per mezzo delle loro semenze, e parte per mezzo de' lor rampolli. Il seme produce una cipolletta, la qual si torna a piantare in capo a due anni, e non fiorisce, se non in termine di cinque, o sei. Il fiore, che indi proviene è rozzo, e spregevole. Non è altro, che un fioraccio cinerognolo, o pao-nazzo, e di qualche altro colore smorto, e malinconico, sostenuto da un gambo sproporzionato, e deforme. Ma questi colori si vanno col progresso del tempo modificando, e producono una varietà portentosa. Viene poi col tempo a perfezionarsi, butta fuori il suo amarizzo, si riveste d' un nuovo colore, ed allora se gli può dare con giusto titolo il nome di Tulipano. Quelli poi, che ci vengon di Fiandra (a cagione del loro vigoroso, ed alto pedale) chiamansi nella lor lingua Bastoncelli.

I Tulipani adunque germogliati dal seme, dopo essere stati per parecchi anni continui piantati, e trappiantati, principiano a fregiarsi di diversi colori, e come suol dirsi, a listarsi, ed allora si chiamano Tulipani d'acquisto, o più comunemente di fortuna: perocchè quello è un casuale retaggio, sopra cui non si faceva assegnamento veruno. Il numero degli anni, la magrezza del terreno, ed i reiterati trappiantamenti contribuiscono concordamente, ad alterare, o macchiare il lor nativo colore; dimodo che quelle liste, onde sono fregiati, debbono riguardarsi (non dirò come una malattia) ma almeno come una specie di gracilezza proveniente da un succhio più dilavato, e più tenue. L' effetto di questi nuovi colori è quasi simile a quello de' nostri capelli, i quali mentre andiamo invecchiando, diventano o grigi, o canuti. Vi sono taluni, in cui la capellatura così brizzolata non
dis-

disfigura la testa; anzi le dà alcune volte più grazia; e più vezzo. »

308. Pella seconda censura data dal Sig. Marchese alle novelle piante di semenza, è da confessar con schiettezza, che sene perdon molte, almeno in questo Clima caldo di Palermo; giacchè in altre Città del nostro Regno, dove prevale il freddo, vi si conservano meglio, e vi si aumentano. Ma pure ripiglia il Sig. Marchese, le radiche antiche de' Ranuncoli, de' quali parlava egli spezialmente, che ci vengono da' lontani paesi, o anche dalle montagne del nostro Regno, soglion mantenersi buone, e vive per più anni in questo medesimo clima: dunque par, che sia più tosto imperfezion naturale di queste nostre, nate dal seme, la brevità della lor vita. Ma io dimando a lui: son esse per avventura piovute dal Cielo colla bella dote dell' immortalità le radiche forastiere, per cui non son così soggette a perire; o son' altresì nate, come le nostre dal seme? Per la gran perdita, che fassi ancor delle forastiere, molti Fioristi si son dismessi dalla coltura de' fiori, e quanti oggidì la continuano, dacchè ne ho io promosso il lucrosissimo traffico, tutti prevalgonfi principalmente delle semenze; altrimenti presto si farebbon dichiarati o Fioristi, o Compratori falliti, attesa la molta perdita delle radiche, che si fa, o la molta spesa, che converrebbe lor fare, per ripararla colla compra delle forastiere a pesantissimo prezzo.

309. V'è pure la sua ragione, per cui è vero, che da principio alcune razze delle forastiere mantengonfi più salde, che le nostrane. N'è la ragione; perchè nate, ed allevate in clima freddo, e lor propizio, vengono a noi più robuste, e meglio complessionate, che le nostrali nate e cresciute in clima disfavorevole. Di ciò ne abblam certa sperienza non che sol ne' Ranuncoli, ma ne' Tulipani, nelle Peonie, nel Giglio Riccio

cio della Signora, nel Giglio Narcisso Indiano &c., i quali portati quà o dal Regno, o da altri Paesi, ove stabilmente fioriscon bene, e si conservano; qui però fioriscon per due, o tre anni, e poi non più, ed o vi periscono, o diffondonfi in multiplico di cipolline sterili, come le madri. Perchè mai da principio son fecondi di fiori, e poscia steriliscono? Perchè di là vengon ben forti, e fane le lor radici, e le cipolle, e qui d'ambiente caldo le rende inutili, e le corrompe.

310. Per certe razze particolari, che son più costanti, e moltiplicansi con molto numero di rampolli, com'è nominatamente quella nobil razza di Ranuncoli bianchi, tinti leggermente d'incarnatino, (che qui chiamiam Rosetta d'Olanda) v'è la sua special ragione, ed ella è per appunto il buon temperamento, e gagliarda complessione, che portaron dalla natività, per cui reggono ad ogni clima, e vivono prosperamente, e si propagano in ogni luogo. Così è negli Uomini, e negli animali, che son di varia temperatura; chi sievole, e chi robusto, chi di lunga, e chi di corta vita, chi sterile, e chi fecondo, così fatti dalla Natura; e così è medesimamente nelle piante. Or queste appunto ben complessionate, comechè più rare a nascere, pur si son fatte col decorso degli anni le più numerose per la lor fecondità; e queste son, che vanno in giro per la mani de' Fioristi, e mandansi da un Paese all'altro; e per ciò ancora può sembrare, che le forastiere sien di più lunga durata, che queste nostre di semenza; perchè tra queste novelle la maggior parte nasce cagionevole di temperamento, massime in un clima lor contrario. Ma forse, che tra le nostre non ne fortiscon mai delle razze, costanti a mantenersi, e feconde a moltiplicarsi, quando almeno con arte lor diamo ajuto a conservarsi? Ed io, ed altri ce le abbiám mantenute, e moltiplicate
per

per più anni, ed in molto numero, finchè non sieno state colte da qualche disastro d'intemperie, che ha dato il guasto così alle paesane, come alle forastiere. Di queste venute novellamente dal seme, intere ajuole di più varie nobilissime razze di Ranuncoli doppj ne ho vedute nel Giardino della Sig. Marchesa Vico, conservatesi per più anni con numeroso multiplico; ma Ella usava l'arte opportuna per mantenerle, la qual perchè difficilmente s'inducolo i Fioristi, e Giardinieri ad osservare, perciò succedon loro tante perdite di buone razze.

311. Le piante novelle nel secondo anno della lor nascita dal seme soglion lussureggiare in molto numero di fiori, e tanti, che avendoli contati in qualche piede di Ranuncolo, ricco di prole sì, ma non sopra tutti straricco, ne contai più di quaranta. Or chi non sa, che riesce esiziale alla madre l'obbligo d'allevar molta prole, o che almanco sfrutta la pianta, e la indebolisce? Per questo riguardo precettano i Maestri d'Agricoltura, di doverli sfiorare gli alberi, o di strapparvi una parte de' nascenti frutti, quando la carica ne venga esorbitante, se non si voglia o perder l'albero, o perderne almeno il frutto per lo veggente anno. Or questa sì necessaria precauzione è quella, che osservava la Sig. Marchesa, e questa è l'arte di conservar lungamente le buone razze, non permetter loro quel grande sfoggio di fiori, di cui si caricano, strappandone molti nel lor primo spuntare, e lasciandone pochi de' più principali. Ma qui sta la difficoltà, che ciò si eseguisca: quanti son Fioristi, e Giardinieri sentono come strapparglisi le viscere, a strappare un fiore, i Giardinieri per lo interesse di venderne molti, ed i Fioristi per lo piacere, e vanità di goderfeli, e dar a godere agli spettatori le piante, adorne di molti fiori: anzi per la stessa vanità neppur voglion colti li fiori già maturi, cioè,

ciò che farebbe di qualche sollievo alla pianta ;  quando convenga coglierne , sempre si ha la mira a non isfiorar le piante più elette , acciocchè abbian sempre che ammirare i Riguardanti ; e così vanno a perdizione le radici delle migliori razze spostate , e consumate dalla moltitudine degli allievi .

312. Concorre a questo male la fidanza sul secreto delle semenze , per cui non ci curiam troppo delle perdite , mentre abbiám l'arte in mano di subito ristorarle . Così risposemi il Giardiniere del Real Palazzo , quand'io lo esortava a sgravar le piante per conservarle : non mi dò pena della perdita , poichè il semenzajo me la ripara col vantaggio di più , che mi dà piante nuove , le quali producon più grandiosi , e più vistosi fiori , ed in maggior copia , che non fan le vecchie radici ; ed ottengo insieme il piacere , che quando S. E. Sig: Vicerè scende in Giardino , e vengono i Signori di Corte , ed altri Dilettanti a goder de' fiori , abbiano come deliziarfi , ed ammirare la bellezza non meno , che la doviziosità lor quantità . Quindi per conchiudere : il clima men propizio , la nostra vanità , e l'abbondanza delle buone razze son le vere cagioni del male , apposto dal Sig. Marchese alle novelle piante di semenza .

313. Rimane a dar conto della sua terza censura , che contiene due parti ; e quanto alla prima della rarità de' fiori doppi di supremo grado , ella è stata da noi medesimi asserita in più luoghi , e sen' è data ragione fisica nel Cap. 19 , n. 131 : perchè la Natura , la quale intende la moltiplicazion delle piante , ed odia i mostri , quasi vien forzata a dar copia di mostri affatto sterili , quai sono i doppi di tal grado . Ma pur altre volte è stato da noi detto , che come in alcune specie è raro a sortire il doppio , così non è sì raro in molte , ed in molte suol esser frequente , come ne' Gal-
 nelle Balsamine femmine , nelle Viole , nella

Co-

Corona del Sole &c; ed ore sien rari , non è difetto dell' arte , ma di Natura più o meno restia , giusta le varie qualità de' diversi generi. Ne' Ramuncoli , de' quali parlava il Sig. Marchese , di tai doppi ne ho contati tanti nel suo medesimo giardinetto , e così più volte fra li miei , ove le semenze sieno state fecondate a dovere , che il guadagno può mettersi al dieci per cento , che non è piccolo , se a questo aggiungasi l' altro , forse non men pregiabile de' tanti semidoppi di primo , e secondo grado , che son la massima parte.

314. Ma i semidoppi , soggiugne il Sig. Marchese , benchè ne vengano in gran numero , pur sogliono sdoppiare dopo un pajo d'anni , e poi non son essi in molto pregio presso i buoni Fioristi . Rispondo , che lo sdoppiare , com' è verissimo ne' semidoppi di secondo , e d' infimo grado , così falla in quelli di primo grado , i quali comunemente ne' libri de' Fioristi son chiamati assolutamente doppi , come altrove si è notato ; perchè sabbene portino il bottoncino della semenza con qualche stamignuola , pur non cedono a que' primi o nella durezza delle foglie , o nella costanza di mantenersi nel loro grado : sicchè quei , che scadono alla scempiezza , son gli altri di grado inferiore ; e di questi possiamo anche star contenti della pompa , che spiegano per qualche anno , almeno ne' primi lor fiori grandi , e pieni tanto , che fanno invidia ai veri doppi . Che se scempiano nel seguente anno , che pena ci dà il levarli via , e perderli , se dalle nuove semenze ne avremo altrettanti , e più , da riempierne il giardino ? Le stesse semenze non le caviam noi da cotesti semidoppi per la maggior parte ? e quella dote , che lor manca della durabilità , non vien compensata a mille doppi dalla lor fecondità ? Come dunque i semidoppi mancano tanto di pregio , da non meritarsi la stima de' buoni Fioristi ?

315. Ella è quistione assai problematica presso i medesimi, se il fior semidoppio uguagli il doppio ne' pregi suoi, o se forse ancor lo superi. Il Sig. Pluche assicura, che il gusto presente de' Fioristi Francesi stia comunemente a favor de' semidoppi, e n' è desso medesimo favoreggiator principale, e son degne da sentirsi colle sue stesse parole le savie sue ragioni. Tom. 3. Dial. 3.

2. *Contes.* Per quanto belli si sieno questi Ranuncoli doppi, tuttavia alla giornata si stimano molto più i semidoppi, a quali comunemente si dà il primo vanto. Mirate quà questi miei. Voi ben vedete, ch' essi non hanno, se non una mediocre quantità di foglie, e vengono a essere una cosa di mezzo tra i Ranuncoli doppi, che son correati d' un grosso garzuolo di foglie, e tra gli scempi, i quali n' hanno pochissime.

Cav. Non so intendere, perchè i Ranuncoli doppi non abbiano ad essere più stimati di tutti gli altri. Sarà forse l' autorità della moda quella, che avrà messi in tanto credito i semidoppi.

Cont. Nò che questa preferenza non deriva da un genio volubile, e capriccioso, com' è la moda. Ella è fondata su quella portentosa varietà di colori, che li rende veramente ammirabili; un ajuolo di Ranuncoli semidoppi vi presenta addirittura un teatro, composto di mille scene. Si ravvisa in alcuni il candore del latte, in altri il giallo dell' oro, in questi il pallor della canna, in quelli il color del limone; quà il rosso della porpora, là il carnicino del fior di pesco, ora il bianco listato di rosso, e vergato di nero, ora il vermiglio della rosa al di fuori, ed il bianco del giglio al di dentro, quivi il fondo lionato bordato di ponsò, colà il fondo chermisi bordato Che più? Il catalogo de' Ranuncoli semidoppi non vien mai a fine: ogni anno ne scappan fuora de' nuovi. Se fosse lecito ad un
in-

innamorato cangiar l'oggetto del amor suo, i fiori varrebbero ad appagarlo: e se fosse vago di collocare il suo affetto in una creatura, che ad ogni tratto cangiasse sembianza, dovrebbe prendere ad innamorarsi del Ranuncolo.

Prior. Certo che vi si trova pascolo per tutti i genj. La radice d'un bel Ranuncolo perpetua, e fa rinascere ogn' anno la medesima specie di bellezza. Questa è una qualità da piacere a chi ama costantemente. Il seme del medesimo fiore produce ogn' anno una nuova beltà; ecco una prerogativa da adescare coloro, che son volubili ne' loro amori, colla sicurezza di trovar sempre tra tanti oggetti qualchuno, che piaccia. Conosco un Accademia di dilettanti di fiori, i quali avean principiato ad assegnare a ciascuna specie di Ranuncoli il nome di qualche personaggio riguardevole, o segnalato per qualche suo merito particolare nel Mondo &c.... Ma i nostri Accademici abbian sonaron presto l'assunto, che si eran preso. Conciossiachè confrontando lo scarso numero degli Uomini grandi colla moltitudine de' nuovi Ranuncoli, che ogui giorno fiorivano, s'accorsero, che la più parte di questi fiori avrebbe corso rischio di rimaner senza nome.

Cons. Oltre al vantaggio dell' inesaurita lor varietà, che cangia ogni anno l'aspetto delle platee de' giardini, i Ranuncoli semidoppi hanno un'altra prerogativa, che ne' doppi non si ritrova. Sono fecondi; e si vanno ad ora ad ora moltiplicando per mezzo delle semenze, laddove i doppi son tutti sterili.

Cap. Questa loro sterilità è ella particolare? o pur comune di tutte le specie de' fiori doppi?

Prior. Ella è una disgrazia quasi generale d'ogni fior doppio, il non produrre alcun seme. Vi si scorron bensì gli embrioni d'un piuolo, e di alquante filacciche produttrici ordinariamente delle semenze. Ma

la moltitudine delle foglie, che lo cuoprano, non le lascia venir a capo, e in conseguenza fruttificare. Ciò tanto è vero, quanto che, se mai per mancanza di governo, o per qualche altro accidente vengono ad affiebolirsi, ed a produr manca foglie, allora il cuore de' detti fiori respirando più agevolmente, e ricevendo con libertà l'impressione del calore dell'aria, genera al pari dell'altre piante le sue semenze.

316. Al contrario vi sono i partigiani, che favorreggiano i Ranuncoli doppi, e dan loro la preferenza sopra i semidoppi, tra i quali trovasi impegnato il P. d'Ardenne; e per udirne le ragioni dell'una, e dell'altra parte, soggiungo, quant'egli allega a favor de' doppi contra il Sig. Pluche. *Tratt. de Ranun. par. 1, pag. 28.* Io direi dunque, che agli occhi miei pajono i Ranuncoli doppi dover riportare il primo vanto senza contrasto sopra i semidoppi, i quali soli aver potrebbero con essi qualche rivalità. Io non so, se coloro che negano, o mettono in dubbio, d'accordar questa preferenza a doppi, l'abbiano ben' esaminata. Mi sovviene d'aver letto, che Socrate volendo un giorno declamare contro la beltà, si bendò gli occhi prima di cominciar l'arringa, per mostrar, che non si poteva contra di quella dichiarare, che con premunire gli occhi dal suo lusinghevole incanto; io ne fo qui l'applicazione ai Ranuncoli doppi.

Concedo che vi sien Ranuncoli semidoppi più stimabili di certi doppi; ma facciam confronto tra ciò, che vi ha di più perfetto in ciascun de' due generi: che cosa mai offerirà di buono il gener de' semidoppi, che non si troverà nell'altro con maggior vantaggio? la fecondità è una prerogativa che si vanta; ma i Ranuncoli scempi, che son più costantemente fecondi, saran mai preferiti per questo titolo? Vantasi la varietà de' colori de' semidoppi, come se i doppi non avesser u to
i gar-

i garzuoli del tutto almeno equivalenti : sene loda la moltitudine, ma dev' ella giammai prevalere al merito? La moda dichiarasi a favor delle novità; debb'ella dunque preponderare all'estimazion comune degli Antichi, i quali non coltivaron altri Ranuncoli, che i doppi, per confessione di que' medesimi, che lor ne contrastano la preferenza, (Spett. della Nat. tom. 2. pag. 66.) e che negligerarono presso che interamente tutti gli altri Ranuncoli? Io alla fine non dimando altro, che il parallelo di due Ranuncoli, e che sene faccia giudizio. Gli sguardi non cadono, se non sempre su'l bello, nel fissare un doppio, che volume, che sembianza, che opulenza di foglie, che vivezza di colore? Può si aver occhi, e non veder la superiorità, che ha esso sopra gli altri? Accordate intanto tutto quel, che volete al semidoppio, quel voto, che io veggio nel centro d'un semidoppio il più ben formato, secondo me diminuisce il suo bello. 2.

317. Ma lasciando da parte una quistione, la decisione della quale, più che dalla ragione, dipende dal vario gusto de' Dilettanti; non potrà negare almeno il Sig. Marchese, che i nostri fiori da semenza, comunque sieno, doppi o semidoppi, ne' primi anni della lor gioventù superino molto sensibilmente le razze antiche e straniere, ancor le più nobili, nella grandezza della mole, nella novità de' capricci, ed in tutto il complesso delle doti, che può far bello un fiore. Di molte prove, che addur potrei, scelgo due sole testimonianze: una di tanta autorità, quant'è quella del medesimo Sig. Marchese, e l'altra, quant'è quella di Sua Eccellenza il Sig. Marchese Fogliani Viceré, e della fu Marchesa Viceregina. Fiorista pur ella peritissima, e di sì alta intelligenza nel giudicare di questo, e di ogn'altro affare più rilevante, che si fece universalmente ammirare in quel poco tempo, che Iddio ci permise, di

apparar da' suoi virtuosi esempi la buona lega; che far possono in una Dama la Signoria colla cristiana Pietà, per cui fu Ella sì presto giudicata matura per l'eterno Regno.

318. Il Sig. Marchese di Sortino anni addietro di sua bocca mi raccontò, che le Sig. Madri del Ven. Monastero detto di S. Vito, udita la fama de' suoi preziosi fiori, (come Fioriste anch'elleno, che non ammetteron quasi verun altro, che questo innocente divertimento nel lor rigido ritiro) gli mandarono a chiedere la mostra di tutte le sue razze, per veder se alcuna lor ne manchasse, che ancor esse ne tengono un nobilissimo assortimento, e per l'ottima coltura, che lor danno, sono i lor fiori universalmente applauditi. Il Sig. Marchese in occasione di dover mostrare le dovizie del suo giardino a Fioriste tali, che potevano con seco lui competerla, non trascurò, di fare una scelta squisita di ciascuna sorte di fiori, i più degni da comparire. Adornò due canestri di Ramuncoli, ed in uno per distinzione pose tutte le sue finissime razze antiche, ed in un altro tutte le moderne da semenza, e le mandò. Piacquero sopra modo, e tutti universalmente, questi fiori alle Signore Monache, ma non tutti piacquero egualmente; perocchè mandarono a dirgli, che sebbene alcuna non v'era fra tutte quelle sì varie razze, che non fosse degnissima; pure la rarità, e bellezza di quella del primo canestro non era tal, e tanta, che doveste del tutto invidiargliela; ma delle altre del secondo, (ch'erano le novelle) non avendone mai esse vedute le consimili, pregavano, a dir loro il Paese, onde mai le avesse fatte venire; perchè non sapeano immaginare qual terreno, e qual clima in tutta la terra potesse mai produrre fiori sì grandiosi, quant'eran quelli, sì vegeti, sì finamente coloriti, sì nuovi, e capricciosi; e però pensavano, che il Sig. Marchese colla sua rara efficacia, ed abilità ne avesse po-

potuto aver le radici per avventura dal Paradiso ter-
restre, là ove unicamente lor sembrava, esser potute
nascere piante così felici, e fiori cotanto miravigliosi.

319. Non è punto minore la lode, data a cotesti
fiori dagli Eccellentissimi Sig. Vicerè, e Viceregina.
Arrivata in Palermo questa Signora il suo degnissimo Con-
forte, che l'anno avanti aveali veduti con grande suo
compiacimento, protestavale più di una volta in mia pre-
senza: Voi vedrete qui a suo tempo fiori così belli, che
certamente non ne avete mai veduti de' consimili, nep-
pure in Olanda; alla qual espressione mal' arrendevasi
la Sig. Marchesa, parendole esagerata, dopo aver ve-
duti in Olanda fiori, com' Ella diceva, di bellezza, e
finezza inarrivabile, e però attendea con ansietà il ven-
turo Marzo, per sincerarsene. I primi cinque Ranunco-
li, che sbucciaron, veduti dal Sig. Marchese di Soragna
suo Nipote, benchè aneora non totalmente aperti, par-
vero a lui sì belli, e li stimò maturi, e degni di pre-
sentarli alla Marchesa, per disimpegno altresì della sua
parola, pella testimonianza, che fatta anch' Egli avea,
della straordinaria bellezza di tal sorta di fiori. Li colse,
e glie li presentò; ed Ella ne restò sì contenta, e fuor
di modo compiaciuta; che pensando di non avere a ve-
derne altri per avventura di pari pregio: ne' fiori fusse-
guenti, mandò a chiamarsi un valente Pittor Fiorista,
acciocchè al vivo ne ritraesse due, o tre più insigni,
per conservarsene la memoria; e mandò da me, per là
portarmi a vederli, e per sapere, se potea sperarsi, di
averne altri ne' fiori da sbucciare, di simile qualità? E
sentendosi risponder di sì, e che di ugual bontà, come
poi avvenne, se ne sperava forse la maggior parte, con-
tentissima ne rimase.

320. Tre di questi Ranuncoli veggonsi delineati nel-
la Tab. 50. fig. 1, 2, 3; ma quel della fig. 2, venuto-
mi l'anno precedente, nè mai altra volta da me veduto,

to, si potea dire un miracolo di Natura, cui non saziavasi la Sig. Viceregina di mirare, lodare, e mostrare ad altri. Era un fior doppio di primo grado, sparso tutto in piano nella faccia superiore con le foglie ordinate a gradini con mirabile simmetria; ma stupendo era l'ordine de' colori: occupava il centro un ampio circolo di vivo verde, e questo veniva cinto intorno da una zona soavemente bianca, come il latte, e questa ultimamente per tutta la circonferenza del fiore veniva ricinta da un'altra fascia di vivacissimo rosso: fior tale, che per la sua rarità dal sano giudizio di una Fiorista molto ben critica meritò a se condegnamente il ritratto, e per suo riguardo anche a' fiori compagni, i quali sebbene avessero avuti altri meriti, pure non avean quello della total rarità.

321. I fiori poi, che di mano in mano andarono sbucando, verificarono il mio detto, che non sarebbero stati d'inferior condizione; poichè quantunque della massima parte di quelle piante non aveva io pur anche veduto il fiore, per esser quella la prima volta, che mi fiorivano, non per tanto era mal fondata la mia presunzione; perchè mi costava dalla sperienza di più anni, che semi, come quelli di buone razze, e bene innestati di mia mano, partorivano spesso de' nuovi portenti, e tanto gran numero di buonissime razze, che di più mila grani non ne fallivan cento, che fosser di fiore scempio. Le nuove radici de' Ranuncoli, che io diedi quell'anno al Giardino di Sua Eccel: furon da circa dieci mila; ad al fiorire, quelle indegne di far comparir, che feci strappare, non superarono il centinaio; sebbene poscia ne volli strappare circa altre quattro cento di minor pregio, dopo fatta la general comparir de' lor primi fiori più grossi, e più vistosi de' secondi, ed ultimi.

322. Della bontà di questi fiori ne scrisse Ella in
Na-

Napoli con tante lodi, che il Sig. Abbate Cajafa celebre Fiorista invogliatone, le ne dimandò le semenze; e gli furon mandate; anzi poi gli furon mandate nelle caraffe i fiori medesimi, e con vento prospero vi arrivaron freschissimi dopo due giorni. Quanto in Napoli fosser piaciuti, lo espresse l'Abate nella risposta al Sig. Vicerè con formole di encomio straordinario. Ho voluto addurre tali, e tanto autorevoli testimonianze, per animare i Fioristi a valersi delle semenze nella maniera insegnata con tanto lucro di quantità, e qualità di fiori, come si è detto; e poichè dell'ottima preparazione delle semenze par che se n'abbia parlato abbastanza, anzi essendosi somministrati lumi assai copiosi per regola, e direzione dei Dilettanti, tempo è di ragionare della Coltura generale de' Fiori.



P A R T E T E R Z A .

Della Coltura de' Fiori.

C A P O XXIII.

*Del raccorre, e conservare i semi, e del
Semenzajo.*

323



Ra che si è data l'istruzione, per la buona preparazion de' semi, ineshausta miniera, onde può, e deve ogni gran giardino di piante, e fiori arricchirsi, potremo entrar di proposito nella terza Parte del presente Trattato, ch'era la Coltura generale per ogni sorta di piante a fiore, riserbandoci nella quarta, ed ultima Parte la Coltura di ciascuna specie particolare. Porta il buon ordine, che si dia principio dai medesimi semi, i quali bisognerà 1. raccorre ben maturi, 2. saperli ben conservare, 3. ben seminare, e 4. ben coltivare. Cominciando dal primo, è segno certo della maturità de' semi la maturezza del frutto, bocciuolo, spiga, o qualsivisa altra maniera di Ricettacolo, che li contenga. Quando il frutto cade da se, o la spiga, il bocciuolo, o il ricettacolo s'inaridisce, o spacca e spalanca da se, non si ha più che aspettare per raccorre i semi; perchè la Natura, avendo fatto il frutto, la spiga, &c. a fine di lavorarvi dentro il seme compiuto che questi lo abbiano, più non li cura, e gli abbandona. Se 'l seme non farà ben maturo, v'è pericolo,

lo , che non germogli , e ne ho qualche speranza in quel de' Garofani , il qual se sarà nero , sarà ben compiuto , ma se sarà colto , prima che il calice , e la boccuola de' semi non sia del tutto secca , e fessa , vi si troverà dentro il seme ancor bianchiccio , il qual poi difficilmente nascerà .

324. Upo è usar dell' industria , e dell' attenzione nel raccorre i semi di certe piante , per non perderli , ed insieme averli maturi ; poichè alcune , subito che han compiuto il seme , lo rilasciano ; ed o cade da se e si disperde , o s' è leggiero , lo disperdono i venti : così fa la Balsamina femmina , le di cui boccuole screpolano improvvisamente , e lontano spargono i semi ; e però bisogna preventivamente andar rastando colle dita quelle boccuole , che pajon mature ; e s' elle son mature , tosto screpolano , e gettano in mano i semi . Ma una maggior diligenza bisogna usar per la semenza degli Anemoni , la qual per una parte non matura tutta ad un tempo , ma comincia a maturarsi dalla sommità del Ricettacolo , mentre quella della base ha bisogno di tempo a perfezionarsi ; e dall' altra parte , per esser leggerissima , e coperta di bambagia , subito che staccasi , ne va via col vento . Due rimedj sono stato solito praticare : allorchè vedeva i semi della sommità già prossimi a staccarsi , troncava io lo stelo dalla pianta , e lo metteva in acqua nella caraffa , e lo teneva al Sole , finchè il seme tutto si compiesse : ovvero , ed è la miglior maniera , copriva con carta , o con velo il bottone della semenza , per raccorla tutta , e ben compiuta : chi però stesse ogni giorno su l' osserva , potrebbe successivamente andar cogliendo quella porzione , che si va ogni dì perfezionando .

325. Per ben conservarsi le semenze , avverte il Sig. Clarici , che si colgano all' asciutto . par. 2, c. 5.

Se vi fosse caduta rugiada, s'aspetterà che il Sole ne l'abbia asciugate, non dovendosi mai raccogliere bagnate da pioggia, nè umide; perchè contraggono certa specie di lanugine, o muffa, che le rende infconde: però se si colgan bagnate, v'è 'l rimedio di asciugarle per un poco al Sole. Certo è, che le semenze devon bene asciugarsi prima di conservarle, e devon tenerli in luogo asciutto; ma discordano il P. d' Ardene, e 'l Sig. Pluche circa la maniera di asciugarle: vuole questi, ch' espongansi per una mano di giorni al Sol cocente, affinchè si stazionino, e si conservino più agevolmente: Dial. 2. Tom: 3: Ciò che non approva l'Ardene, volendo piuttosto, che si seccino all'ombra in luogo aperto, e ventilato; ed io mi sottoscrivo a questo suo sentimento, massime quando non colte del tutto secche, sarà più sicuro, che l'umido lor naturale, vada insensibilmente svaporando all'ombra, che non violentemente tutto ad un tratto col calor del Sole, potendo per avventura la subita contrazione delle parti arreccar danno alla tenerissima lor texture.

327. Un altro utile avvertimento suggeriscono i moderni Autori per la buona conservazione de' semi, cioè che si colgano con tutta la buccia, o spiga, in cui stan chiusi, e senza estrarneli; così come stanno, tenerli fino al tempo da seminare: in tal guisa si mantengono i semi più sani, ed intatti, e meglio, e più sicuramente germogliano, come ha mostrato l'esperienza. Nell' Isole dell' America non si conoscevan le nostre biade, e per introdurvele, vi si cominciò a seminare il Frumento, colà portato dall' Europa; ma per quanta diligenza vi si adoperasse, non fu mai possibile, che ne nascesse un solo grano. Il difetto non proveniva dalla mala qualità del clima, o della terra, ma dalla mala qualità della sementa; poichè colla lunga navigazione veniva ad alterarsi, e ne moriva

riva il germe : quindi fu stimato espediente, d' imbarcarlo così , come veniva dalla messe con tutte le spighe le quali furon di più chiuse dentro barrili ben otturati ; ed in tal guisa potè finalmente riuscir , che il frumento portato in America vi germogliasse , come riferisce il P. d' Ardenne pag. 209 , ed aggiugne ciò , che racconta il Sig. Moncony , che in qualche paese d' Inghilterra usano di seminare il grano con tutta la spoglia , e vi riesce considerabilmente migliore .

327. La ragion fisica , per cui le sementi conservansi meglio , lasciate dentro i loro gusci , ella è : perchè restando attaccate alla placenta , e chiuse ne' loro involucri , non ha per onde svaporar l' umido radicale , e si mantiene ; siccome la difesa delle spoglie ripara il seme dall' azion dell' aria , che l' altera coi suoi sali , e lo corrompe . Per questa medesima ragion dell' aria nel nostro Regno si conserva il frumento fino a trent'anni ne' pozzi , o fosse sotterranee , così buono , e sincero , come se fosse allora venuto dall' aja ; il qual fenomeno volgare fra noi , viene ammirato dal P. Regnault , e da quel buon Filosofo , ch' egli è , così pure vien da lui spiegato Tom. 3 , Tratten. 5. In codesti pozzi l' aria esteriore non può portar negl' interstizj de' grani di biada , nè vapori , nè sali capaci di penetrarli , sciogliarli , ed alterarli . L' aria interna , e nei stessi grani contenuta , non può distendersi , nè per conseguenza con la sua estensione disordinar le particelle delle granella ; perchè son elleno da ogni parte così rinferrate , e sì chiuse , che uno spazio maggiore occupar non potrebbero , o mettersi più al largo ; quindi la biada resta per lungo tempo tale , o quasi tale , qual' era allora , quando si chiuse nel pozzo .

328. Per quanto tempo possa il germe conservarsi vivo nei semi , ed atto a rinascere , non può universalmente determinarsi ; perchè ciò dipende dalla varia qua-

qualità, e particolar natura de' medesimi semi; poichè altri più, altri meno reggono al tempo, e dipende altresì la lor durata dalla buona maniera di custodirli, e preservali dalla corruzione, e dalla infestazione degli animali, che vanno a roderli, e determinatamente dalle formicole, che a nessun seme mai la perdonano. Il Sig. Rajo afferma, che quando tengansi ben cautelati, possano durar vegeti ancor più di cinque anni; ma Roberto Morisone non concede più d'anni cinque alle piccole semenze, nè più d'anni dieci alle maggiori. *Prælud. Botan. p. 469.* Ho io seminati semi di Triumfetta, e me ne son nati alcuni dopo cinque anni, che li teneva ben conservati; ma il P. d'Ardenne pag. 238. assicura, di essergli nata semenza di Porcacchia dorata, vecchia di sette anni, di Cicoria di dodici anni, e di Musco, ovvero Kermia Egiziana di anni almeno ventisei, benchè di 30. grani di questa ne nacquer solamente due piante. Il Laurembergio lib. 1, c. 17 è singolare in voler, che il seme antico nasca più bello; ma l'opinione e sperienza comune si è, che l'antico tarda a nascere, nè tutto nasce, nè il nato vien sù con quel rigoglio, che porta seco per ordinario il novello di quel medesimo anno: così Teofrasto, e dietro a lui Plinio con tutti gli Autori di Agricoltura: *Semen anniculum optimum putatur, binum deterius, & trimum; quod autem ultra sterile.* *De causis Plant. L. 8, c. 11.*

329. A tal proposito narra il Sig. Barone Nicotia un suo sperimento, che può servir di ben'utile istruzione nel seminar le biade: Ho sperimentato, dic' egli, esser sempre migliore il seme del medesimo anno, con tutto che fosse stato magro assai, per essere stato quell'anno pessimo; quando pareva di non dover nascere, per esservi quasi la sola scorza, con averlo prima seminato in un vaso, e acque felicemente, come
 fu.

fusse stato granito: e così di esso seminai tutta la Masseria; avendone avuto assai più abbondante raccolta di quelli, che timorosi di seminare il seme del medesimo anno, seminarono quello di due, ben granito, e pesante; perchè deteriora, e non nasce tutto, e nemmeno vien col vigore di quello dell'anno stesso: sicchè senza veruna considerazione, nè timore, se sia sgranito, sempre si deve seminare di quello dell'anno stesso, per essere l'ottimo, come dice Plinio sopra detto. 2

330. Poichè non resta a dir altro intorno alle semenze, trattasi ora di doverle seminare secondo l'arte: in qual luogo, ed in qual terra, in qual tempo, ed in qual maniera? Il luogo può essere o stabile in piana terra, o nei vasi amovibili: il luogo stabile chiamasi seminario, o semenzajo, ed ha il vantaggio, che i semi vi nascon più lieti, e vi crescon più vigorosi, che ne' vasi; ma questi hanno il comodo, di poter essere trasportati da uno in altro sito per la bisogna, che occorre tal volta, di dover riparare le tenere piante o dal gelo, o dal Sole, o dai venti, o dalle piogge: Ne' climi caldi va posto il semenzajo nella parte del giardino più fresca, ed o totalmente a baclo, o il meno, che si può esposto al sole: e ne' climi temperati è bene, che sia scoperto dal sole matutino per poche ore; imperocchè la Natura per ordinario ha coperti di spoglie dure, o dense i semi, affinchè possano più lungamente conservar l'umido lor radicale; e però han bisogno di qualche macerazione in luogo freddo, ed umido, per poter germogliare; siccome ancora germogliati che sono, prima che abbian profondata la radice, il caldo Sole asciuga la superficie della terra, e lor sottrae l'alimento, e li scotta, e li fa languire. Quest' avvertenza è più necessaria precisamente per le semenzine piccole, le quali non sostengon

Sopra di se altro, che un tenue velo di terra, massime per quelle, che son contumaci a nascere, qual'è la semente de' Ranuncoli, la quale in quest'aria, più tosto calda di Palermo, o non nasce, o mal cresce in sito solatio, e riesce sempre ottima in sito freddo, ed umido, purchè non sia totalmente a bacio. Giova pure il sito fresco, ed ombroso, per averè il comodo, da poter seminare preventivamente, prima del tempo consueto, eziandio nell'Estate, e con ciò guadagneremo, che i fiori vengano primaticci, o che anticipino un anno prima la fioritura.

331. Ma nei climi freddi convien dare al seminario un sito difeso dalla Tramontana, e più, o meno solatio giusta il grado della lor rigidezza; anzi ne' paesi, ove più regna il ghiaccio, sarà più espediente, prevalersi de' vasi, che del terreno, per poterli ritirare al coperto la notte, e ne' giorni freddi; perchè altrimenti corron rischio le tenere piante di morirvi assiderate dal gelo, come tutti avvertiscono gli Autori nativi di tai paesi. I vasi possono essere o casse basse, e piatte di legno, il qual regga all'umido, e nel bel tempo disporli potranno per lo giardino con buon'ordine, e simetria; ovvero faranno vasi di terra cotta, che diciam testì, ma più ampj, che alti; perchè da una parte basta alle piccole piante un mezzo palmo di terra, per nutrirvisi a sazietà; e dall'altra riesce ancor nocevole la profondità del vaso, come so per isperienza: dacchè dovendosi tener sempre umida la superficie della terra, ove sono i semi, bagnandola frequentemente, ancor dopo che son germogliati, quando tuttavia non han profondate le radici; quell'umido, che ristagna, e siede morto nella profondità del vaso, mentre ancor non è attratto dalle corte radici, viene a corrompersi, e corrompe seco la terra, come in tal caso ne dà segno il muschio, e la vischio.

schiosa uligine, di cui tosto ricuopresi la superficie; e con ciò ammalano i teneri allievi, e si corrompono. Allo stesso inconveniente sta pur soggetto il semenzajo in piana terra, quando l'acqua vi ristagnasse; e però il suolo, ove sta, debb'esser bibulo, e la terra sopra di quello alquanto sollevata, acciocchè l'acqua superflua sene scuoli giù, e l' suolo attraggala, e sene imbeva.

332. Va medesimamente sotto nome di seminario un pezzo di terreno, sol destinato a piantarvisi dentro tutto ciò, che non sarà per dare il fiore in quell' anno, per essere ancora piccolo, acciocchè vi si allievi, e cresca sino all'età, da poter fiorire, come son bulbetini di Tulipani, Giacinti &c. linguette di Anemoni, radicette di Ranuncoli, figliolini di Garofani, e simili altri, che han bisogno di tal terreno, e sito proprio, qual conviene ad allievi teneri, per potervisi abbarbicare, e potervi crescere prosperamente. Le qualità del terreno, del sito, e di tutt'altro, che convengono a questo secondo seminario, son le medesime, che competono al primo. E per la qualità della terra, è da preferiverfi, ch'ella sia sceltissima; cioè sia sciolta, soffice, e tenera, sia mediocrementegrassa, sia sottilmente crivellata, e sia sempre nuova, o almeno sia stata a riposo per qualche anno; o alla men peggio sene aggiunga una metà della nuova, ma che sia ben sostanziosa, e si rimescoli minutamente coll' antica. Le piccole piante come bambine, che sono, e come folte, che soglion nascere, succiano molto latte, e sfruttano tanto grandemente il terreno, che se non mutisi dopo uno, o al più dopo due anni, diverrà fiacco, e sterile, nè tutta vi nascerà la semenza, nè la nata vi si potrà tutta conservare, nè porterà il solito suo vigore quella porzione, che sopravviverà. Quest' avvertenza è particolarmente necessaria per lo semenzajo de' Ranuncoli, i quali sfruttano assai la terra, e mi è suc-

ceduto in due differenti seminarii, a cui non fu cambiata per tre, o quattro anni la terra, che i semi declinando sempre al peggio, all' ultimo poi in gran parte non vi nacquero, e i nati riusciron così smunti, ed infermicci, che la massima parte vi morirono.

333. I giorni tiepidi, e fecchi sono il tempo più opportuno da seminare, tre o quattro dì dopo una larga pioggia, come insegna con altri il Rajo Hist. Plant. *L.*, 1, c. 18, p. 34. *Semina omnia fecca tempestate serenda sunt, tertio, quartove die a pluvia largiore*: oppure sarà meglio prevenir la pioggia, come da qui a poco si dirà; perchè se la terra è bagnata, col zapparla, e maneggiarla s' impasta, e poi s' indura, come loto, ed i nascenti germogli esigon la terra soffice, e permeabile alla tenerezza delle lor radice. Le stagioni proprie da seminare, o da mettere a terra piantoncini, son due; la Primavera, e l' Autunno, prima che sopravengono i calori estivi, e la siccità, e prima, che arrivino i rigori del verno; gli uni, e gli altri men confacevoli alle nascenti piante, le quali han bisogno, di metter prima profonde radici, per poter reggere alla violenza o del caldo, o del freddo delle due estreme stagioni; ma seminando, o piantando nelle due medie temperate, hanno esse campo di venir sù, ed agio per fortificarsi, prima che l' estremo calore, che le fa languire, e l' estremo freddo, che le agghiada, lor sopravenga. Del pregiudizio, che apporta il seminare a tempo improprio, sen' è dato un esempio nel Cap. 16 n. 225 nei semi della Balsamina femmina, che presi dalla stessa massa, e parte seminati a tempo congruo nel mese di Marzo, parte a tempo incongruo nel Giugno; quelli riusciron quasi tutti doppi, e semidoppi, e questi del tutto scempi. Con tutto ciò vi son delle semenze, che facilmente germogliano in ogni tempo, senza perder di con-

di-

dizione; e vene son di quelle, che anzi esigon d'esser meglio seminate nel cuor del verno, quando sien di scorza dura, e uopo abbiano, per ischiudersi, di lunga macerazione. Nella coltura delle particolari specie de' fiori dirassi di ciascuna il proprio tempo da seminare il suo seme; ma quando non si sapesse, qual debba essere il tempo preciso, in cui abbiassi a metter sotterra il seme di quella tal pianta, che s'ha alle mani, o per esser pellegrina, o come che sia, si dee sterzare il seme in tre partite, come insinua il Sig. Pluche, o anche meglio quadripartire, ed una porzione seminarne a Primavera, un'altra di State, un'altra d'Autunno, ed un'altra d'Inverno. Così vienfi ad assicurare il partito, ed a godere infallibilmente de' nuovi acquisti.

CAPO XXIV.

*Tempo, e maniera da seminare i semi;
e propria lor coltura.*

334. **I**Ntorno al tempo da seminare restan due utili quistioni a risolversi. Primo se sia più espediente il seminar primaticcio, o il tardivo, o il seminar fra l'uno, e l'altro tempo? Secondo se nel tempo da seminare debbasi aver riguardo agl'influssi Celesti de' Pianeti, particolarmente della Luna? Questa seconda quistione, per esser lunga, e per non interrompere il filo del discorso, sarà trattata per se sola nel seguente Capo. E però circa la prima va fuor di dubbio, che il seminar nel mezzano tempo fra l'uno, e l'altro estremo sia sempre il più sicuro; perchè fuor di tal tempo, ch'è il proprio, si corre rischio di perdervi le sementi, quando il Ciel non sia propizio, o

che acceleri, o che ritardi le piogge, il freddo, e la stagion, che conviene alla lor seminagione. Di più sembra certo, che il seminar tardivo sia di tutt' i te mpi e men sicuro, e men' utile; men' utile, perchè non si avran- no i fiori primaticci, o anche anticipati un anno prima del dovere; e men sicuro, perchè i semi tardivi sopraggiunti dall' eccessivo freddo, e rigidezza dell' Inverno, ovvero dall' eccessivo calore, e siccità della state, o non vi potranno nascere, o nati non vi potranno crescere, o vi cresceran fiacchi, e mal sani, dall' intemperie dell' incongrua stagione soperchiati, ed oppressi:

335. Rimane solo a decidere, se il seminar primaticcio, benchè men sicuro del seminare al mezzo tempo, sia pur di questo tanto più utile, che gli si debba preferire. Dico, che merita quello sopra tutti assolutamente la preferenza: perchè da una parte può darli qualche riparo alla minor sicurezza, ed al pericolo di perdervi la semenza, e dall' altra parte vi son de' vantaggi considerabili, che farò per dire. Il primo riparo è, che se sono semenze autunnali, e voi anticipate a seminarle ancor durante il caldo estivo; potrete seminarle in luogo fresco, ed ombroso, e tenerle umide, innaffiandole frequentemente; e se sieno di quelle di Primavera, che voi seminate, mentre ancor dura il freddo del verno: mettetele in luogo meridionale, esposte al Sole, e riparate da Tramontana, e praticate l' industria riferita dal Sig. Clarici *Par. 2. c. 5. §* Chi volesse con certezza aver le piante innanzi tempo, potrà far ciò, che praticano con buon successo i Giardinieri di là dall' Alpi. Scelgono questi il sito esposto al Mezzodì, e verso mezzo il Gennajo cavano la terra quattro piedi in profondità, ed in lunghezza a piacimento. Riempiono questa buca per tre piedi di letame di Cavallo, pur allora cavato dalla stalla, e sopra vi pongono un piede di terra della migliore; il che

che fatto tardano poi otto, o dieci giorni a seminarvi, affinchè il calor del letame svapori in detto tempo, e che vi resti un calor moderato; il che si conosce ponendo un dito nella terra; poichè senza tal precauzione correrebber rischio i semi di restar arsicci, ed abbruciati. Ivi seminano tutti li fiori di Primavera, ed Estate, che con felicità insolita venendo difesi dal freddo de' vapori, ch'esalano dal letame, e dalle brine da stuoje, con le quali vengon coperti la notte, crescono a maraviglia le piante, e si nutriscono abbondantemente. 2

336. Una simile industria ho io adoperata pure colle semenze autunnali; ma con maggior moderazione, per non apportar loro nocamento, e se ne ricavano due buoni vantaggi: ho fatto mettere un palmo alto di concime già fermentato, quando ha perduto il suo gran bollore, oppure un mese prima del tempo da seminare ho fatto mettere un palmo di concime recente, e sopra di quello un altro palmo di terra, adacquandola per quel mese, acciocchè il letame, fermentando coll'umido dell'acqua, sfogasse il suo primo fervore, e la terra de' suoi aliti grassi, e sulfurei s'imbevesse: i semi sopra questa terra seminati ricevono insieme fomento, per subito germogliare, e sostanzioso nutrimento per crescere più vigorosi, ch'è l'un vantaggio; e l'altro è, che scorsò un anno, o due, trovasi quel concime già distrutto, e ridotto in terra, la qual cavata dal fondo, e rimescolata con la primiera, di già sfruttata; farà un misto di terra fertile, forse più che la nuova, e ci risparmiano di rinnovarla. Questa medesima pratica ho usata parimente con le piante de' Ranuncoli, degli Anemoni, massime quando dovean piantarsi in luogo frigido, e meno esposto al Sole, e n'è stato buono, quale speravasi, il nutrimento.

337. Puossi dunque da una parte, come dicevamo; col primo riparo delle riferite industrie il pericolo precavere, di perdervi le semenze col seminar primaticcio; e per secondò riparo puossi ancor precavere il pericolo, con serbare una porzione di semi, da seminarla nel proprio suo tempo, quando la disavventura porti, che vada male la prima. Dall'altra parte sono bene importanti i vantaggi del seminar anticipato; certo è, che oltre all'aver fiori nella sua propria stagione da questa seconda semenza, seminata nel mezzano tempo, l'averli ancor preventivamente da quella prima, sia cosa molto utile, ed interessante, per tener fiorito il giardino più lungamente, ed eziandio in ogni tempo colle varie spezie de' fiori tra primaticci, e tardivi: ma vieppiù cresce il vantaggio dalla consolazion di veder presto, un anno prima, o quell'anno medesimo il frutto delle proprie fatiche, cioè di veder fiorire senza indugio molte almeno delle novelle piante, le quali senza tale anticipazione di tempo fiorirebbono nel second'anno, come sono Ranuncoli, Anemoni, Garofani &c. e talune nel terzo, e quarto, come i Giacinti, Tulipani &c. La noja di dover aspettare il fiore oltre ad un semestre, ha fatto trascurare a' Fioristi l'utilissimo traffico delle semenze; ma col seminar primaticcio noi godiam tanto presto del fiore delle piante novelle, quanto delle antiche fra il giro di pochi mesi.

338. V'è finalmente l'ultimo vantaggio, che le piante vengon sù più rigogliose, e riescono assai meglio condizionate sopra tutte le altre posteriori; sì perchè hanno maggior tempo per radicarsi, e crescere, sì perchè trovano meglio disposto il terreno, per darle un più convenevole nutrimento. La terra sulla fine dell'Inverno, e principio della Primavera trovasi più che mai ben impregnata di nitro, che la seconda, così sulla
fine

fine dell'Estate, e sul cominciare dell'Autunno trovafi ben cotta, e colma di zolfi, e ignicoli, che seconda la rendono, niente manco del nitro; e perciò ella è allora nella più vantaggiosa disposizione, da far meglio germogliare i semi, e ben nutrirli. Per tali ragioni consigliano gli Autori di Agricoltura, che la seminazione del frumento facciasi di buon' ora, quanto presto ci sia permesso: anzi da molti di loro al riferir del Sig. Barone Nicotia Par. 3, c. 30, consigliasi, che si semini prima delle piogge, perchè il seme si conserva nella terra, come se fosse nel magazzino, e al cader delle prime piogge, trovandosi la terra calda, vi s'eccita coll'umido dell'acqua la fermentazione, la qual macera prontamente il seme, e lo fa subito germogliare, e poi lo fa tanto sensibilmente crescere, che allor quando nasce, non che il serotino, ma il seminato per tempo dopo le prime piogge, quello già trovafi adulto, nè si lascia mai più arrivar dall'altro, e quel vantaggio, che innanzi tratto prese una volta, conservalo fino alla messe, e rende più copioso il frutto, sebbene alcuna disgrazia non lo colpisca. Così ho sentito dire di un Gentiluomo peritissimo di Agricoltura, che seminava il grano prima della caduta delle piogge, ove la qualità del tempo lo permetteva per lo notabil vantaggio, che ne ritraeva. Però ne' terreni nostri di Sicilia, che son comunemente forti, e densi, bisogna aspettar le prime piogge per ammolir le dure glebe; ma in terreno fresco, sciolto, e leggero, il qual si lasci fendere dall'aratro, ne stimo ben vantaggiosa la pratica, bensì convien caricare un poco più la mano nello spargere la semenza per quella porzion, che ne furan gli uccelli, e le formicole, ed acciocchè non venga derubata, convien tutta diligentemente coprirla di terra, e quindi uopo è replicatamente nettare, e ripulire quel terreno di tutte l'er-
be

Be cattive, che in tal sorta di seminato, più che in ogni altro, saran sicuramente per pullulare.

339. Almeno è sicuro, giusta il savio sentimento del Barone Nicotia, fondato sulla propria esperienza, e sull'autorità di Plinio, che non si deve tardare, un sol giorno di dar principio a seminare, quando si può, dacchè vi sono state lacque; mentre coll'esperienza si vede, dic' egli, che i campi prima seminati, sempre donano più grani di quelli seminati all'ultimo. E quantunque da Plinio riferiscasi lib. 18, c. 24: *Sunt qui properant, atque ita pronunciant, festinatam seminatam saepe decipere, serotinam semper*; in Sicilia però nemmeno si conosce la prima seminazione ingannarci, ma la tarda inganna sempre, come lo stesso Plinio nel medesimo luogo lo vieta, col dire, che di comun sentimento conviene, non seminare vicino all'Inverno, essendone grande argomento, che i semi vernerecci, se sono seminati prima del Verno, nascono in sette giorni, se dopo la bruma, che viene ne' giorni brevissimi dell'anno, appena in quaranta. *Inter omnes autem convenit, circa brumam sciendum non esse, magno argumento, quoniam hyberna semina, cum ante brumam facta sint, septimo die erumpant, si post brumam vix quadraginta*. Noi ogn'anno ne abbiamo esperienza ne' nostri fiori; dopo la nascita delle piante, ove alcuna ne manchi, che o non nacque, o appena nata morì, per decoro del giardino, e del buon ordine, ripiantiammo ne' spazj voti altre radici, ed altri bulbi, che a tal fine tenghiam di riserba; ma perchè in tanto entrato è già l'Inverno, perciò queste piante riescono quasi sempre notabilmente men prospero delle compagnie, che le precedettero nella nascita.

340. Intorno poi alla maniera di seminare i semi, stimano alcuni, che sia espediente di macerare i semi, cioè di tenerli infusi nell'acqua prima di seminarli; ed.

ed io col sentimento del Ferrari, del Clarici, e di più altri stimo cosa utile il farlo, e l'ho praticato con vero profitto: il profitto non è già, come taluno pensar potrebbe, che col macerare i semi, possano essi migliorar di condizione, come ben riflette il Clarici, ma è quell'altro, di farli nascere presto, e molto prima di quel tempo, che perderebbon, finchè a poco a poco possano macerarsi coll' mero umido della terra. Ci sono de' semi di dura corteccia, che resistono a schiudersi, come son que' de' Ranuncoli, i quali talora tardano a germinare fin' oltre le sei, e sette settimane; ed in tanto trasvò il più bel tempo, per crescere i germogli, e fortificarsi prima dell' Inverno; e per questi massimamente par necessaria la previa macerazione, acciocchè non perdano il vantaggio del primaticcio. Intorno al modo di farla, possono i semi tenersi nell' acqua pura infusi per dodici ore, ed i più contumaci per ore ventiquattro, o eziandio per due giorni: gli antichi Agricoltori gli maceravano con la morchia, e col nitro, sciolti nell'acqua, come riferisce Columella: *De re rust. L. II. c. 10 Priscis autem rusticis, nec minus Virgilio prius amurcà, vel nitro macerari, & ita seri placuit*. La morchia, cred'io, che serva, per ammorbidare, ed intenerire la scorza, e 'l nitro, per fecondare il corpo del seme, e farlo nascer più sollecito, e vigoroso: però io dubito, che l'olio della morchia possa far del male; perchè una volta, per farne qualche pruova, lavai nell'acqua uno straccio vecchio, molto ben inzuppato d'olio, e versai quell'acqua in alcuni vasi di Ranuncoli, ma le piante ne patiron tanto, che molte ne morirono, come abbruciate. Così Virgilio cantò di aver veduti degenerare i semi in cotai guisa medicati. *Georg. L. I.*

Semina vidi equidem multos medere ferentes.

Et nitro prius, & nigrâ persundere amurcà;

T. II.

K k

Gran-

Grandior ut fetus siliquis fallacibus esset.
Et quomodo igni exiguo properata maderent;
Vidi letitia diu, Et multo spectata labore
Degenerare tamen.

341. Sarà più sicuro, che mettasi nell'acqua il solo salnitro, il qual'è certo, che può giovare, ad agevolare la germinazione, ed è cosa provata, purchè la dose ne sia moderata, e potrà poi con quell'acqua medesima spruzzarsi la terra già seminata. Al riferir del Classici par. 2. c. 3. il celebre Malpighi nel Trattato della Vegetazione de' semi mostra pure altri modi di macerazione dicendo, avere sperimentato, che li macerati con lisciva, e calce nacquero in quattro giorni; li macerati nell'infusione d'Antimonio, e fuligine l'ottavo; quelli nel tartaro l'undecimo, il duodecimo quelli macerati nell'infusione di corno di Cervo; il vigesimo quarto quelli nel vino; ed il vent'ottesimo quelli nel Nitro. Il Lauenbergio L. 1. c. 17 loda l'acqua di calce colata, il che s'accorda col primo modo del Malpighi, e però l'acqua, ov'è stata spenta la calcina, par che sia la più sbrigativa; nè par, che possa nuocere ai semi; perchè ho sperienza, ch'essendo scorsa per accidente molt'acqua di calcina in un ajuolo di Ranuncoli, che stava vicina al luogo, ove quella spegnevasi, non solo non arrecò loro alcun detrimento, ma parvemi, che fosse riuscita di giovamento.

342. Disposte già dunque le semenze o colla macerazione, o senza di quella, le regole, che s'hanno ad osservar nel seminarle, son le seguenti. Primo si zappi, e svolga profondamente tutta la terra in tempo, che non sia o bagnata, o totalmente asciutta, ma semplicemente umidetta, allor quando al zapparla, tutta si spappolla, e stitola minutamente; perchè s'ella è bagnata di fresco, s'impasta, ed indura poi in zolle, impenetrabili alla tenerezza delle nascenti radici, co-

me si è avvertito; e s' ella è secca, occupa un minor luogo, di quel che occuperebbe, quando fosse umida: quindi, come già si è detto altrove, parlando de' segnali della buona terra, allorchè sarà bagnata, fermentando si gonfierà, e farà forza, per occupare un maggiore spazio; ma luogo non trovando ai lati ove dilatarsi, massime qualor sia ristretta ne' vasi, si costipereà in se medesima, e fatta densa, e dura, sarà mal a proposito per tutte le gentili piante, e vi patiranno, come violentemente affogate.

343. Zappata, e sciolta sottilmente, come farina, tutta la terra, già prima netta, e crivellata, se ne metta di canto un poco, la qual deve poi crivellarsi, e spargersi sopra i semi, per coprirli: tutta la superficie dell' aja si uguagli, e spiani diligentemente, acciocchè parte de' semi, se cadon nel basso, non vi restin sepolti: spargasi la semenza ugualmente per tutto, e più tosto rada, che spessa, avendo riguardo a quel che sarà poscia, quando diverrà più adulta, che avrà bisogno di più ampio spazio. S' ella è bambagliosa, e conglomerata, come quella degli Anemoni, per istaccare un grano dall' altro, e poterla spargere segregata, io pratico di mescolarvi terra polverosa, e poi fregandola fra l' una palma, e l' altra, vengono agevolmente i grani a separarsi dall' attacco scambievole, e così poscia la spargo, ed ella nasce per tutto ben distribuita. Sulla semenza o si crivelli, o spargasi ugualmente con la mano la suddetta terra posta da parte, oppure, come ancor uso io, senza sparger terra sopra i semi, con le punte di tutte le cinque dita della mano, vado leggermente grattando, e rimescolando tutta la superficie della terra, finchè i semi ne vengan coperti.

344. E qui avverto premurosamente, che sopra i semi di piccola mole non vi si metta più, che un tenuissimo velo di terra, quanto meno si potrà, per-

chè un tantino più di terra, che gli aggravi, l'opprime sì, che non nascono, e vi restan sepolti; cosa da me provatissima, e con ugual premura raccomandata dal Rajo *L. 1, cap. 18. Samnoperè cavendum, ne semina aliè demergantur, aut nimia terra obruantur, adeoque sine ulla resurrectionis spe sepeliantur.* Il P. d'Ardenne, mentre inculca il medesimo dogma, par che lo contradica, nel prescriber, che sopra i semi de' Rannuncoli mettafi un mezzo pollice di terra; ma noi qui proviamo, che un mezzo pollice l'opprimerebbe, come più d'una volta mi è succeduto con questa stessa semenza, con quella de' Garofani, e con altre piccole semenzine: basta, e soverchia una sola linea d'altezza di terra, cioè una sesta parte di mezzo pollice, e col di più si sta a pericolo; che o non germogli li sotto, ove le viene impedito il respiro dell'aria, che ha di bisogno, ovvero il piccolo, e tenero germoglio non ha tanta forza da sollevar con seco la molta terra, che gli sovrasta; e però come un parto, che non può venire a luce, lì dentro si corrompe.

345. L'istruzion, che ci dà la Natura per lo seminare, è molto semplice, ma debb' ella essere la più savia: lascia essa cadere i semi senz' altro riguardo sulla nuda terra, nè prendesi altra briga di coprirli, se non se quando per mero accidente o i venti, o le piogge, o i piedi degli animali, vi portin sopra qualche poco di terra, ma quanto poco per ordinario? e la maggior parte se ne rimangono scoperti; per questo però non germogliano, e non veston di mille piante la superficie della Campagna? Tale ha data indole ai semi, ch' eziandio scoperti all' aria, possano pur germinare; ma l'arte tanto è buona, quanto agevola le condotte della Natura, senza però mai scostarsi dalla sua imitazione: se non copriamo i semi, il vento le porta via, e gli animali se li depredano, e di più

più bisognerebbe aspettar tal ora lungamente, per vederli nascere, finchè arrivi altra provvidenza, ordinata dalla stessa Natura, per tali semenze esposte all'aere, per le quali ha saviamente ordinata la continuazion delle pioggie per uno, e per più giorni, o per intere settimane non interrotte, o anche per mesi frequentemente replicate; acciocchè colla continuazion del molle i noccioli quantunque duri ne vengano penetrati, e schiudansi per germogliare. Questa perdita di tempo, ed i suddetti inconvenienti noi ripariamo col tener coperte le semenze, e con tener umida la superficie della terra, ma se molta terra vi carichiam di sopra, noi ci scostiamo dall'imitazion della Natura, e dalla sua retta guida, e l'arte nostra in vece di agevolare le semenze alla nascita, potrebbe apprestar loro la sepoltura.

346. Finalmente la coltura propria de' semi comincia dall'innaffiarli la prima volta, subito che si sono seminati: deesi far ciò con arte, adagio, e pian piano con man gentile, guardandosi di versar l'acqua coa impeto tutta ad un tempo, e tutta in un luogo, movendo sempre la mano; perchè sconcerterebbe i semi dal suo sito, seco strascinandoli, e sconvolgerebbe la terra, e di soffice, e morbida, ch'ella era, la calcherebbe, e addenserebbe tanto, che i semi ne potrebbero restar soffocati. Quest' avvertenza è sempre necessaria nell'adacquare le piante, ma è più necessaria per le semenze, ed è poi importantissima più che mai in ogni primo inaffiamento: allora la terra, zappata di fresco, mentre sene sta larga, e sollevata sopra di se, ad ogni piccolo urto sen cala giù; e l'acqua, se sia in copia, che scorra, seco la strascina, e col suo peso la calca; ciò che non avviene così facilmente di poi, quando la superficie della terra più volte leggermente bagnata fa crosta, e si affoda. O

voi

ne. Quindi in poi potrà darglisi qualche ora di Sole, e col progresso di tempo qualche ora di più, ed una mezza giornata, seppur non lo vietò il clima, o la stagione, quando ancor calda si mantenga. Serve finalmente questa coperta per una qualche difesa contra gl' insulti, che potrebbero farvi i Cani, e Gatti, i quali ove non veggan la terra morbida, ne cavata di fresco, mentre sta coperta, sogliono astenersi dallo scavarla, come fanno per mal' abito, mettendo tutto il colto a scompiglio; benchè a questo disordine prescriveremo altro più sodo riparo, di rami d' alberi, di spine, o di canne legate a graticcio, che lor impediscano più sicuramente l' accesso, e lo scavamento.

348. Nati che saranno i semi, ed alquanto sollevati, spargetevi sopra un pochino di terra, o colla mano, o col crivello, la qual servirà, per rincalzarli al piede, ma non sia tanto, che gli aggravi, e cuopra, potendosene aggiugner dell' altra, se sia duopo, in appresso, quando saran più cresciuti. Nasceranno insieme coi buoni semi molte erbe cattive, le quali bisognerà svelle di mano in mano; che anderan nascendo; perchè se tarderete a svellele, dopo che avran propagate le radici, strapperete insieme le piante elette, o le smoverete dal proprio sito, e romperansi molte delle lor capillari radicette con detrimento. Che se avrete trascurato di torle nascenti, e poi sien già grandi, ed abbarbicate, per evitare il danno, che ne può seguire, allor quando s' hanno a svelle, non dovrà esser la terra nè troppo secca, nè troppo bagnata, ma di una mediocre temperatura, come si disse meglio a suo luogo.

349. Altre spezie di coteste novelle piante debbono piantarsi per necessità, e son tutte quelle, che dentro sei mesi, o in un anno crescono alla sua perfe-

ta maturità, e dopo d'aver dati fiori, e semi, sem-
muojono con tutta la lor radice: a costesse, poichè han-
no da crescer molto, fa duopo assegnare un terreno
più spazioso di quel, che occupano là insieme nati,
e folti nel seminario; e poichè son destinate ad abbel-
lire il giardino, e son da disporfi da per tutto con
buon ordine, e simetria, non si può fare a meno di
non trapiantarle. L'operazione, essendo da se vio-
lenta, per ordinario incomoda grandemente la pianta,
e talora riesce micidiale, e però bisognerà eseguirla
con diligenza, e destrezza, per non maltrattarla, e
per non romperle le radici, massime la principale, che
i nostri Villani chiamano il chiodo, la qual va dirit-
ta dal tronco a profundarsi giù basso più di tutte le
altre; ma l'arte di far ciò, sarà insegnata, ove si
tratterà in generale del trasportamento.

320. Tutte le altre spezie, delle quali non siavi pre-
cisa necessità di levarle dal primo suol natio, vi si la-
scino stare, che sarà cosa più utile, avendo io repli-
catamente provato, che sebbene sienvi alcune spezie,
alle quali non nuoce troppo il trapiantarle, quali so-
no i Garofani, le Rose, &c. pur sempre qualche cosa vi
patiscono, e se non fosse per lo bisogno, che v'è ta-
lora, di doverle cambiar la terra, quand'è sfruttata,
o di doverle allargare, quando sien troppo spesse, non
vi si perderebbe niente; a lasciarle star sempre chete
nel proprio sito: però a molte altre spezie, come so-
no Ranuncoli, Anemoni, Ciapi (Sicil. Ambrette) &c.
la mutazione del sito riesce sensibilmente svantaggio-
sa rispetto ai compagni, che no'l mutarono, come
ho per isperienza; e però per tali spezie convien pre-
venire il disordine, qualor si potrà, seminandole ben
larghe, acciocchè non ci arrivi la necessità di doverle
poscia trapiantare. Questo è quanto appartenfi alla
coltura particolare delle semenze, ed in tutto il ri-

manente ella è conforme alla coltura generale d'ogni pianta, e alla particolare della propria specie, di cui è la semenza;

C A P O XXV.

*Quistione Fisica intorno all' influsso de'
Pianeti sulle Piante, e sul cor-
po degli Animali.*

351. **V**engo alla seconda quistione; che si è lasciata qui a discutere separatamente, cioè se nel tempo del seminare; e così ancora del piantare, potare, e di altre tali rusticane faccende, debbasi aver riguardo ai varj aspetti de' Pianeti, e principalmente della Luna. Tutta la venerabile Antichità con seco molti autorevoli Moderni dice di sì, e vuol che rigorosamente si osservino le Fasi Lunari, e chi una, e chi un'altra ne assegna, e preferisce per lo buon punto da seminare, piantare, &c. però la stessa varietà, e discordia de' lor sentimenti, in assegnare il presupposto tempo propizio, o disfavorevole, fa ben vedere l' insuffistenza di un canone, presso di lor sì sacrosanto.

352. Palladio con la più comune opinione vuol che tutti universalmente i semi si mettano a terra nel crescer della Luna, ed in giorni tepidi: *Lib. 1, Tit. 6: Omnia quæ seruntur, crescente Luna, & diebus tepidis sunt ferenda*: ma il Laurembèrgio *L. 1, C. 7* sostiene, che il moltiplicar, e 'l far riuscire i fiori di rara bellezza; grandemente dipenda dal seminarli nel punto del Plenilunio. Altri Periti in quest' arte al riferir del P. Ferrari *L. 3, C. 1*, presso il quale potrà
T. II. L I leg-

eggerfi la varietà delle sentenze, tengon, che i bulbi, ed ogni sorta di radici, debbano piantarsi a Luna crescente, e per contrario i semi a Luna mancante. Di poi esso, e dietro a lui il Clarici, stando persuasi del buono, e del cattivo influir della Luna, spaccian come cosa eziandio sperimentata, che il segreto di far fortire fiori ottimi, e doppi dalle sementi sia nel seminarle quattro giorni avanti, o quattro dopo il Plenilunio; ed il Clarici accennando certe opposte sperienze de' Franzesi, che riferirò, attesta di se, di averne avuto favorevole sperimento. Può ben essere, (son le sue parole) *Par. 2, C. 2*, che l'esperienze fatte da loro in Francia, per cause a noi ignote, sieno loro riuscite nella forma, che ci asseriscono. Ma qui tra noi è succeduto ben altrimenti: potend'io dire con verità, che particolarmente negli erbaggi, e ne' fiori, che nascon di seme, tengo sperimenti contrari; ciò ch'anco è avvenuto ad amici, che n'hanno voluto far pruova; o se bene non mi persuado, che ciò sia provenuto per occulta virtù della Luna, vorrei però credere, che la Luna abbia influito in esse piante maggiore, o minore umidità, come vuole il Tanara, *Econom. del Cittad. in Villa L. 7*, o in quella forma, che c' insegna Girolamo Fracastoro nel Capo 4. de' Giorni Critici. Il Montanari già nostro celebre Professore ce n'insegna pure una nobile sua ragione &c.

353. A due riduconsi coteste lor ragioni, o più tosto due son le maniere, assegnate dagli Autori più antichi, come può la Luna influire su i semi, e sulle piante: ma i Filosofi odierni v'hanno aggiunta la terza molto meglio acconcia di quelle due. Dicono quelli, che la Luna, quand'è più luminosa, produce co' raggi suoi qualche calore, e però la notte va ella somministrando alle piante qualche piccol fomento si-

no al nuovo arrivo del Sole. Dicono altresì, ch' ella influisca con non so qual suo umido, e sua frigidità, ciò che altri spiegano con la carenza del suddetto calore, quand' ella manca di lume, ed altri senza spiegare a sufficienza, ond' ella sia umida, e fredda in queste, e non in quelle Fasi, col freddo, e coll' umido la fan sulle piante cose mirabili operare. Ma i Moderni ricorron più tosto alla variazione della gravità, che la Luna induce colla sua presenza in tutt' i corpi sublunari. Nè lor mancano esempj d' altri notabili effetti, che la Luna cagiona quaggiù, da' quali costa, ch' ella sù i corpi sublunari potentemente influisca: le Maree, il flusso, e riflusso del Mare, poichè van d' accordo col moto, e colle fasi della Luna, pruovano il predominio, che tien ella sopra le acque del mare, che tutte agita, e smuove. Di più de' venti, e delle piogge, e di tutta l' Atmosfera, dell'aria, i di cui cambiamenti corrispondon frequentemente alle fasi Lunari, non sembra essa pure la principal moderatrice? Così sul corpo degli animali ci si rendono evidentemente sensibili le sue influenze: gli Epilettici, che patiscono il morbo comiziale, non istan soggetti al poter della Luna? detti perciò Lunatici, perchè a Luna nuova sorprendeli periodicamente il pernizioso parossismo: ed i Granchi, ed i Ricci, e le Ostreche, e tutt' i marini Testacei, perchè son pieni, e pingui, più che mai nel plenilunio? lo son per lo benefico influsso, che la Luna in tal tempo lor somministra; e però qual difficoltà speciale pe' semi, e pelle piante un simile influsso può far negare?

354. Confesso, che i riferiti esempj, quando fosser veri, concilierebbon tutto il credito al controverso influir della Luna sù i corpi vegetabili; ma pur io non me l' persuado, e l' ho per vano con molti eruditi Moderni, saggiamente più critici, e l' ho alme-

no per poco , o niente a noi sensibile ; e se sia pur sensibile , dico , che non costa tutt' ora il suo determinato effetto , come e quando giovi , e nuoca alle piante , ed ai semi , pur mancanza di alcun sodo , e bastevole sperimento : l' istesso intendo , e con maggior ragione dell' influsso , tutto ideale , delle Stelle , e degli altri minori Pianeti , (eccetto il Sole , del qual si sa , ch' è come l' anima di questo basso Mondo , avviandolo col suo possente calore ;) ed a provarne l' assunto vo discorrendo così .

355. Tre sole maniere veggiam noi , colle quali par , che possano gli astri in sulla Terra influire : una è co' raggi del lume , il qual fanno pervenir quà giù fin delle lor distanze lontanissime , come son quelle de' Pianeti , e molto più delle Stelle , affatto immense . L' influsso del lume si sa , ch' egli è di riscaldare , rarefare , e dar pabolo ai vegetabili di particelle ignee ; ed è certo del Sole , che influisce coi raggi suoi sulla Terra , e sopra tutt' i Pianeti , e v' influisce insignemente , e la quantità dell' influsso è secondo la quantità , e densità de' raggi . Ma il lume degli altri Pianeti è quel medesimo , che ricevon essi dal Sole , e che riflettono a noi per la loro opacità ; ma è sì raro , e debole , che vano è lo sperarne alcun sensibile influsso di riscaldare , rarefare , e dar pabolo ai Vegetanti : al solo delicatissimo senso dell' occhio si rend' esso percettibile frà le tenebre della notte , ma è così scarso , che presente il Sole ci scompare .

356. Il lume poi della Luna , benchè paja sì chiaro , quand' ella è piena , in assenza del Sole , pure raccolto in gran copia nel punto del foco di un ampio specchio astorio , qual' è il Vilettiano , o Ischinnauiano , per pruova fattane , non ha potuto dar segno minimo d' alcun calore , o di minima rarefazione in un termometro mobilissimo , che vi fu esposto . Il
die

diametro di quello specchio è di 43 pollici Parigini; e quindi ne viene l'ampiezza sua circolare di 1453 pollici quadrati, ed i raggi Lunari, che occupavano tutto questo spazio, riducevanfi nel foco alla strettezza di un cerchietto di mezzo pollice di diametro, cioè, fatto il computo, i raggi riducevanfi a densità 7396 volte maggiore di quella, che prima avean da se nella sua rarità naturale. Or se'l lume Lunare, così addensato; uguagliato avesse l'intensione dell'ordinario calor solare; per poter esso uguagliare il calore, e gli effetti di un solo giorno di Sole, vi abbisognerebbon di Luna piena giorni 7396. Ma se lo specchio stato fosse cento volte più ampio, e cento, tanti fosse stato più denso del punto del foco il lume Lunare, appena forse, e senza forse pervenuto farebbe all'intensità del solito calor Solare, e però, a far l'effetto di un giorno di Sole, appena basterebbono 739600 giorni di Luna piena, e quindi ne siegue indubitamente, che, debbono essere del tutto insensibili, da non farne caso veruno nell'Agricoltura, gli effetti del lume della Luna per riscaldare, rarefare, e somministrare ignicoli alle piante per nutrimento. Una sol ora di più, che splenda, sgombro di nuvole il gran Pianeta, farà un maggior calore, ed un maggior effetto nei vegetabili, che non più, e più anni di non interrotto Plenilunio. Ora può darsi mai credito alla fallace osservazione, che qui cava fuori il Clarici? Io tengo osservato, che nell'Estate, e nelle notti più corte la terra de' vasi si ritrova la mattina allo spuntar del Sole, aver conservato più calore nel tempo del Plenilunio, che quando la Luna è sotterra. Sarà stata la calma, o il vento caldo, e non la presenza della Luna, che il calor conservava; nè Vilettio, nè Ischinhaus, nè il Sig. de la Hire, nè l'Accademia Medicea, nè alcun altro, con ispecchi usfori di vasta ampiezza han potuto mai
pro-

provare nel lume della Luna minimo indizio di calore; e però non occorre sopra tal calore andar più oltre fantasticando.

557. La seconda maniera, come par, che influir possano i Pianeti sopra la Terra, può fondarsi sull'opinione, da me sostenuta nella dissertazione prima de' *Lumine*, e provata con sode ragioni, e sperienze, cioè costando i raggi del lume di particole di puro, e vivo fuoco, velocissimamente vibrare dal corpo luminoso; posson esse agevolmente far tutto ciò, che il fuoco fa; cioè incider, e minutamente disciorre la texture de' corpi, e dar moto, e trasportar con seco rapidissimamente, e lontanissimo le particelle più sottili, staccate dai corpi stessi, onde viene il lume, sia diretto, o sia riflesso. La realtà del trasporto ho io fatto vedere ocularmente nel fumo chiuso dentro un vaso di vetro, all'orifizio del quale applicata sta una lente istoria, il fumo vedesi cacciato giù per lo cono radiofo con moto violento, e verso il punto del fuoco, ove son più densi i raggi, va più rapido, e accelerato. Ed io medesimo ivi asserisco, che di tali particole staccate dalla Terra, dai Pianeti, e dalle Stelle, trasportate dall'impeto del lume, n'è sparsa raramente tutta la vastità del Cielo; sinchè di poi le stesse particole, perduto l'impeto di fuggire, insievolito dalla lor nativa gravità, cominciano a far ritorno in ver quel centro di gravità, che più potentemente per la vicinanza, o per la maggior efficacia delle forze attracenti, a se l'invita, e così finalmente ricadon esse, fra lor condensate, a maniera di fortissima pioggia, altre nella nostr' Atmosfera, ed altre ne' Pianeti, ond' eran partice, ma per la maggior parte nel Sole, che più fortemente di tutt'insieme i Pianeti a se li attrae: siccome vanno a restar nella vasta Solare Atmosfera le medesime particole raccolte dalle Comete nel lunghissimo lor viaggio.

gio, mentre vengon dalle più remote parti del Cielo, a compiere il lor giro intorno al Sole, dal calor del quale sciolte in fumo dette particole, son esse, che forman delle Comete la coda: questa se va sempre dietro, opposta al Sole, ciò avvien senza fallo, perchè quel fumo siegue l'impulso, e la direzion de' raggi Solari, potenti a spingerlo dietro, ed a portarlo seco lontanissimo, per quanto stendesi visibilmente, (e più oltre ancora) la lunghezza della coda, talora enorme. Le medesime particole planetarie, sparse per la vastità del Cielo, di notte i raggi del Sole a noi riflettendo, son esse, che ci fan vedere il tenue lume Zodiacale, benchè da noi distantissimo, scoperto la prima volta dal dotto P. Francesco Noel l'anno 1684. *Obscrv. Mathem. & Phys. in India, & China factis*; e poscia veduto dal Sig. Mairan, e colle sue dette osservazioni illustrato. Siccome ancora raccolte le medesime particole più vicine alla Terra, e condensate dal freddo nelle regioni Polari, colla scambievole fermentazione, si accendono in Aurore Boreali, e si risolvono in quel lume stesso, che fin allora seco aderenti, e raminghe per lo Cielo le avea portate.

358. Or ecco la maniera come può influir la Luna in sulla Terra, o anche possono gli altri Pianeti, benchè da noi assai più lontani; poichè col lume riflesso, che ci vien di là, possono in un venire le sottilissime particole di qualche fluido, che colà rispegga, o che che altro sia, staccato di là con impeto, e sino a noi vibrato dalle ignee particole del lume, e da esse medesime accompagnato. Ma quest' altro influsso quantunque vero, patisce la stessa difficoltà del primo, anzi maggiore, dovendo esser molto più scorsò, e raro di quel, che non è il lume della Luna, e de' Pianeti; perchè dal lume Solare, rifles-

flesso dai Pianeti, debbe sottrarsi la maggior parte; che a noi viene in forma di puro lume, e piccola debb' essere la parte residua, la qual ne viene inclusa, o aderente alle particole planetarie in forma di tenuissimo effluvio caldo, ma non sensibile, nè luminoso; come più diffusamente spiegasi nella citata Dissertazione. E però se il lume con tutta la sua poderosa attività di purissimo fuoco, qual esso è, produr non può effetto, che sia sensibile; molto meno lo produrranno quei pochi effluvj tenuissimi, che sono un fuoco impuro, e misto colle particole planetarie, che seco porta, le quali non par, che possano avere attività maggior di quella, che ha il puro fuoco, anzi debbono averla molto minore.

La terza maniera dell'influire può esser quella della scambievole gravità, la qual si esercita realmente fra i Pianeti, e la Terra. Che i Pianeti sieno globi totali, e che in essi dia si la gravità, come in Terra, e che la gravità nella Luna, la qual dirige i corpi al di lei centro, stenda la sua forza molto lontano sino a tirare a se l'aria gravitante sulla Terra, e con ciò il peso ne diminuisca, fu il primo ad insegnarlo il chiarissimo P. Onorato Fabri, gran Filosofo, e Mettematico: e così spiega egli il mirabile fenomeno del flusso, riflusso, e movimenti del Mare, che van d'accordo coi movimenti della Luna; poichè al passaggio della Luna l'aria, che le sta più vicina, e immediatamente soggetta, rivolta in ver del centro della Luna la sua gravità, e così viene a diminuir di peso l'aria sovrastante al Mare; e però levato dell'aria, e delle acque l'equilibrio, il Mare direttamente soggetto alla Luna sollevasi sopra il suo consueto livello, e quindi ha origine la marea. Questa dottrina più diligentemente coltivata dal celebre Newton, fu estesa più ampiamente alla gravitazione scambievole, che

che chiama egli attrazione, fra la Terra, e i Pianeti, e fra un Pianeta, e l'altro, e fra tutti generalmente i corpi dell' Universo; la qual mutua gravitazione viene oggidì ammessa, ed approvata universalmente da tutti, ed io l'ho sostenuta in una mia dissertazione Geografica: *De dimensione, Et figura Telluris. Ubi etiam de inaequali gravitate in diversis Regionibus. Panormi 1758.*

359. Or benchè sia vero, verissimo quest' altro influo de' Pianeti, che or affievoliscono, ed or avvanzano colle vicendevoli attrazioni de' corpi terrestri la gravità; pure attesa la lor molta lontananza n' è così debbole l'azione, ch' essa non rendesi mai sensibile, per quanto so io, con verun altro sperimento, eccetto che col moto delle marine acque, e dell' Atmosfera dell' aere, che vi sovrasta; perciocchè le acque, e l'aria son fluidi da se mobilissimi, nè posson mai star cheti, se non se nel perfetto equilibrio; e ogn' uno sa, che qualsivisia forza, comechè minima, basta a levar via l'equilibrio, e a dar moto a qualunque gran massa di fluido, quand' ella sia perfettamente equilibrata. Quindi può ben la Luna colla sua mera presenza sull' Orizzonte influir sul Mare, e sull' Atmosfera, con sottrgliervi l' equilibrio, ed in Mare causar le maree, e nell' aria eccitar del moto, e concorrere con le altre terrene cause, a suscitare i venti, e i venti poscia tirar posson dietro a se or le piogge, or la siccità. Di più come le maree crescono nel Novilunio, e Plenilunio, e negli Equinozi, e mancano in altri tempi per lo concorso delle forze attraenti del Sole, ora conspiranti, ed or contrarie a quelle della Luna, secondo i siti combinati di ambedue i Pianeti, come diffusamente spiegasi nella Fisica; così debbono esser pur varj ne' medesimi tempi, e nelle differenti fasi della Luna i movimenti dell' aere, *P. II.* M m e gli

e gli effetti cagionati nell' Atmosfera dalla varia combinazione de' siti, e delle forze attrattive dell' uno, e dell' altro Pianeta. Quindi son io propenso a creder, che le alterazioni nell' Atmosfera, i venti, le piogge, e le mutazioni del tempo, hanno qualche vera connessione con le diverse fasi Lunari, ma non già tutta la dipendenza; perchè tali effetti dipendono altresì dal concorso fortuito di più altre cause terrestri, delle quali, perchè non si sa, quando, e come concorrono colle loro azioni, perciò gli effetti non sono stabili, e determinati, come quello della marea, e quindi delle mutazioni del tempo, per prevederle, non può cavarfi cosa di sodo dalle fasi della Luna, eccetto che qualche indizio congetturale, che s'abbia per via d'osservazioni, e frequente induzione.

360. Oltre i divisati due effetti, che può cagionar la Luna nelle acque del Mare, e nell' Aere dell' Atmosfera, non ci costa di alcun altro effetto sensibile, che le si possa fondatamente attribuire, nè si conosce, come possa mai cosa di bene, o di male operare nel corpo del seme, e della pianta quel poco di aumento, o scemamento di peso, che può ella nel corpo istesso, e nell' aria intorno cagionare. Quel minor peso, che fa sopra de' corpi l' aria dell' Atmosfera, mentre soffiano i venti umidi, e Australi, e l' maggior peso, che fa, quando spirano i venti secchi, e Boreali, rendesi potentissimo col moto del Mercurio, che scende, o sale per più gradi, e per più pollici nel Barometro; il quale aumento, o decremento di peso, non è mica minore di quel, che può causare la Luna con tutt' insieme i Pianeti, come meglio soggiugnerò: e però se questi alcuna cosa giovar mai potessero alla buona riuscita delle piante, e de' loro semi, molto maggiormente giovar dovrebbero i venti succennati, che seco portano altre buone doti; e però più tosto

la qualità de' venti, non già le fasi Lunari, nè la posizione de' Pianeti, osservar dovrebbero gli Agricoltori.

361. Del resto diamo, che siano sensibili, e capaci di produrre alcun effetto notabile i divisati tre influssi Planetarj; dimando io come si sà, che producano il tal, e tal' altro effetto ne' Vegetabili, buono in tal circostanza, ed in tal' altra reo? Dovrebbe ciò costare, o per ragione, o per isperienza, la qual sola ci basterebbe. E primamente qual ragione ci può mai persuadere, che un tantino più, o manco di gravità nel corpo della pianta, o del seme, e ne' corpi circostanti, nell'acqua, nell'aria, e nella terra, tenga virtù, e possanza di far concepire, e sviluppare nel già conceputo seme, una pianta ora doppia, ed ora scempia, ora bene, ora mal condizionata? Qual connessione hanno mai fra se quella causa con questo effetto? nessuna ne comparisce. Così dicasi degli effluvj Lunari, e Planetarj, e del insensibil calore, che dar possono i Pianeti, i quali quando anche arrivassero a far qualche sensibilità, faranno altri effetti, e non questo; seppur la ragione, la qual sin' ora non apparisce, o la sperienza, della quale ora parleremo non ce 'l dimostrano.

362. L'opinione dell' influsso de' Pianeti sulle piante essendo tanto universale, e tanto antica, senza cercar altro, si dovrebbe presumere radicata nella comune sperienza, ma qui stà il male, che posta seriamente al cimento della pruova con tutte le dovute cautele, di punto in bianco si mostra vana, e fallisce. Direm noi dunque, che tanti grand' Uomini, e spertissimi nella Agricoltura, antichi, e moderni, si sono ingannati, ed hanno spacciata per vera, e tanto premurosamente han sempre raccomandata l' osservanza degli aspetti Lunari, e Planetarj senz' averne

avuta mai alcuna sperienza di Macrobio, Plinio, Varone, Palladio, Virgilio, Columella, Lucrezio, Cardano, e mille altri di gran nome, hanno promulgata una sì folle impostura? e Cicerone medesimo sì saggio, e critico nel giudicare, restò anch' egli ingannato, ed inganna, quando scrisse *L. 2. De Nat. Deor. Multa a Luna manant, & fluunt, quibus & animales alantur, auferantque, & pubescant, maturitatemque assequantur, quæ oriuntur a Terra?* Non par certamente cosa da dirsi; ma pur cento pruove mostrano, che si sono ingannati, nè la lor opinione, porè mai esser fondata sopra sudi sperimenti, ma sopra vane, e volgari dicerie: così mostrano le odierne sperienze, a comprovare un tal punto seriamente intraprese.

363. Dietro tanti altri autorevolissimi sperimentatori, ne ho fatto io ancora le mie pruove: ho seminato, e piantato sempre in ogni varia differenza di tempo, allor quando mi tornava meglio in acconcio, ma non ho avuto mai il merito di veder, che la Luna guardasse di buon occhio, e con qualche sensibile specialità favorisse i miei semi, e le mie Piante, poste sotterra nel Plenilunio, sebbene ella poi nemmeno mi ha fatto il torto, di guardarli a sbieco, quando sono stati piantati nel Novilunio, o in altre varie fasi. Ella meco si è diportata con tutta l'indifferenza, come se per me non ci fosse stata, ed ho sempre ricevuto il bene, d' onde l' ho sperato, e l' male d' onde l' ho temuto, cioè dalla buona, o cattiva qualità de' semi, delle radici, de' bulbi, del terreno, del sito, della stagione, e della coltura.

364. Il P. Pietro Ferreri Palermitano spertissimo fiorista credeva, di aver saputo finalmente il tanto ricercato, secreto di far riuscire i Ranuncoli, gli Anemoni, e tutt' altri fiori belli, e doppi, confidatogli da

da un Giardiniere Genovese; ed era questo appunto di seminare i semi ne' giorni intorno al Plenilunio, e già egli tenea pronte le sue semenze, per farne prova. Per torlo di errore, gli diedi delle mie semenze, preparate col vero secreto delle polveri, con proporgli, che seminasse le sue nel Plenilunio, e le mie nell' avverso Novilunio, o in altro qualunque tempo d' inimica costellazione, come fatto avrei pur io di tutte le mie, che dovea seminare. Egli però, che stava persuasissimo del suo secreto, il qual trovava confermato dal Ferrari, e dal Clarici, e restava pure convinto della verità del mio, di cui ne avea veduto l' esito de' nobili Fiori, che men' eran sortiti quel primo anno, che era venuto in Palermo, non volle arrischiare nè le mie, nè le sue, ma per tenersi al sicuro, tutte a Luna piena le seminò; ed io tutte all' opposto a Luna scema, e logora. Ma pur le sue proprie non avendo profittato niente col secreto del Plenilunio, non riusciron cosa migliore del solito, ed i Fiori ne sortiron quasi tutti scempi; però le dagli da me, e le dame seminate, riuscirono di quella maravigliosa bontà, che si è riferita, nè alcuna sensibile varietà v' intervenne tra i seminati da lui, e i seminati da me nelle due fasi opposte.

355. Degli altri, che parlano col sodo linguaggio di propria, e lunga sperienza, sia il primo il nostro Sig. Barone Nicotia, il quale suol fondare, e confermare i dogmi dell' Agricoltura colle sue medesime osservazioni: dic' egli *par. 3. C. 30.* *2.* Ne' si deve considerare perverun conto l' età della Luna, se cresce, o manca . . . e del continuo pur si vede coll' esperienza, di non farsi più vigorosi i seminati, quando cresce la Luna; di quelli seminati nello sminuire della medesima; quantunque molti autori gravi così comandassero, i quali preoccupati da que-

sta opinione , senza esame la scrissero per vera ? I Francesi impegnati per i vantaggi dell' Agricoltura , sono stati molti , che han tentate tutte le vie , e tutte le maniere diverse , per accertarsi della verità , o falsità dell' influsso Lunare , e alla pruova l' hanno sperimentato pur sempre insufficiente . Il P. d' Ardenne ne apporta molte testimonianze dalla pagina 48 sino all' 81 , ed è da udirsi quella del Sig. de la Quintinie : Io protesto di buona fede , che nel corso di più di trent' anni sono stato applicatissimo , per iscoprire il vero , se tutte le Lunazioni debbano essere di qualche considerazione nell' Agricoltura , per seguirne esattamente l' uso , ch' io truovo stabilito , quando mi fosse paruto buono ; ma finalmente tutto ciò , che ne ho appreso colle mie osservazioni lunghe , e frequenti , esatte , e sincere , è stato , che tali discorsi non sono altro , che vecchie dicerie di Giardinieri mal esperti , per mettere a coperto la loro ignoranza intorno ai principali punti dell' Agricoltura &c. Seminate , e piantate ogni sorte di semi , o di piante in qualunque quarto della Luna ; io vi assicuro di un successo eguale delle vostre sementi , e delle vostre piante , se le vostre sementi non sieno punto difettose , e che la stagione non vi si opponga . Apporta il testimonio di Rohault , il quale allega il costante sperimento di più di 25 anni , durante il qual tempo andò egli sempre più disingannandosi intorno alle pretese influenze : *Tratt. Phys. Tom. 2, p. 2, c. 27 art. 15.* così sostiene *le Jardinier solitaire* , la di cui probità non è punto sospetta , nè il sapere dubbioso , che tutte le sue sperienze sono concorse , a levargli la prevezione dell' utilità , d' osservare lo stato della Luna nell' arte della coltura , ed in particolare per lo troncar degli alberi : *par. 2. c. 3.*

366. L' istesso d' Ardene, lasciando d' accumular più altre testimonianze, soggiugne la sua, ben meritevole di riferirsi. Preoccupato già egli prima dall' opinion comune, in tutte le sue operazioni campestri consultava sempre il Calendario, per sapere i diversi aspetti della Luna, e con quelli solea regolarsi; ma poscia messo in dubbio dalla lettura di buoni autori moderni, s' impegnò a mettere in chiaro questo punto, con farne diligente inquisizione. „Io, dice egli, la cominciai a fare, e l' ho regolatamente continuata per lo tratto di parecchi anni, scrivendo senza interruzione, e colla data del giorno, tutte le operazioni, che si facevano sotto ai miei occhi alla Campagna: io notava pure alla margine le variazioni un poco considerabili di ciascuna stagione, per poter dipoi comparare con più aggristatezza gli anni cogli anni, ed i mesi coi mesi. Questo confronto d' osservazioni, da me fatte con molta esattezza, mi è sembrato egualmente sempre dimostrare, che i differenti esiti de' lavori aveano tutt' altre diverse ragioni, che le pretese influenze della Luna. I suoi medesimi Partigiani, quando hanno esaminate le cose senza preoccupazione, son convenuti a confessare la verità, e l' poco fondamento di coteste opinioni, secondo le quali in alcune Provincie del Reame fassi a Luna novella ciò, che in Linguadoca, ed in Provenza non si fa, che a Luna provetta, benchè l' intenzione sia per tutto la medesima. I Giardinieri d' Avignone, e di Nimes, benchè sotto il medesimo clima, non son d' accordo fra di loro, facendo gli uni con buon augurio in una Luna quel medesimo, che gli altri fanno in un' altra &c. „

367. L' ultimo testimonio sia il Sig. Pluche colle sue savie riflessioni. *Tom. 2. Dial. 6. 2* Prior: Vorrei, che la coltura delle piante fossi in certo modo

non simile al vero culto della pietà, cioè a dire scer-
 vra affatto da vani scrupoli, e spogliata d'ogni vi-
 tuperevole superstizione. Ma oh deplorabile cecità! fiam
 più che mai, ostinati a prestar fede agl' influssi della
 Luna, e de' Pianeti sopra la coltivazione de' campi,
 e degli ortali. Si osserva tuttavia fedelmente l'uso
 di non seminare, e di non piantare, o tagliare alcun
 albero a Luna scema. Si guardano a tale oggetto alcu-
 ni giorni determinati, la cognizione di queste in-
 quiete osservanze è sovente il maggior forte, che ab-
 biano certi nostri, più tosto ciarlatani, che giardi-
 nieri. E pure la falsità di tutte le loro vane super-
 stizioni si va ad ora ad ora manifestando per mil-
 le, e mille sperienze, la cui mercè dovrebbono i giar-
 dinieri ora mai discredersi, e disingannarsi. Ma quan-
 do una pianta fa buona pruova, si ringalluzzano den-
 tro se stessi, per avere scelto a piantarla, quel pun-
 to di Luna, cui truovan segnato nel loro Taccuino.
 E se mai la medesima pianta seminata, o posta da un
 suo vicino in un tempo tutto diverso, fa riuscita,
 miglior della loro, dan subito la colpa al terreno,
 all'aria, od a' venti; nè in questo so condannarli: ma
 non posso tollerare, che prosieguaio tuttavia a ido-
 latrare la Luna.

Cont. Questa medesima, ed istessissima osserva-
 zione mi fece ultimamente vedere in una sua Lette-
 ra Monsù Normand direttore, e ingegnere degli Or-
 ti, e Verzieri di sua Maestà. Egli s' espresse in que-
 sti precisi termini, che tuttavia tengo a memoria: che
 di mille sperienze da lui già fatte con ogni esattez-
 za per molti, e molti anni intorno a ciascuna ope-
 razione, attenente alla Coltura delle Pianta, non n'avea
 trovata men una, la qual favorisse la scrupolosa
 suggezione, che si prendevano i nostri predecessori,
 di badare a' varj aspetti della Luna. L'autorità d'un

uomo si accredita to in tal genere, ed il quale oltre le cognizioni più singolari, ed oltre al gusto più raffinato, ha un'esperienza già consumata, e perfetta, mi fa più impressione, e più forza di quante chiacchier: van facendo cent' altri faccenti, che la spacciano da maestri. Questo pure era il sentimento di Monsiù de la Quintiniè suo predecessore, il quale solea dire, non esservi cosa più insulsa, che perdersi ad osservare il giorno della Luna, quando si vuol porre, o tagliare una pianta; doverfi ben fare ogni cosa nella sua stagione, sceglier, per quanto si può, il tempo propizio, ed aspettarne successivamente il buon esito, non dal giorno, che si è prescelto, ma dalle influenze del Sole, e dalle disposizioni dell' aria, e dell' atmosfera.

Cav. Se l' influsso del Sole, e de' Venti è tanto chiaro, perchè ostinarsi ad attribuire tanti effetti alla Luna, la di cui attività non si fa, nè sentire, nè osservare?

Prior. Ella è una prevenzione derivata da nostri Progenitori, ed una vera reliquia dell' antica idolatria. I primi uomini, che regolarono dopo il diluvio, si servirono d' un mezzo comodissimo, ed esposto agli occhi del mondo tutto, con assestare le varie parti del medesimo anno alle faccende di ciascheduna Stagione. Prefer di mira le facce della Luna: e siccome ricorrevano sempre a questo pianeta, per fissare il tempo delle loro faccende, così s' introdusse a poco a poco questa falsa opinione, che la Luna influisse nelle loro operazioni. Quindi attribuendo alla medesima nuove virtù, a misura, ch' ella s' andava avanzando verso la quindicesima, la gente cominciò a persuadersi, che le semenze gettate sopra la terra a Luna crescente, ed a Luna piena, acquistassero maggior vigore; e quelle all' incontro, che si seminavano a Luna scema, venissero men rigogliose, partecipando l' une, e l' altre

T. II.

N n

del

della pretesa robustezza, o fiacchezza della medesima Luna. E siccome verso il pieno della Luna fu più volte osservato, che i Granchi, e l'Ostreche son ben grassate, e ben nutrite, così si suppose, che la Luna piena contribuisse alla loro grassezza: onde poi è noto un proverbio, o una regola, che la sperienza ha mille volte smentita, ma sempre in vano.

368. Lascio il rimanente, che soggiugne l'Autore contra l'influenza delle Stelle; perchè può ben ognuno veder da sé, che se noi è noi sensibile sulle piante l'influsso della Luna, la qual ci sta vicinissima rispetto agli altri Pianeti, e Stelle; come potrà mai quella influenza tanto più lontana effetto sensibile fra noi produrre? ma pur la malizia, o la sciocchezza di certi Astrologi impossori ha preteso di persuadere agli sciocchi però lor pari, che dall'aspetto de' Pianeti, e delle Stelle dipenda tutto il bene, e tutto il male, che c'interviene.

369. Ma dirà qui taluno, non sarà vero almeno, che la Luna operi col suo influsso sul corpo degli animali? poichè si sa per sicuro del Mal Caduco, e di parecchi altri parossismi, che van di concerto col periodo Lunare; e si sa pure indubitatamente, che i Ricci, Granchi, e Testacei marini crescano, e mancano di pienezza, col crescer, e mancar della Luna, e grassiti trovansi a Luna piena, e magri a Luna nuova. Dico prima, che non ho io impegno qui per l'esclusione di quest'altro influsso, potendo ben essere per avventura, che al corpo degli animali, alquanto più delicatamente organizzato, che non è il corpo ruvido dalle piante, divenga sensibile talora il tenue movimento, che può eccitare ne' loro fluidi più spiritosi quel picciolo moto di condensazione, o dilatazione, che la Luna eccita nell'Atmosfera dell'aere coll'aumento, o decremento della gravità, che vi cagiona. Dico di poi, che

che ancor quest'altro influsso dai più sensati Moderni è sostenuto per insussistente.

370. Evvi però fra i Moderni il Sig. Ricardo Mead Medico Inglese della Regia Società, il quale nel suo libro *Opera Medica*, e nel primo degli Opuscoli, *De imperio Solis, ac Luna in corpora humana*, sostiene l'opinione, che la Luna, e 'l Sole colla predetta variazione di gravità, la quale inducono nell'aria dell'Atmosfera, possono, e debbano fare su'l corpo umano della impressione molto sensibile; e che le possano fare, pruovolo egli, con dimostrar, quant'ella è notabile la quantità del peso, che or s'aggiugne, ed or togliesi all'aria, siccome in conseguenza la quantità della sua restrizione con aumento di elasticità, e della sua dilatazione con decremento della medesima elasticità. Quindi giudica egli, che tal variazione di peso, e di densità nell'ambiente dell'aria, che ci sta intorno, possa ben fare degli effetti sensibili di altrettanta dilatazione, o restrizione ne' fluidi almeno più tenui, e spiritosi dell'animale, e poi di là venirne i parossismi, ed altri simili effetti; come appunto l'Epilessia, e gli altri morbi, che diconsi seguire il corso della Luna, e sua radice tengono nel sangue, nel sugo de' nervi, e negli spiriti vitali, ne' quali giuoca maggiormente l'elasticità. Che poi per tal mezzo i due gran Pianeti facciano effettivamente la detta impressione, lo prova egli con la sua, e con molte altre testimonianze di autorevoli Medici, i quali hanno trovata un esatta corrispondenza di periodo colle fasi Lunari in molti generi di morbi, e sopra tutto nel morbo Comiziale, del qual patiscono gli Epilettici, detti perciò Lunatici comunemente, per la costante osservazione, che a Luna nuova, e a Luna piena sogliono particolarmente venir sorpresi dal mal Caduco.

361. Io non userei contradire alla sua, e all'altrui autorità, se altri valenti Medici, ed osservatori lor

pari non attestassero il contrario ne' loro libri, e così anche a bocca questi nostri Medici da me consultati. Sopra il discredito, in cui debbono essere universalmente tutti gl' influssi Lunari, è degno da leggerli l' erudito Libro del Sig. D. D. Giuseppe di Gregorio, e Russo, perito Professor di Medicina di questa Città &c. intitolato: *Dissertazioni Critico fisiche delle varie osservazioni della Luna intorno a Salassi, e alle Purghe in cui trattasi dell' Epilessie, Crisi, e Purghe mestruali: in oltre di alcuni animali, pesci, piante, pietre, ed altre cose diverse, per nulla dipendenti da movimenti di Luna. In Palermo 1742.* e qui vi potranno leggerli alcuni gravi Autori, che avendo istituito serio esame sull' asserita corrispondenza tra il periodo della Luna, e quel dei predetti parossismi, vi han trovata la discrepanza. Attesa la frequenza delle Fasi Lunari di sette in sette giorni, facil cosa è, che chi vive preoccupato dall' opinion dell' influsso, cotanto antica, e divulgata, a virtù della Luna attribuisca la concorrenza meramente accidentale, che talora può dare dell' uno, e dell' altro periodo; siccome quando poi fortifica, che il male prevenga la Luna, o la posponga per qualche giorno, o eziandio per più giorni, allora mai non manca la scusa di qualche altra indisposizione nel Paziente, la qual contribuisca ad accelerare, o ritardare il periodo del parossismo. Ci vorrebbero delle osservazioni ben costanti, e per lungo tempo continuate, ad accreditar sugli animali la controversa sensibilità del Lunare influsso. Perocchè contra di essa ugualmente milita l' argomento già fatto contra l' influsso su i corpi de' vegetabili; cioè che la variazione del peso nell' Atmosfera dell' aere, e'l cambiamento della sua rarità, e densità succede quotidianamente colla mutazion de' venti, e colle continue vicende or del caldo, che l' aria rerefa, ed or del freddo, che la condensa, come mostrano i Barometri, ed i Termometri; ma pure non

Veggonsi succedere in tal tempo tai parossismi, nè van d' accordo con le dette mutazioni.

372. Ed acciocchè non dicasi, la variazion della gravità, e della dilatazion dell' aria proveniente dalla qualità de' venti, e dalla temperie del calore, o del freddo, esser molto minore di quella variazione, che inducon la Luna, e'l Sole colla lor presenza; soggiungo l' occorso appunto in questi giorni. Mentre di queste cose scrivo, il Mercurio nel Barometro trovassi elevato ad un altezza straordinaria, tanto che la differenza di questa presente alla sua minima altezza, quando scende alla maggior bassezza, è di circa due pollici, e mezzo Parigini, cioè l' undecima parte in circa di tutta l' altezza sua ordinaria; la qual nel tubo Torricelliano importerebbe la differenza di tre piedi in circa d' altezza d' acqua. Or avvenga, che il Mercurio, o l' acqua scendano nel suo tubo alla minor altezza per un vento australe, che sia caldissimo, come suol essere frequentemente in Palermo, sarà l'aria doppiamente rarefatta, così per la minoranza del peso, corrispondente a tre piedi d'acqua, o due pollici, e mezzo di Mercurio, come ancora, ma di gran lunga più, per l' eccessivo calor del vento, che l'aria estremamente dilata, e con ciò verrà eziandio superata tutta la dilatazion, che posson indurre la Luna, e'l Sole; perocchè secondo il calcolo del Nevvton la minoranza del peso, che posson fare questi due Pianeti insieme nell' Equatore, dove può avvenir la massima, non è più di dieci piedi, e mezzo d' acqua; ma ne' nostri Climi di quà dai Tropici ella è considerabilmente minore, e qual avendone dimandato ai nostri Barcajuoli, i quali osservan per tutto l'anno i movimenti delle acque, dicon essi, che'l lor sollevamento non è mai più di tre palmi nelle più alte maree. Non è dunque mi-
no.

nore lo scemamento del peso , e la dilatazion dell'aria , che si fa intorno a' nostri corpi colla frequente mutazion de' venti , e dell' ambiente , ora caldo , ed ora freddo , anzi debb' ella più tosto esser maggiore di quella leggerezza , e dilatazione , che posson cagionarvi la Luna , e 'l Sole colle loro unite attrazioni ; e però i parossismi sudetti dovrebbero succedere ancor più vigorosi nel caso da noi proposto , e dovrebbe aversene continua esperienza , e farsene costante quella induzione , la qual sin' ora non abbiam mai avuta .

373. Rimane a dir del Fenomeno de' Testacei marini , autenticato dalla comun voce , e da mille gravissimi Autori , tra i quali è Macobrio nel 7. de' Saturnali , e lo stesso Aristotele , il qual supponendolo come vero , e indubitato , nel libro 4. delle Parti degli Animali , ne dà la spiegazione , e nega , che la ragione , per cui sono i Testacei più pingui nel Plenilunio , sia perchè in tal tempo pascansi più copiosamente , ma intende , che contribuisca più tosto alla lor pinguedine il tepore , del qual godono tai frigidì animali , eccitato dalla maggior copia del lume a Luna piena *Et : pleniluniis uberius , & non quia per id tempus copiosius pascantur , ut quidam putant , sed quod nubes tepidiores sunt propter lucem pleniorum : calorem enim desiderant , quoniam frigori patent*. Però a questa ragione del calor Lunare già ti è risposto , che non ha ella verun fondamento di minima probabilità ; e quando si volesse dar credito al Fenomeno , meglio direbbesi , che i Testacei uopo abbian di lume , per veder la preda , onde si nutriscono ; e però a Luna piena , mangiando essi ancor di notte , sien più grassi ; ed a Luna nuova , mancando di lume sien costretti la notte a star digiuni . Ma la scrupolosa critica d' oggi di non ammettere a chius'occhi tutto quel , che spaccia il volgo , ancorchè autorizzato dall' antichità , quando non regga all' esame della sperienza , come avviene nel nostro caso ,

374. Anch' io stava nella medesima falsa supposizione per quel, che sempre ne avea udito dire, che i Ricci, le Ostreche, e sien pieni a Luna piena, e vori a Luna scema; ma poscia più volte notato ayendo, che falliva, ed era incerta, e discordante la pienezza loro colla pienezza della Luna, per averne più sicura notizia, ne chiesi a due differenti Pescatori, i quali vivono con tal sorta di pesca, e li van vendendo per la Città; ed entrambi negarono esser vera tal corrispondenza di tempo, e soggiunsero, che la grassezza, o magrezza di cotesti animali non dipendeva dalla Luna, ma più tosto dalle circostanze di Stagione ora propizia, ed ora contraria, e da copia, o scarsezza di nutrimento, o d'astro, che lor non sapeffero. Quando dimandasi ai periti dell' arte, non si ha più che fare, e val più il lor detto, che non tutta l' autorità di un Aristotele, intorno a questo particolare male informato. Sopra ciò si è già riferito più avanti il sentimento del Sig. Pluche, ove conchiude, che dalla falsa persuasione del volgo n'è poi nato un proverbio, o una regola, che la speranza ha mille volte smentita, ma sempre in vano. La stessa speranza ha fatto nascere in Italia un proverbio contrario, che mostra falso il supposto Fenomeno. Che ha da far la Luna co' Granchi? è notato dalla Crusca alla parola Granchio. Ancor qui potrà leggerfi la Dissertazione 3. del lodato Sig. di Gregorio, il qual dice, d' esser stato anch' egli osservatore. Ancora io provando, e riprovando, n' ho fatta speranza in ispezialità su d' un cibo, che tanto mi aggrada, de' Ricci di mare, e col calendario a cintola più delle volte ho ritrovate le loro sostanze secche, e vote, anche in faccia d' una pienissima Luna: e cita di più come autorevoli testimonj di prova Garmanno, Antonio le Grand, Cirilli, Roaulto &c. Ma già detto è a sufficienza contra tutte universalmente le vane osservanze degli aspetti della Luna, de' Pianeti

minori, e delle Stelle, per la proposta risoluzione della quistione, e però ne torno alla continuazion della coltura.

C A P O XXVI.

Propagazion delle piante col plantar di ramo, collo sbranarle, colle Propaggini, o Margotte, e cogl' Innesti.

375. **D**Opo che si è trattato della prima, e principal maniera da propagar le piante, per via delle lor semenze, saran materia del presente Capo le varie altre maniere, che sono in uso per propagarle. Coll' uso di queste altre ottenghiamo due gran vantaggi, cioè uno, che possiam conservare in perpetuo, e moltiplicar quelle razze, che ci son riuscite una volta buone dalle semenze; l'altro è, che queste tali maniere son più compendiose, giacchè il moltiplico della pianta ci rendono prontamente con tutto il suo fiore o nell' anno medesimo, o sempre men tardi, che le semenze.

376. Come la Natura tien preparati i primi rudimenti della pianta nel guscio de' semi, così li tien preparati nel boceiuolo di ciascuna gemma; e però intorno alle gemme aggiransi le altre maniere, da moltiplicar le piante, poichè staccate dal ceppo materno, possono svilupparfi, e crescere in tante altre novelle piante. Alcune spezie di vegetabili producon sotterra, nella radice, o nel bulbo, o nel tubero cotali gemme, disposte a crescere, e moltiplicarsi; altre spezie le producono nel tronco, e nei rami, ed altre in entrambe le parti, sopra, e sotto terra. Quelle, che sotterra le pro-

producono, sogliono esser le più facili ad appigliarsi, o perchè hanno già messe fuora le radici, o perchè al metterle hanno una maggior disposizione, dall' esser già imparentate colla terra, ove son nate. Ella è questa la prima maniera, da propagar le piante: strappansi dal ceppo materno tutti que' germogli, che vi si producono intorno, cioè le barbatelle, o polloncinini, già forniti di barboline, le cipollette attaccate al bulbo; gli occhi, che saltan fuora dal tubero; come negli Anemoni, e le radichette, che si truovano annesse alla radice, e talora staccate come ne' Ranuncoli. Alcune spezie di bulbi sono in altra maniera mirabilmente prolifiche, e soglion esser gli scagliosi, composti di scaglie, a guisa di carciofo; qual' è la Cipolla di alcuni Gigli; ogni scaglia, che vi si strappa, piantata si trasmuta in bulbetto, il qual produce la sua piantarella, e poi ingrossato cogli anni produce i fiori; ed io l' ho praticato con riuscita in qualche Giglio Martagone.

377. E' però da avvertire, che nello strappar dalle madri le scaglie, i bulbettini, gli occhi, le radici, i piantoncelli, e tutto ciò, che la ferisce, sarà utile medicarne la piaga coll' impiastro della tremantina per certe piante più delicate; e sarà nocevole lo strapparne in tanta quantità, ch' ella ne resti malconcia dalle molte piaghe; ed o ne muoja, o per la debolezza non dia quell' anno il fiore. Perciò tali separazioni di germogli fanno sì dalle madri più robuste, e si fa lor bene a sgravarle dalla molta prole, che l' opprimerebbe, lasciando lor solamente la prole più tenera, la qual meglio si nutrisce alle poppe della madre, e va poi a rischio di perire spopata immaturamente.

378. Per quelle piante, le quali non producon la prole, che nel tronco, e ne' rami, ha saputo l'uma-

no ingegno trovar più maniere, per moltiplicarle, e riduconsi a quattro: 1. sene staccano i rami, e piantansi, per forzarli a produr le radici. 2. sbranasì la intera pianta in più parti; cosicchè se ne staccchino i rami, ciascuno con seco portando una parte di tronco, e di radice. 3. de' rami si fan propaggini, o margotte; ciò che farsi coricando, e coprendo di terra i rami, così come stanno attaccati alla Madre, acciocchè da quella sostenuti, producan più sicuramente le radiche. Se non si fa altro, che questo, di cesi propaggine, e propagginare; ma se al ramo coricato si faccia un mezzo taglio, acciocchè di là cacci fuora più agevolmente le barbe, chiamsi margotta, e margottare. 4. finalmente propagansi le piante per via d'Innesto, detto altrimenti Incalmo, collo staccar del tronco o le gemme, o i forcoli, inserendoli poi desframente sopra altra pianta salvatica, o men buona. Di tutte queste maniere andèremo insegnando la pratica, acciocchè riescano profitevoli eziandio a tutta l'Agricoltura.

349. Nel piantar di ramo debbon osservarsi le seguenti regole: il ramo sia vegeto, e novello di un sol anno, o due, o se sia tratto dal pedale, e non dalle braccia, con più facilità sarà per abbarbicarsi; e ciò avverrà con più sicurezza, se il ramo sia staccato dalla madre con squarcio più tosto, che con taglio di ferro; ma pure quando sia necessario adoperare il ferro, non sia la sega, ovvero dopo aver segato, si lasci con ascia, o seure tutto il piano del taglio, perchè l'aggrito della sega riscalda, ed abbrucia la parte segata, onde hanno da pullular le radici. Ancora qui la piaga deve medicarsi coll' impiastro, come sia detto di sopra, a fin d'impedire, che l'umor nativo non sen' esca per quella parte, nè vi entri l'estraneo, che può putrefare il ramo. Questo poi sia
ba-

bastantemente lungo, acciocchè possa ripiegarsi, non dovendosi mettere diritto in terra, ma incurvato, ed incurvato a guisa d'arco, di modo che la parte infima del taglio resti sepolta sì, ma pur guardi la superficie della terra, la curvatura stia nel fondo del fosso, e la cima ne venga su con due o tre gemme delle più sane, che restino scoperte sulla superficie del terreno. Pullulano le radici da tutta la curvatura, e si è provato, che i rami curvati si appigliano con maggior sicurezza. Se ne può dar per ragione, che la violenta curvatura forza, e restringe le fibre dalla parte concava del legno; onde l'umor che fa forza per iscorrere, trovando intoppo sbocca dalla parte convessa, ove le fibre son dilatate, o anche infrante, e quivi formando va le radici, le quali come ho io più volte osservato, nascendo dal legno, o tra il legno, e la corteccia, più facilmente spuntano dall' adito aperto nella corteccia, che dilatasi, o fende colla violenta piegatura del ramo. Il tempo da far tal piantagione sarà sulla fine d' Inverno, o principio di Primavera meglio, che di Autunno; perchè nel primo del tempo l'umor de' vegetabili mettesi in moto, e le piante son più disposte a germinare.

389. Il Signor Lignon famoso Botanico della Maestà di Luigi il Grande trovò una buona maniera, per far metter radice ai rami. Ito egli alla Guadalupa nell' America, per far raccolta di piante esotiche, e trasportarle nell' Orto Regio di Parigi, pensò di procurar la radice ai rami, con tenerli solamente infusi nell'acqua. Ne tentò la prima pruova con una verga di Granato nano, grossa quanto una penna da scrivere, la qual tenne in una ampolla di vetro esposta al Sole per più settimane, spesso mutandole l'acqua, ed in tempo caldo anche ogni giorno, per non corrom-

romperfi. A capo di sei settimane si accorse, che già spuntava il primo fietto d'una radice, e allora cominciò egli a spargervi sopra qualche pizzico di terra polverizzata, per darle alimento più sodo, e dopo due giorni vide nata la seconda, ed alli diegi, o dodici giorni, essendo le due radice notabilmente cresciute, cominciarono le gemme ad ingrossare, e presto si svilupparon le foglie. Quindi piantò in buona terra il nascente arboscello, e vi crebbe, e riuscì, come ogn'altro, prosperissimo. Per assicurarsi via più di quella nuova maniera, reiterò le sperienze con altre piante, tutte, com'egli afferma, riuscite con felicità. Voll'io provarla co' polloncelli de' Garofani, per tentar se più facilmente producessero le barboline nell'acqua, che nella terra, o almeno se in tutti i tempi, eziandio nell'està, le producessero, ciò che sarebbe qualche vantaggio; e trovar, che riesce ancor nell'està, ma come farò per riferir nella coltura de' Garofani, è cosa noiosa, per più di un mese, o anche due, mutar l'acqua ogni giorno, com'è necessario, e poi ricavarne raro qualche uno, che metta la radica. Quindi par, che per questa pianta, ch'è sì disposta a corrompersi col troppo umido, non sia guari a proposito una tal maniera, e sia utile propriamente con ramo d'alberi, o arbusti, o di altre piante di legno più sodo.

381. Il secondo mezzo da moltiplicar le piante, ch'è lo sbranamento, è poco usato, e a non pochi arriva nuovo; ma io pure l'ho per uno de' buoni mezzi, quando sia usato colle piante terragnole, colle quali ne ho certa sperienza, e l'ho provato co' Garofani molto proficuo, come a suo luogo riferirò; sebben cogli alberi, e arbusti di tronco alto, parmi, che possa incontrarsi qualche giusta difficoltà. Si stacca una mezza pianta dall'altra metà, e quindi s'et-

la

la n' è capace, si sparte con nuova divisione in quattro, ed in più parti, per quanto lo permetta la robustezza del tronco, e la foltezza delle radici; dovendosi dare, come sopra ho accennato, ad ogni braccio diviso una competente porzione di tronco, e di radici, altrimenti per la troppo avidità del moltiplico, si va a rischio di perdere il tutto, o la maggior parte. Con ugual premura avverto, che la pianta, su di cui farsi tal cruda operazione, sia nuova, e ben vegeta, perchè nella vecchia, se sia debole, e nella nuova, se sia infermiccia, il taglio riesca molesto, se non ancora micidiale. Se potrà farsi con meno squarcio, senza adoperar ferro, sarà meglio fatta l'operazione, ed ove debba farsi con taglio, valetevi di coltello ben affilato, e di lama sottile, acciocchè il taglio riesca più agevole, e ne patisca meno la pianta.

382. Non ho usato io, d'applicare impiastro alla ferita, per timore di non impedir la nascita delle nuove radici, che può farsi da quella banda; ma pure pensò, che sia meglio medicarla; sì perchè appena mai dopo un anno vi ho trovate radici nuove, nate di là, e sì perchè facilmente vi potran nascere, forzando quella tenue litura, che l'umido facilmente stacca. Uso io bensì nel piantar cotesti membri recisi, di seppellire il tronco tutto, per coprire di terra il taglio, acciocchè non ne svapori l'umore, ma copertolo coll' impiastro, non è più necessario, di seppellir tutto il tronco, essendo incomodo il farlo, quando sia lungo: e per questa difficoltà della lunghezza del tronco, e forse ancor per qualche altra, che può mostrar la speranza, dubito della buona riuscita di cotesto sbranamento, applicato agli alberi. Tutto questo si vedrà da me praticato nei Garofani con prospera riuscita, e col vantaggio, che
da

da ciascuno di que' membri recisi si ottengono i fiori in quell'anno medesimo poco men, che in quel numero, che prodotti ne avrebbe l'intera pianta.

383. Il panico timore, che hanno alcuni, di non perder le più degne piante, (e par loro di perderle, e farla da parricidi) collo smembrarle, fa perder loro il moltiplico, forse più copioso, e più sicuro d'ogn' altro: ma correggano la falsa apprensione colla sodezza della ragione. Smembriamo noi i rami, ed i polloncelli, e piantati si abbarbicano; or quanto più facilmente debbonsi appigliar cotesti membri, recisi sì, ma insieme forniti di radiche, quante lor necessitano, per sostentarsi? La sicurezza, che non muojano, dipende da due condizioni; la prima è, che le porzioni non sieno troppo sottili, e mancanti di radiche; la seconda è, che sieno trattati delicatamente, come infermi, per tutto quell'anno, oppure come se fosser rami, e polloncelli privi di radiche; e però lo smembramento dee farsi dopo già rinfrescata la stagione, nel fine di Autunno, nell'Inverno, e nel principio della Primavera, e non deono star esposti al Sole, che per qualche ora nel primo mese, sebbene poi possano arrischiarsi di mano in mano ad un maggior calore. Di più, perchè in un anno la pianta non si fortifica bastantemente per farvi sopra delle operazioni, ch' esiggon gagliardia, non dovranno farsi sopra di essa nè margotte, nè nuovi sbramenti in quell'anno, per non metterla a pericolo di perire, come ho provato, riserbandosi a farli dopo due anni, quando sia divenuta più gagliarda. Osservate queste due condizioni, posso attestare ai timidi sulla propria speranza, che lo sbranare riesce più sicuro, che 'l piantar di ramo, e dovrebbe quello niente meno di questo mettersi in uso.

384. Venghiamo alla terza maniera del moltiplicare,

co, ch' è il propaggiare, o margottare: fassi co' rami più vegeti, e novelli di un anno, i quali sieno bastante-
mente lunghi, e pieghevoli, affinchè non vengano mol-
to a patire nell' incurvali sotterra, comecchè non sia
mortale qualche squarciatura tollerabile, che ne succe-
da. Per la comodità di far le Propaggini, e le Mar-
gotte, oggi si fanno in molto uso le gratte di bocca
larga, perchè altrimenti non vi saria spazio bastevole,
per coricare i rami. Per tenerli fermi nel fosso, scavata
quivi accanto al pedale della pianta, si conficca in terro
una forcella, o rampino di legno, o canna, che li trat-
tenga, e il fosso scavasi profondo, quanto lo richiegga
la qualità della pianta, piccolo, s'ella è umile, e gran-
de, s'ella è d'alta statura. Gli si levano i rami, e le
foglie superflue, e vi si mozza la cima, lasciando-
vi due o tre occhi, i quali calato il ramo, ed incur-
vato nel fosso, deono restar fuori, per germogliare.

385. Le semplici propaggini tardan più lungo tem-
po, che le margotte, a metter radici; ma è sicuro,
che se metteran nella Primavera, o al più tardi do-
po un anno, quando le margotte le mettono dopo
due, o tre mesi, però il taglio in queste, che apre
l'adito facile alla nascita delle radiche, talora l'apre
alla corruzione, che l'uccide. In quelle spezie di pian-
te, che non son da se difficili ad abbarbicarsi, pos-
siam prevalerci delle Propaggini, ma pelle difficili,
sarà più espediente, valerci delle Margotte. Si fa
un mezzo taglio, e meno ancora della metà, nella
parte incurvata, che va giù nel fondo del fosso, quan-
to si potrà più vicino al tronco, e fassi obliquo, a
taglio di penna da scrivere, benchè taluno lo fa per-
pendicolare al braccio. Ma ho io sperienza di un
taglio più sicuro, cioè con la punta di un sottil tem-
perino spaccasi nel mezzo il legno, perforandolo da
banda a banda con una spaccatura, sufficientemente

lunga , quanto possa inserirvisi una scheggia di legno , canna , o pietra , o altro , che non corrompasi , la qual tenga ben separate le due metà del legno , e ne impedisca la riunione , acciocchè la piaga non si cicatrizzi , dovendovi restar aperto l' adito alla nascita delle radiche ; la quale scheggia vuole mettersi ancora per lo fine medesimo negli altri due generi di tagli . In tal guisa si sta sicuro , che la Margotta non può morire ; perchè resta congiunta alla madre dall' una , e dall' altra banda della fenditura , quasi come prima se ne stava , e se tarderà forse alquanto più a produrre le barboline , pure le produrrà sicuramente , comè ho provato .

386. Posson le Propaggini , e le Margotte farsi anche in altro vaso vicino , quando il braccio sia lungo , e posson farsi sopra terra , o eziandio in aria sollevate , come più distesamente farem per dire nella coltura de' Garofani , ne' quali sono usatissime . Il tempo da farle ne' Garofani , giusta la comune pratica , è il mese di Luglio , cioè immediatamente dopo che sfioriscono , e posson continuarsi nell' Autunno , perchè allora col caldo , che le aiuta , credesi , che si abbarbichino con maggior prestezza ; ma ho provato , che posson farsi in tutt' i tempi , eccettuato il tempo della fioritura : così dico delle altre piante , in molte delle quali soglion farsi nell' Inverno , o Primavera ; ma le fatte nell' Està , bisogna , che tengansi da principio in luogo fresco , e poi le si vada dando sole , ed acqua , per farle prescia a germogliare . Quando si vedrà , che la Propaggine , o Margotta vada crescendo , e spiegando le sue gemme , e le sue foglie , potrà presumersi , che sia ella fornita di barboline , e però scavando destramente la terra intorno , che la ricuopre , si osserverà , s' ella realmente siasi abbarbicata ; ed allora potrà troncarsi , e
fiac.

staccarsi dalla madre, per piantarsi altrove; ciò che dee farsi già rinfrescata la stagione nell'Autunno, o nel Verno, o nella Primavera, quando sarà il tempo proprio, da trapiantar quella sorte di pianta. Che se ancora non avrà messe radici, si tardi ancor più; e se il taglio della Margotta siasi rammarginato, come talora succede, si riapra, e tornisi a coprirlo di terra, finchè faccia il suo debito.

387. Resta la quarta, ed ultima maniera di propagar le piante coll' Innesto; invenzione veramente maravigliosa; di far comparire sopra una pianta selvatica, e mal condizionata fiori, e frutta di pianta gentile, e di ottima condizione: anzi è arrivato il capriccio degli Agricoltori coll' uso, o più tosto abuso di quest' arte, sino a violentar la Natura, forzandola a produrre su d'una pianta fiori, e frutta di un'altra non sol diversa di specie, ma pur di genere del tutto disparata. La natura però suol riluttare alle violenze, e raro è il caso, che riescano tal' innesti, e non mai rendon frutto di sapor grato: quindi è regola universale, che l'innestamento facciasi tra le piante dello stesso genere, sol differenti di specie. In poche specie di piante a fiore può usarsi l'innesto, perchè non può farsi, che sulle piante legnose, delle quali poche ne abbiain di fior riguardevole: ma per quelle che sono, metterem qu' tutte le maniere da innestare, fin' ora inventate, per servirvene più utilmente alla moltiplicazion delle piante fruttifere. Quasi tutte le ha raccolte il Sig. Pluche, ed una, che ve ne manca, sarà da noi soggiunta.

388. La prima maniera, che chiamasi l'Innesto a forca, e da' Giardinieri a stesa, a pendulo &c in scil. a Brocca, consiste nell'inserir sopra il legno del selvatico un forcolo, o sia una verghella, detta Cal-

nella, Vermena &c. d'altra pianta domestica. Per ciò fare, si scapizzano tutte le rami del Selvatico, e fra tutte scelgonsi le più giovani, le men nodose, e le più lisce di scorza; vi si fa il taglio orizzontale, ben piano, e liscio: quindi si spaccia in mezzo, tanto e non più, quanto vi si possa inserir la verghella: questa sia liscia, e novella d'un anno, ed abbia tre gemme almeno, che sien feconde: nella sua estremità inferiore tagliasi a scalpello dall'una, e dall'altra banda sino ad incontrar la midolla, la qual non debb'essere offesa, e subito s'inserisce nella spaccatura già preparata, una sola, se la rama del selvatico è sottile, e s'ella è grossetta, se ne inserisce una seconda dall'altra banda opposta: se poi sia tanto sottile, giusto quanto è la calmella da inserirsi, vi si adatta bene, e corrisponda scorza con scorza da entrambe le bande, che riuscirà ottimo l'incalmo. Ma se l'tronco per la sua grossezza sia capace d'essere spaccato in croce con due fenditure, potranno inserirvisi quattro calmelle alle quattro estremità, ed allora chiamasi Innesto a croce. Quindi si rammargina la fenditura con pezzetti di scorza incrociati, acciocchè nulla vi possa entrare: poscia si distende in queste scorze un impiastro di cera, e pece, o trementina, ovvero una poltiglia di creta, e sieno impastate insieme, e finalmente la testa del tronco tutta quanta si fascia con una pezza di lino, e con funicelle tutt'intorno strettamente si lega.

389. La seconda maniera diceasi Innesto a scalpello, o a calteritura dallo scalpello, intaccare, calterire, o incidere, che si fa nella corteccia, e nel legno de' grossi tronchi: cioè si scava con bulino, o scalpello una calteritura, o sia incisura in sulla scorza, e si profonda nel legno tanto, che possa incastarvisi la vermena domestica, l'estremità della quale

tagliasi in tal modo, che possa empier con esattezza il vacuo dello scalfitto, e poi vi si adatta, calcandola con forza, per incastarla. Ancora qui si medica coll'impiaastro la ferita, e cuopresi, e fasciasi, come detto si è sopra, il cucuzzolo del tronco.

390. In queste due sorti d'innesto, nel incassar la calmella nella spaccatura, o incisura, sopra tutto conviene badare, che la sua scorza corrisponda esattamente alla scorza del tronco, altrimenti non si potranno legare insieme: imperocchè, come osservasi nelle Transazioni Anglicane, la prima lega, ed unione dell'incalmo non si può far ne tra legno, e legno, ch'è già come osso duro, ed incallito, nè tra l'una, e l'altra parte legnosa, e dura del cortice, ma solamente, almeno da principio, è capace di attaccarsi la tenera cuticola, interposta fra il legno, e la scorza, cioè quella pellicola, analoga al Periostio, che si fra-mezza fra l'osso, e la carne degli animali. Ella fu detta *Libro* dai Latini, e di là n'è venuto il nome di Libro; perchè queste cartilagini, tratte dagli alberi, furon la prima carta, in cui scrivean gli Antichi. Or ella è composta di varie delicatissime spoglie attaccate l'una sull'altra, e l'intima spoglia, che tocca il legno, distaccasi a Primavera dalle altre aderenti al cortice, per unirsi più fortemente al tronco, e s'ingrossa, e s'indura, ed in legno si converte; e così aggiugneshi ogni anno al tronco un nuovo cerchio legnoso di que tanti, che compongono il tronco; e quindi noi contando tutti que cerchi concentrici, che han per centro la midolla, potremo sapere la giusta età di una Quercia annosa.

391. Postocchè dunque l'attacco dell'innesto fa- si primamente tra le due cuticole del selvatico, e del dimessico, uopo è situar la verghella in sì fatto modo, che il tenue filo di una cuticola corrisponda

giusto, e si combaci coll' altra, ciò che a parer mio si ottiene meglio, guardando di far corrispondere non già l' esterna superficie delle due scorze, perchè quella del tronco, o ramo salvatico, è sempre più grossa della tenue scorza della verghella; ma più tosto badando, a far corrispondere la lor superficie interna, ovvero ch' è l' istesso, l' ultimo termine de' due legni, dietro i quali vengono le due cuticole: alla mancanza di questa necessaria notizia può attribuirsi, che talora non abbian presa gl' innesti, per altro fatta da man perita.

392. La terza maniera è l' innesto a corona, il quale suole adoperarsi, quante volte il tronco sia troppo grosso, quando può dubitarsi, che al fendeslo si spacchi, con far troppo lunga la fenditura. Allora intorno al cuccuzzolo già reciso, e spianatosi va conficcando di tratto in tratto tra la scorza, e l' legno una zeppolina soggiata a cuneo, e cavata la zeppolina vi s' inserisce la punta del forcolo, tagliata similmente a cuneo, e così attorno attorno può coronarsi con otto, o dieci forcoli il grosso tronco: quindi si medica, e lascia il tutto, come sopra si è detto.

393. Evvi una quarta maniera più capricciosa, ch' è l' innestar di ramo in vicinanza, così detto, giacchè non può praticarsi, se non colle piante vicine, che si toccano, o con quelle piante ne' vasi portatili, che possono avvicinarsi. Lasciando le due piante, tali quali sono, basta sol fendere per lo mezzo il tronco, o il ramo del salvatico, tanto quanto è uopo, e potervi far pa stare per entro la vetta di un altro ramo della vicina pianta gentile, dopo che sarà ella quivi inserita, se ne cuopre l' aperta fissura con cera, fasciasi con pezza di lino, ligasi con funicella, e poi s' aspetta finchè l' estraneo in progresso di tempo sia

si incorporato col tronco, e allora si taglia il ramo inferito, e si separa dalla propria madre, per lasciarlo nutrire dalla selvatica matrigna, la qual allora è da scoronarsi, spogliandola de' proprj rami, acciocchè de' rami dell' innesto torni vigorosamente a coronarsi. Il Sig. Carlo Stefano nella sua Agricoltura L. 3, c. 18, prescrive, che si taglino tutt' i rami della pianta gentile, eccetto il ramo da inferire, e 'l selvatico del tutto si scapezzi, levandogli i rami infino su 'l tronco, e 'l tronco poscia si spacchi. Con questa foggia d' innesto afferma, che può inserirsi ogni sorte d' albero sopra di ogn' altra sorte di genere diverso, come sarebbe l' ulivo sopra la ficaja; e foggugne, ch' ella era maniera molto usitata al suo tempo nel paese di Mans, dove ricordavasi, aver mangiato d' un Uva, che avea il sapore di Noce, perchè la vite era stata incalmata nella noce nel modo predetto.

390. Il medesimo innesto può effettuarsi in altre guise, le quali a ciascuno potrà il proprio ingegno suggerire: v. g. potranno scavarli nel tronco, e ne' rami del selvatico due incisure, da un fianco, e dall' altro, e scegliendo due rami del dimestico, vi si farà in ciascuno una pari incisione, fazionata in maniera, che debbano combaciarsi, e toccarsi a pelo a pelo le due calteriture, incastrando esattamente i due rami nel sito delle loro tacche. Possone anche spaccarsi, o scorticarsi i due rami da un solo fianco, e adattando con esattezza una piaga sopra dell' altra dovranno strettamente legarsi, o attorcigliarsi, quando sieno verghelle pieghevoli; e così possiamo in altri modi accoppiare insieme il dimestico col selvatico; purchè sempre s' abbia riguardo ad applicar con diligenza l' intima superficie, o cuticula dell' uno coll' intima dell' altro. Questa foggia d' innesti, dice il Sig. Pluche, fa sempre miglior

riuscita degli altri; conciossiachè laddove negli altri non concorre all'operazione, che un succhio solo, qui ne concorrono due; e in conseguenza è molto più facile, che la rama domestica faccia presa, e che incorporandosi nella salvatica, la ingentilisca. 2

395. La quinta maniera è l'innesto ad occhio, o a scudo, nel quale ci serviamo di un pezzetto di scorza, tratta dalla pianta gentile con un occhio, o sia gemma, o nocchio, la qual suol tagliarsi a figura di scudetto triangolare, sempre più lunga, che larga. Nel tagliar tale scorza, sarà bene, che nel mezzo, ov'è l'occhio, ne venga con esso attaccata una sottil laminetta di legno, non già che quel legno ajuti l'innesto a far presa, ma perchè si sta più sicuro, che l'occhio non resti attaccato al legno, al cavar della scorza, come tal volta succede. Quindi si fa una incisione a foggia di T, oppure a croce nella corteccia del tronco, o ramo salvatico, e nella parte più sana, e liscia; poi sollevando destramente la detta corteccia, vi s'introduce bel bello lo scudo, e sì che vada la sua punta acuta a toccare il piede del T nella incisura, e la sua margine superiore, s'incontri, e tocchi esattamente la corteccia incisa nella margine superiore del T. Dopochè lo scudo è stato così ben situato, colla scorza sollevata del salvatico cuopresi, con lasciar solamente scoperta la gemma, e'l vano, che resterà fra le labbra della scorza rovesciata, s'empierà di filetti di lana, e non di canape, la qual è troppo resistente, e non darebbe agio alle labbra disunte di dilatarsi, e poi congiungersi. Se 'l ramo, o tronco ne sia capace per la sua grossezza, se ne fan due di tali innesti, uno da una banda, ed uno dall'altra opposta, nè altro resta che legare tutto in giro l'innesto, per mantenerlo ben applicato.

396. Alcuni praticano un metodo troppo diverso, ma che riesce ancor bene: tagliano di qualunque figura sia un pezzo di cortice del dimestico colla sua gemma, e sarà ottima di figura ovale, o bislunga, ed applicandola sopra il luogo, ove si vuole inferire, van segnando intorno ad essa colla punta del coltello la sua giusta figura, e tagliata in giro la cortecchia del salvatico, ne staccano un simile ovato, e quivi nel suo giusto luogo v'incassan con diligenza. L'ovato gentile: poscia con pezza bucata nel mezzo a riguardo dell'occhio cuopron tutta la circonferenza del taglio, la qual si può anche meglio medicar con impiastro, e vi si passa sopra la legatura, per mantenervi saldo l'attacco.

397. Si è detto, che il taglio facciasi nella parte più liscia, cioè ove non sieno nocchi, ed asprezze, perchè nel liscio la scorza si distacca più agevolmente, e la nuova scorza, che vi si deve applicare, più agevolmente s'attacca. Vero è, che Virgilio, ed i Giardinieri del suo tempo usavan di fare il taglio, e d'inferire la scorza giusto lì sopra, ov'è il noecchio del salvatico, parendo lor forse, che così più sicuramente ingannassero la Natura, applicando la prole straniera, per fargliela meglio adottare, a quella medesima poppa, ondè ne distaccavan la propria. Ma la lunga pratica ci ha fatto vedere, eh'era ella questa una precauzione inutile, o ancor dannosa.

*Nam quæ se medio trahunt de cortice gemmæ,
Et tenues rumpunt tunicas, angustius in ipso
Fit nodus sinus: hæc aliena ex arbore gerunt:
Includunt, utique docent inolescere libro:*

Georg. 2, v. 74.

Di più, come qui accenna Virgilio, cavavano dal salvatico il solo germe, senza pelle al dintorno, e qui

vi inferivano il solo germe del dimestico, come offerì il Sig. della Quintinie; ma o ella si è perduta l'arte del sottil magistero, o più tosto non è tanto sicura, quanto la nostra.

397. Nell'innestare ad occhio suole scapezzarsi la pianta insino sul tronco, così nella Primavera, come nell'Estate, quando il sugo è abbondante, e si mozza il tronco, o il ramo quattro, o cinque dita sopra il taglio dell'innesto, per lasciare al copioso umore che sale, qualche sfogo d'altro nocchio suo proprio, il qual possa ella nutrire, acciocchè non inondi, e soffoghi la gentil prole straniera. Questo si chiama, innestare ad occhio lacrimoso; sebbene poi, abbracciata che abbia il tronco la nuova prole, sta in nostra mano troncare il detto cucuzzolo rasente il piede dell'innesto, affinchè possa crescervi sopra il cortice, e ricoprirlo. Se però facciassi l'istesso innesto nell'Autunno, allor quando l'umore non è sì abbondante, o non ha grande spinta, per salir su, mandandole l'agitazion del calore in quella stagione; allora, dico, può lasciarsi in terra la pianta, mentre non ha vigore, da tollerar tanti gran tagli, e cicatrizzarli; nè poi si scapezza, e seorona, se non nella vengente Primavera, allorchè il sugo comincia a muoversi, e torna su inabbondanza: e questo dicesi dagli Agricoltori innesto a occhio dormiente.

399. La stessa maniera vien detta, l'innesto a zufolo, in sicil. *a Jditali*, cioè a Ditale, la qual non è diversa dalla procedente, se non nella forma della scorza, che s'inferisce. Si fa scelta di due ramicelli, o forcoli, uno sul salvatico, e l'altro sul dimestico i quali sieno per l'appunto di ugual grossezza: l'uno, e l'altro si mozza, e poscia si fa un taglio circolare in ambedue, per trarne il cortice sano, ed intiero, come si fa, e che porti con seco almeno due
buo-

buoni occhi il dimestico; e la parte, che scorticasi nel salvatico, sia liscia, e pulita: quivi s'applica quel cannellino, o buccia cilindrica della scorza gentile, bellamente vi si calza, e si riveste dell'altra pelle il fusto denudato, e così facilmente l'abbraccia.

400. Questo parmi, che debba riuscire l'innesto più sicuro; ma perchè talora non sarà facile, trovar due verghe di ugual grossezza, e nella maggior parte delle piante non è così agevole il trarne intera la pelle, senza romperla, o maltrattarla; penso, che possa ottenersi l'equivalente, se all'incision della pelle, fatta come ora si è detto, aggiungasi un taglio perpendicolare, che divida il cannello per tutta la sua lunghezza, ed allora con facilità potrà staccarsi tutta in giro la pelle, e dove siasi pervenuto al luogo delle gemme, (delle quali così abbiamo il comodo, di trarne più d'una, o due) abbiamo l'altro comodo, di tagliar le gemme con un pochino di legno. O ella questa scorza corrisponde giusta col fusto ignudo del salvatico, e vi s'applica, o è più larga, e vi si recide ciò, che ne avanza, o è più stretta, e lasciasi nel salvatico qualche parte di scorza, che in quella manca; purchè sempre si pratici la dovuta diligenza, in far combaciare tutt'intorno le labra delle due scorze. Non fa bisogno qui di applicar questo cortice sulla vetta del ramo salvatico, essendo più sicuro, che lo si applichi due, o tre dita sotto, lasciandolo coperto della sua pelle, come praticasi coll'innesto ad occhio, giacchè così l'innesto avrà tutto l'orlo superiore difeso, ed uno spazio maggiore ove legarsi, ed unirsi insieme le pellicole interne delle due scorze. In tutto il rimanente, questa sorte d'innesto segue le leggi di quello ad occhio, ed io mi do a

credere, che possa riuscire uno de' più sicuri; perchè possiam dare al cannetto della scorza quella lunghezza, e larghezza maggiore, che vogliamo; ed ove abbiassi una maggior estensione di contatto fra le due cuticole interne, e fra la cuticola della scorza gentile, e l' legno salvatico, ivi debbe avere una maggior presa l'attacco.

401. Resta la settima, ed ultima maniera più di tutte nuova, e bizzarra. I Tedeschi, e gl' Inglese han cominciato a praticare il metodo, di far gl' innesti in tutte le predette maniere, non già sopra i rami, e tronchi, ma sopra le radici. Il Pluche, che lo riferisce, non sa di certo, se un tal metodo regge alla prova, ma se riesce, sarà cosa non poco utile. Per primo vantaggio, possono farsi gl' innesti sopra le radici de' medesimi domestici, senza perderli: dacchè non si discapita nulla, quando un albero è vigoroso, a levargli un tronco delle sue radici maestree, e sopra di quello, ed in ciascuno delle sue braccia potranno farsi altrettanti innesti. Ma se l' albero sia salvatico, e nulla ci calga di perderlo, potranno farsi sopra le sue radici da venti, o trenta innesti, che in breve tempo ci daranno altrettanti alberi, in vece di un solo, che dar potea quel salvatico, sopra i suoi rami innestato; e questo è un secondo più importante vantaggio: a' quali si aggiunge il terzo, allegato dal Pluche, che si potrà piantare a drittura la barba coll' innesto nel sito medesimo, ove l' albero dee regnare; laddove giusta le operazioni predette bisogna prima innestare, e poi indugiar quasi sempre a lungo tempo per trapiantare.

402. Chi farà vago, di far sì degna sperienza, potrà eseguirla, come ne pare a me, in tre maniere. 1. scavata la terra intorno al tronco d' una ra-
di-

dice, senz'altro lo innesti con tutt' i suoi rami più vicini; lasci all' aperto le sole parti innestate, e tutto il rimanente resti, come stava, coperto, e radicato. Quando poi vedrà allignati gl' innesti, caverà da terra tutta la radice sino alle ultime barbe, dividendola in tante parti, quanti sono gl' innesti, ciascuna con un sufficiente arredo di barbe, e tutte le planterà ne' luoghi destinati. 2. tagli dal pedale la radice, e la innesti nel tronco, ed in uno, o più braccia, che non saran troppo sotterra, e lasci tutto il resto delle barbe come stavano nel proprio sito. 3. tagli del pedale, e cavi fuori tutta la radice, la divida in tanti pezzi, quanti sono i rami, colla condizione, che ciascuna porzione abbia seco una competente quantità di barbe; poscia in ogn' una di coteste parti faccia il suo innesto, e le plants in terra con tutta diligenza, lasciando allo scoperto la sola estremità innestata. In qualunque delle tre maniere potrebbe arricchirsi di nuovi alberi la campagna, e sol la terza, che saria più comoda, sembra la più pericolosa.

403. Ma s' è detto già degl' innesti più di quel, che richieggano le nostre piante a fiore, essendo poche quelle, che son leguose, e perenni, come convien, che sieno, per potersi innestare. Nel catalogo delle nostre piante, diremo quali sieno capaci d'innesto, e la propria maniera di farlo; sol qui aggiugniamo, che 'l tempo da innestare, è quello per ordinario, quando la pianta va in amore, che suol essere nella Primavera, quando cominciano a ingrossare i bocciuoli delle gemme.

C A P O XXVII.

*Del cavar da terra, e conservar le radiche,
i bulbi, e tuberì.*

404. **P**Er que' generi di piante, che producono il lor moltiplico in radiche come i Ranuncoli, in bulbi come i Gl'acinti, e Tulipani, in tuberì come gli Anemoni, bisogna prima sapere il tempo, quando debbon cavarli da terra, e la maniera come utilmente cavarne il moltiplico, e come conservar tutto ciò, che se n'è cavato. La regola, che si può dar generalmente intorno al tempo, ella è, che la pianta dee cavarli da terra allor quando perde il vigore di vegetare, mentre sta come dormiente, e prima che risvegli alla nuova vegetazione. O' ella è annuale, che perde nel corso di un anno, e sol ne resta viva la radice, il bulbo, e 'l tubero; e 'l tempo da cavar ciò, che ne resta, per ordinario è quello appunto, quando se ne vede già secca la pianta, o poco prima, quando cominciano ad appassir le foglie per ispezial motivo, che v'è in alcune spezie particolari, come si dirà nella lor coltura: così degli Anemoni stimasi cosa più utile cavarli, quando cominciano ad impallidir le foglie; a motivo, che allora s'impudresce la parte vecchia del tubero, e 'l contagio potrebbe attaccarsi alla parte sana, fermentato dall'umido della terra. O' s'ella è pianta perenne, che sempre vive, può cavarli da terra, quando il verde delle foglie manca totalmente, ed in quelle spezie, che mai perdono il verde, quando vengon meno le antiche foglie, per ricambiarsi col-

le novelle. Così cavo io le cipolle del Giglio Giacobeo, che sta quasi sempre verde, ne' tre mesi d'Inverno, quando si van' corrompendo le foglie antiche;

405. Rara sarà qualche specie di pianta, la qual non siegua la data regola generale per qualche particolar motivo; ed ella è fondata nella ragione, e confermata dalla prassi, ed esperienza comune: perchè la radice, il bulbo, il tubero, quando già più non vegeta, e cessa di nutrir la pianta, non ha più bisogno di nutrimento dalla terra, e può da quella liberamente levarsi; ma mentre mantiene in vigore le foglie, ne ha tutto il bisogno, per sostenere se stessa, e la sua pianta. Ho io sempre osservato, che le radiche, tuberi, e bulbi, levati prima, che la pianta sia seccata, o prima che le foglie almeno cominciano ad ingiallirsi, ch'è il segno del cessar già la vegetazione, trovansi scarni, e macilentì: e però fan' malissimo que', che li cavano da terra, subito compiut' i fiori, perchè allora trovansi smuntì per quella sostanza, che han tramandata alla nutrizione de' fiori, e semenze, per cui si son quasi sviscerati, e sol dipoi che si son sgravati del parto, si van essi rinfrancando, e nutrendo in quel frattempo, che passa dalla fioritura sino all'apparir delle foglie, quando già ingrassati le abbandonano, non avendo più bisogno di quelle per la cozione, che realmente si fa nelle foglie, del lor nutrimento.

406. Per questo motivo medesimo fanno' anche malissimo que' che cimano la pianta, e taglian le foglie dopo la fioritura, credendo falsamente, che la radice, il bulbo, il tubero debba ingrossar più, e approfittarsi del sostentamento, che somministrar dovrebbe alle foglie; lo somministra è vero, ma per
 zuc-

averlo restituito più sano, e cotto. Così ebb' io la pena, di dover perdere trenta Gaste de' più nobili Ranuncoli per l'iperizia di chi ito a cogliere i fiori, poichè tutti eran maturi, mietè tutto, e fiori, e rami, e foglie, e tutte ne periron le radici.

407. Nel cavar di terra le radiche, bulbi, e tuberì si proceda con ordine, per non lasciarne indietro, e con attenzione, per non ferirli col ferro; e si cerchino diligentemente que' piccoli figliolini, che si sono staccati dalla madre; la qual avvertenza è assai necessaria pe' Ranuncoli Asiatici, i quali spargon la prole intorno, un po' lontano. Que' rampolli, che a staccarli dalla madre lascian ferita, sarà bene lasciarli attaccati fino al tempo da dove li ripiantare; perchè così meglio si conserveranno alle poppe materne, e 'l nativo sugo non avrà adito da svaporar per la piaga; e que' rampolli, che non lascian piaga, ma pur trovansi fortemente abbracciati alla madre, e con essa intrigati, come talvolta avviene nelle radiche de' Ranuncoli, sarà più espediente distrigarli, quando ancora son umidi, e morbidi, che quando poi saran secchi, e duri, con pericolo di maltrattarli, e romperli in pezzi. Nello staccare i bulbettini guardisi bene, a non far gran squarei, per non offender la corona, o sia la base del bulbo, la qual deve guardarsi, come suo principal sostegno: siccome non dee il bulbo spogliarsi delle sue tonache, mostrando l'esperienza, che privo di quel riparo datogli dalla Natura, per difenderlo dall'esterne ingiurie, per ordinario marcisce.

408. A parlar ora della conservazione di ciò, che cavasi da terra, premetto una mia opinione. Sento che sempre facciasi qualche male alle piante, levandole dal suol natio, e che le lor radiche, bulbi,

bi, e tuberi meglio debbano conservarsi sotterra, che tenendoli all'aria esposti. Conciossiacosachè l'indole lor conferita dal Creatore debb' esser tale, che possano ben conservarsi, per ripullulare altra volta in quel medesimo sito, e luogo, il qual fu per se destinato alla lor vita, e conservazione; ed in fatti veggiam, che si mantengono assai bene alla campagna, ove stan sempre sotterrati. Quindi se ne inferisce, che senza positiva necessità, la qual ci costringa, o evidente utilità, che ci spinga, non si tengano mai i vegetabili fuori de lor nativo elemento, ch' è la terra. Talora siam costretti a disotterrarli, o perchè il nostro Clima è differente molto dal lor natio, e si guasterebbono, se in certi tempi o troppo caldi, o troppo freddi, e piovosi non si terrebbero fuor di terra; o perchè uopo è sgravar le madri dalla numerosa figliolanza, e di questa valerci per la moltiplicazion della specie, o perchè convenga dar loro altro sito, o rinnovargli la terra, s' ella è sfruttata.

409. Nel resto tutto quel che si può lasciare in terra, o per tutto quel tempo, che vi si può lasciare, vi si lasci; e ciò intendasi detto con ispezialità de' bulbi, a' quali l'aria è più inimica. Di questi parlando il Clarici riferisce, che ne' Climi più felici del suo di Lombardia si lasciano con buon successo i bulbi in terra tre anni, nel termine de' quali cavanfi, per levar loro la prole. Altri con industria più laboriosa li lascian bensì tre anni in terra, ed anco quattro, ma però ogn' anno verso il fine di Luglio, senza spiantarli, o muoverli, li scuoprono, e gentilmente van levando loro la prole, senza smover per nulla la radice, e poi li ricuoprono con la stessa terra, o con migliore, e se ne sia bisogno, con accrescer la stessa sino ad un pal-

palmo, per impedir, che non sien offesi dal calore, e dalle pioggie, la qual poi levano nell'Autunno, lasciandovi solamente la terra solita. V'è chi li cava ogni due anni, spiantando ogni anno la metà del giardino, e parimente sgravandoli da bulbetti, e rilavorata, e migliorata la terra, subito li ripiantano. Or ne' predetti casi, ne' quali convien tenere fuor di terra le radiche, i bulbi, ed i tuberi, bisogna sapere, quali spezie reggano all'aria per mesi, e non per anni, come son quasi tutt'i bulbi, che si mantengono ne' mesi caldi sino all'Autunno, ma non già più oltre nell'Inverno; e quali reggano per uno, e più anni, come son le radiche de' Ranuncoli, e i tuberi degli Anemoni; e quali appena reggano per pochi giorni, o almeno patiscano sensibilmente, se tosto non si ripiantino, quali sono i bulbi de' Gigli Martagoni; ma coteste notizie si daran di ciascuna spezie nella lor coltura particolare.

410. Dovendosi dunque cavar di terra le radiche, i bulbi, ed i tuberi, si cavino in tempo, quando sieno asciutti, perchè se sieno umidi, facilmente potran muffare: questo può anche meglio ottenersi colle piante, che son ne' vasi, dacchè quando vedrem, che la pianta va per seccarsi, potrem rinversare i vasi, coricandoli di fianco; acciocchè, se venga pioggia, non possa bagnare altro, che la sola superficie, e'l resto dell'acqua, senza penetrar giù, fuora se ne scolerà; e così la terra del vaso di giorno in giorno si andrà lentamente asciugando. Del rimanente quando si cavasser umidi, o bagnati si potranno seccare, tenendoli in luogo esposto a' venti, ma non già troppo al Sole, se non fosse moderato. La ventilazione dovrà pure darsi a quelli, che nel cavarli pajono asciutti, ma pur sempre conservano nel terreno qualche umido, che ascende dalla terra, o
che

che vien dalla notte; e se non faranno del tutto secchi, non si pensi a conservarli, perchè quel poco d'umido, che vi resterà, è bastante per fargli far la muffa, e corromperli. Intanto mentre si asciugano, sarà meglio mantenerli con tutto il tronco, e i rami, così come furon cavati, scuotendo lor solamente la terra; e dopo che saranno secchi, si staccheranno i tronchi con facilità, senza pericolo di squarci. Finalmente prima di conservarli, si ripuliranno d'ogni lordura, e di tutto il secco, e 'l fraccido, tagliandolo sino al vivo, e medicandone la piaga col solito impiastro, acciocchè non ripulluli la cancrena.

411. Alcuni per non saperli ben conservare, gli han perduti. Benchè i tuberì, e le radiche, purchè sieno perfettamente secchi, possano tenersi in casse, o scatole, del tutto chiuse in luogo asciutto; nondimeno v'è del pericolo, a tenervi così chiusi i bulbi umidi, e sugosi di lor natura; e però sarà il meglio di tener e questi, e quelli non solamente in luogo asciutto, ma non mai chiusi di maniera, che l'aria, e 'l vento non vi possa permeare; e però si tengano in casse, e scatole per ogni parte bucherate, o dentro ceste, e panierì; oppure ne gran giardini, ne' quali è molta la lor quantità, si ripongano sopra tavolati, o cannicci situati in alto, e non in terra, per evitar l'umido, seppur non sia solajo. Di più i bulbi non tengansi ammucchiati uno sopra l'altro con pericolo, che fermentino, anzi s'abbia riguardo, a non farli fra lor toccare, ed i più riguardevoli stan più sicuri, involtati nella carta. S'hanno finalmente a guardar da' forci, con ispezialità le cipolline de' Tulipani Persiani, delle quali son essi golosissimi, e arrivano per insino a scavarle di sotterra.

C A P O XXVIII.

Dello zappare, letamare, e preparar la terra per la nuova piantagione.

412. **T**Rattasi ora di dover piantare tutto quello, che si è raccolto; ed a ben farlo, convien premettere la preparazion della terra. Se abbiassi a preparare per la prima volta un terreno nuovo, e selvatico, sarà bene pensarvi anticipatamente nel mese di Aprile, e Maggio, rompendolo e cavandolo tutto profondamente, e nettandolo al tempo medesimo dalle pietre, dagli sterpi, ed erbe con tutte le lor radici, massime se sien di quelle, che ripullulano, come l'infesta gramigna, di cui anche i piccoli frammenti tornano a germogliare. Il lavorar fin d'allora la terra incolta, su l'esempio delle Maggese, che in quel tempo sogliono prepararsi, riesce giovevole per antica sperienza, per la ragione, che qui appresso ne daremo. Rilavorasi la seconda volta dopo le prime piogge, quando già sarà nata l'erba straniera, ed allora si dovrà letamare il terreno, spargendovi sopra il letame ben digerito, e poi zappando, si procurerà di ben mescolarlo con la terra: quindi la terza volta si zapperà qualche giorno prima di dar principio alla piantagione, ma con maggior diligenza di prima; cioè sfarinando tutte le zolle, riducendole in polvere, acciocchè la terra sia tutta fertile, soffice, e morbida, e nettandola di tutte le pietre ancor minute, e d'ogn'altro corpo estraneo: ma per l'uno, e per l'altro intentò, sarà ottimo il crivellarla, come praticano i più accurati Giardinieri. Se poi quello non sia un terreno nuovo, e sal-

salvatico; ma stato già in uso, ed ingentilito per erbaggi, e per fiori; basterà zapparlo due volte, e se sia duopo, setamarlo; e con ciò l'uno, e l'altro terreno sarà ben preparato.

413. Quel cade in acconcio, di assegnare la ragione fisica, perchè giovi tanto grandemente alla pianta il lavorare, e rilavorar soventemente la terra. Giova per più ragioni: e prima per l'estirpazione dell'erbe, e radici estranee, le quali ingombrerebbon la pianta, che vi si vuole allevata, e le ruberebbono il nutrimento. A questo fine riesce utile il lavorar la terra preventivamente due volte, come si è prescritto, una ne' mesi di Aprile, e Maggio, primachè sien compiute le sementi dell'erbe cattive, acciocchè non vi possan germogliare, e l'altra dopochè vi sarà nata la prima mano dell'erba con le prime piogge. La seconda ragione è, che la terra col lavorarla, si rende morbida, e penetrabile, e con ciò le tenere radici possono agevolmente profundarsi, e distendersi. La terza viene assegnata dal Malpighi, acciò i sali, de' quali è impregnata la terra, sieno sciolti dall'acque, le quali allora meglio la penetrano, quand'ella è rara, e sciolta, che non quando è densa, e ferrata. Il Rajo aggiugne una quarta ragione, che nella terra mossa, e sollevata, penetra l'aria sino alle trachee delle radici, e ne promove la respirazione, di cui han uopo le piante per vegetare. Altri aggiungono la quinta, cioè col muover, e rivoltar la terra (vapora la rea uligine, che nocerebbe alle piante. La sesta però è una delle principali; perchè lavorata la terra, le zolle esposte al Sole s'imbeono più copiosamente delle igence particole, che vibra il Sole: ne' raggi suoi luminosi, e così quella ne divien più feconda, per ciò, che se n'è detto nel capo 4. n. 45. p. 35. del

presente Trattato; e questa è un'altra ragione; per cui riesce vantaggioso a i campi, il prepararli per le maggesi nella Primavera; perchè 'l Sole estivo cuoce le glebe, e di fuoco fecondatore le impregna; e però cantò Virgilio *Geor. l. 1. ver. 65.*

..... glebaeque jacentes

Pulverulenta sequat maturis Solibus aestas.

414. L'ultima ragione sembra la più possente; ed è assegnata comunemente da' Naturalisti: la terra coltivata, col fenderla, e stritolarla, si rende più penetrabile all'aria, e menr'alta è soffice, e porosa, attrae dall'aria una maggior copia di nitro, di sali, e di tutte quelle altre particole grasse, e nutritive, delle quali è gravida l'Atmosfera per le continue esalazioni, che ascendon dalla terra, le quali poi condensate ricadon sul terreno, e lo fecondano. L'aere senza fallo, par che sia la principal forgente della fecondità, come fu accennato al capo 6. n. 79. a segno tale, che il Sig. Pontendera nella *Differiet.* 2. trattando della fecondità della terra, sostiene che tutta, o quasi tutta ella provenga dall'aria; ciò, che pruova con più ragioni, ed una delle più convincenti è, che la terra, più che si zappa, e smuove, cioè più che all'aria si espone, più divien fertile. Nè convince meno quest'altro suo argomento: la parte più fertile della terra è sempre quella, che sta nella superficie, cioè la più esposta all'aria; dovechè la terra scavata dal fondo, ove non ha mai veduta l'aria, riesce sterile in prima, se non si lascia per qualche tempo esposta al Cielo. Quindi egli vuol di più inferire, non esser mai vero, che la terra venga fecondata da sotterranee esalazioni, mandate su dal fuoco centrale, così detto da alcuni moderni Filosofi, a' quali noi abbiamo aderito nel Capo 6. n. 72. e 73. perchè

chè, soggiugn' egli, se dal basso venisse in alto alcuna cosa fecondante, dovrebbe riuscir più feconda la terra cavata dal fondo, che quella dell' esterior superficie. Ma noi possiam rispondere, che nel citato luogo non mettiam, come unica sorgente di fecondità, i vapori sotterranei, ma più tosto come una tenue vena, che ajuta sì a somministrar la parte terrea più sottil del nutrimento, ma pure questa sola parte non è bastevole a render fertile la terra, o sia quella della superficie, o sia la cavata dal fondo; questa porzione però con quella, che somministrano il Sole, e l'aria principalmente, rendono compiutamente fertile il terreno: ed è pur verissimo, che la terra cavata dal fondo, e ben rivoltata, dopo che sarà stata per qualche anno esposta all'aria, e al Sole, rende assai più, che non la terra della superficie; e però scrisse Quintiliano: *Terra altius effossa generandis, alendisque seminibus fecundior fit.*

415. Or tornando all' interrotto discorso, alla preparazion della terra, non basta tal volta, il meramente zapparla: s' ella è sfruttata, sarà divenuta cattiva, come che prima sia stata ottima, e dotata delle tre buone condizioni, prescritte nel capo 4. n. 34. e suol essere sfruttata dopo due, o tre anni, che travaglia senza riposo; massime se abbia nutrita la stessa specie di pianta, la quale stando sempre in un sito, ne ha cavati i sali omogenei, e ne ha tratte le particole nutritive, che a se convengono, onde la terra ne resta poi del tutto impoverita. Il mezzo più giovevole, per aver piante vigorose, e fiori molti, e grandi, è quello di dare ogni anno, o dopo due anni al più, nuovo sito alla pianta in buon terreno, e riposato, oppure ricambiarle la vecchia terra con della nuova, e ben con-

condizionata. Se non può mutarsi, deve almeno conciarfi, s' ella è sfruttata, e s' ella tiene altro vizio, emendabile, deve correggerfi, come fu detto al Cap. 4. n. 39.

416. La terra d'ortaglia è comunemente la più usata, ed è sempre propria per le piante da fiore, ed, è ottima se sia ripofata: ma pur è molto lodata la fondiglia, che cavasi dal fondo delle peschiere, purchè si lasci per qualche anno esposta all'aria, che la rende seconda: siccome vien molto commendata la terra, tratta dal letto abbandonato de' fiumi, e quella, che raccogliesi da' viottoli degli orti, trasportata dal corso dell'acqua nell'adacquare: però sarà più sicuro, che di queste ultime terre ci prevalgiamo, come di condimento, per conciare altra terra, potendo quella peccar di troppa grassezza, o che le dette terre sien troppo piccanti di nitro, e sali, ed in vece di giovare, forse nuocerebbono alle piante.

417. L'ordinaria concia da darsi alla terra, è quella del letame, il quale la ingrassa se magra sia, la rinvigorisce se debole, e sfruttata, e se densa, ed aspra la scioglie, ed intenerisce: e però una delle principali cure del provido Giardiniere debb'esser quella del Letamajo; nè il Padrone abbia a schifo d'invigilarvi; dacchè la polvere de' suoi piedi, cioè la sua assistenza, al dir di Plutarco, è l' più perfetto stabbio, che possa darli. *Optima stercoratio vestigia Domini: In Simphos.* Il letamajo dovrà farsi fuori del giardino; non già per lo motivo, che apporta il Sig. Clarici, acciocchè dal puzzone non sieno offesi li fiori, ma per amor della politezza più tosto, acciocchè nè l'occhio, nè l'odorato se ne offenda. Può farsi col suolo lastricato di mattoni, e circondato di muro; o più speditamente può scavarfi un fosso nel terreno; ma debbono esser due i le-

letamai, o uno in due diviso; affinchè in uno si riponga il nuovo letame, che dovrà col tempo digerirsi, e nell' altro stia riposto l' antico, già macero, ed atto a valercene nelle occorrenze. Quivi s'ha da ripostarfi tutte le cose corrutibili di qualunque genere, cioè l' erbacce, e spazzature del giardino, escrementi di ogni sorte, e cadaveri di animali, ceneri, fuligine di cammini, le graspe, o sian vinaccie dell' uva, legni fracidi, e tutt' altro, che si possa ridurre in quella terrea sottil sostanza, che serve di nutrimento, e come di base alla formazione de' vegetabili, giusta il divisato nel Capo 5. n. 61. e seq.

418. E' da avvertire sopra tutto, che l' concime sia ben macero, prima di metterlo in uso, altrimenti in vece di giovare, nuocerà grandemente: bisogna, che sia già ben fermentato, distrutto, e ridotto in terra; perchè se durerà tuttavia in vigore, fermenterà, e col suo fuoco abbrucerà le piante. Quindi acciocchè tutto egualmente si maceri, passato qualche tempo, quando par, che abbia perduto il calore, dovrà rivoltarsi tutto il mucchio delle materie soprappia, affinchè la parte men cotta della superficie vada sotto a cuocersi sino all' estinzione del calore. Se fosser materie aride, e secche, dovranno bagnarsi con acqua, perchè senza l' umido non si fa mai la putrefazione. Per le nostre piante gentili non sarà ben maturo il letame, se non sarà ridotto in polvere, e terra; e però il P. Ferrari seguito dal Clarici, non lo fa maturo, se non dopo tre anni di mecerazione; ma dopo due anni lo do io per sicuro, ed ancor dopo un anno, quando sia ben governato col rivoltarlo, come si è detto, e bagnarlo specialmente nell' estate.

419. Può anche farsi il letamajo in quest' altra-

maniera, la quale ho io fatta praticare con buona riuscita; e serve insieme, per poter rinovare ad ogni due anni la terra alle nostre piante con non piccol emolumento. Ho fatto scavare un competente fosso, e quivi ho fatto gettar la terra, stata buona, ma poi già sfruttata dopo due anni, che avea nutriti i fiori: però ad ogni strato di terra non più alto di mezzo palmo vi ho fatto gettare tre, o quattro dita di concime, o totalmente crudo, o non troppo macero, e così a strato a strato, uno di terra, e l'altro di concime sino alla sommità del cumulo, che deve risaltare a monticello sulla superficie del terreno, per goder del beneficio dell'aria. Stando così, dopo due anni sarà quella terra in istato da servire, come terra nuova, grassa, riposata, ed abile a far delle vigorose produzioni. Quindi votando i vasi, e le ajuole della terra vecchia, e riempiendoli di cotesta già ringiovenita, tornerassi a riempire il fosso di questa vecchia terra a strato a strato in un col concime, come si è detto; e con quest'arte avrassi sempre il comodo, di poter rinovare la terra medesima di due in due anni senza l'incomodo, e senza la spesa, d'andar cercando, e portando di quà, e di là la terra, per rinnovarla. Ragion vuole, che questa terra debba riuscir più feconda di quella, nella quale va mescolato semplicemente lo stabbio; perchè in questa il letame col fermentare, va sciogliendo la sua tessura; e le ignee particelle, che ne scappano, annidansi nella stessa terra, ed ella ne resta doppiamente fecondata, cioè non solo dalla terra sottile, in cui si riduce il letame già macerato, ch'è un principio di fecondità, ma insieme dagl'ignicoli, che n' esalano, ed è un altro comprincipio specialissimo della medesima fecondità, come si è dimostrato.

In-

420. Intorno alla quantità del grasso, che dee mescolarsi colla terra magra, o sfruttata, bisogna rimetterci alla prudenza, e pratica del giardinier; perchè dipende dalla qualità della terra, se sia da se poco, o molto magra, e dalla qualità del letame, se sia più o meno digerito. Colla terra più magra, e col letame ben digerito può caricarsi più liberamente la mano, ma colla terra men magra, e col letame ancor crudo si badi bene, a non metterne tanta quantità, che possa abbruciar la pianta: l'ansietà d'aver piante ben nutrite, e fiori magnifici, d'ordinario fa peccare i fioristi per eccesso, ed io lo so di me, che ho rovinate non poche piante per eccesso di terra grassa. Quando il letame non sarà ben maturo, e non se ne avrà del migliore, potrà differirsi a metterlo nella terra, dopochè saran nate le piante, ed allora si spargerà loro intorno, e zappettando leggermente la terra per mescolarvelo, si lascerà star così nella superficie, lontano dalle radiche, alle quali arriverà poscia col cader delle piogge, e ne scolerà giù insensibilmente il grasso, per nutrirle senza pericolo di nocumento.

421. V'è chi preferisce una sorta di letame ad un'altra: il Malpighi presso il Clarici C. 8. p. 1. loda particolarmente quello, fatto dagli escrementi delle Vacche, per esser ripieno di sali volatili. I contadini, e fioristi hanno in grande stima il colombino, così quel del pollajo, quel delle pecore, e capre, siccome la terra cavata dal suolo delle lor mandre. Il P. Ferrari disapprova il letame riferito da Emanuele Sverzio, fatto di foglie di Quercia, e terra negra, per esser troppo leggiero: ma ne ho provato io assai buono uno simile, fatto di foglie, ed erbe di qualunque genere, mescolate con terra. Ma debbe riuscir ottimo, se l'erbe sieno delle specie mede-

lima di quella pianta, alla qual si vuol applicare e
 v. g. volendo applicarlo a Ranuncoli, farlo delle
 foglie già secche degl' istessi Ranuncoli; giacchè in
 questo letame si contengono i sali suoi propri, e più
 confacenti a tal sorta di pianta, e come omogenei
 par che debbano meglio nutrirla. A questo propo-
 sito mi ricordo, aver letto nel P. Kircherio, *Phy-
 siolog. exper.* 23. e 24., che per ottener produ-
 zioni maravigliose, abbruciansi rami, foglie, e fio-
 ri di quella specie medesima, come si è detto, e la
 terra abbeverata con lisciva delle stesse ceneri, o colle
 medesime secondata, per l' addotta ragione de' sali
 omogenei, darà alla pianta un vigore straordinario.
 422. Per certe piante più riguardevoli possono
 usarsi certe cure più squisite, come la ora detta: Al-
 tri mettono in infusione i semi nell' acqua, in cui
 è stato sciolto il salnitro, e con tal sorta d' acqua
 innaffiano la pianta, ed ella piglia un notabile in-
 cremento. Il Cavalier Digby *De plant. veget.* per pro-
 var, che i sali sieno il principio della fecondità,
 conta pruove di maraviglia, operate da lui me-
 desimo: come a dire, semi di Canapa, tenuti al-
 quanto infusi nell' acqua, ove distemperava una con-
 veniente porzion di salnitro, aver generati fusti di
 canapa in grossezza, ed in altezza maravigliosa a
 vedere. Altri pestano, e riducono in polvere lo sterco
 delle pecore, e lo sciolgono in acqua, e con
 questa adacquano la pianta, e so, che ne son riu-
 scite piante assai poderose. Il Malpighi *Enatim. Plant.*
 p. 2. fo. 21. racconta di un suo amico, che semi-
 nò il grano, il qual prima tenne infuso per una
 notte in acqua, in cui avea fatto bollire sterco di
 Colombe, e di Capre, per trarne il sale, di cui ab-
 bondano tali materie, aggiugnendo a quell' acqua un
 poco di nitro, e tal semenza, gettata in buon ter-
 re.

reno grasso, venne sì così prospera, che un sol grano produsse trenta, e più rampolli, veduti dal Malpighi carichi delle proprie spighe. Vien lodata l'acqua, in cui è stata smorzata la calcina, ed io ne ho fatta espressa pruova co' Ranuncoli; e cogli Anemoni; e vi riesce giovevole. Ho voluto similmente provar l'utilità della cenere, mescolata con la terra, e quella è in poca dose, arreca del giovamento; ma se ella è in molta quantità scotta, ed uccide la pianta: così avviene ne' riferiti casi, che se predette acque, o materie applicate con discretezza, riescono bene, ma fanno del male, se la dose pecca di eccesso. Il contadini a far fruttare un albero sterile, vi sotterrano al piè il cadavere di qualche animale; ed il P. Chomel riferisce nel suo Dizionario Economico, esser riuscito un piede di Cavolo di tal enorme grossezza, che fu a tutti di ammirazione, e per spregiarsi la ragione, fu scavato il terreno, ove quello stava piantato, e sotto alla radice trovossi una scarpa purielatta. Certo è, che la carne, il sangue, e le parti degli animali, come materia tutta soda, e sostanziosa, possono somministrare alle piante gran nutrimento, per farle venir portentose. *Il 16. anno*
 423. Resta a parlarsi di un'altra maniera, come può prepararsi la terra, ed è una delle migliori, e per l'utilità usatissima. La terra può rendersi feconda col fuoco, come si suol praticar sì volgarmente ne' campi, abbruciandovi sopra le stoppie, gli sterpi, e tutto quel, che vi ha di seccume. Questa medesima industria potrem noi usar con la terra de' nostri fiori: stenderemo sul suolo la terra, destinata pe' vasi; e sopra di quella, siccome ancor sopra la terra delle ajuole spargerem delle materie combustibili; e sarà ottimo a mettervi i fusti, le foglie, e tutto il seccume delle nostre medesime piante. Dovrà ciò esse-
 424. *Il 1. anno* *Il 2. anno* *Il 3. anno* *Il 4. anno* *Il 5. anno* *Il 6. anno* *Il 7. anno* *Il 8. anno* *Il 9. anno* *Il 10. anno* *Il 11. anno* *Il 12. anno* *Il 13. anno* *Il 14. anno* *Il 15. anno* *Il 16. anno* *Il 17. anno* *Il 18. anno* *Il 19. anno* *Il 20. anno* *Il 21. anno* *Il 22. anno* *Il 23. anno* *Il 24. anno* *Il 25. anno* *Il 26. anno* *Il 27. anno* *Il 28. anno* *Il 29. anno* *Il 30. anno* *Il 31. anno* *Il 32. anno* *Il 33. anno* *Il 34. anno* *Il 35. anno* *Il 36. anno* *Il 37. anno* *Il 38. anno* *Il 39. anno* *Il 40. anno* *Il 41. anno* *Il 42. anno* *Il 43. anno* *Il 44. anno* *Il 45. anno* *Il 46. anno* *Il 47. anno* *Il 48. anno* *Il 49. anno* *Il 50. anno* *Il 51. anno* *Il 52. anno* *Il 53. anno* *Il 54. anno* *Il 55. anno* *Il 56. anno* *Il 57. anno* *Il 58. anno* *Il 59. anno* *Il 60. anno* *Il 61. anno* *Il 62. anno* *Il 63. anno* *Il 64. anno* *Il 65. anno* *Il 66. anno* *Il 67. anno* *Il 68. anno* *Il 69. anno* *Il 70. anno* *Il 71. anno* *Il 72. anno* *Il 73. anno* *Il 74. anno* *Il 75. anno* *Il 76. anno* *Il 77. anno* *Il 78. anno* *Il 79. anno* *Il 80. anno* *Il 81. anno* *Il 82. anno* *Il 83. anno* *Il 84. anno* *Il 85. anno* *Il 86. anno* *Il 87. anno* *Il 88. anno* *Il 89. anno* *Il 90. anno* *Il 91. anno* *Il 92. anno* *Il 93. anno* *Il 94. anno* *Il 95. anno* *Il 96. anno* *Il 97. anno* *Il 98. anno* *Il 99. anno* *Il 100. anno* *Il 101. anno* *Il 102. anno* *Il 103. anno* *Il 104. anno* *Il 105. anno* *Il 106. anno* *Il 107. anno* *Il 108. anno* *Il 109. anno* *Il 110. anno* *Il 111. anno* *Il 112. anno* *Il 113. anno* *Il 114. anno* *Il 115. anno* *Il 116. anno* *Il 117. anno* *Il 118. anno* *Il 119. anno* *Il 120. anno* *Il 121. anno* *Il 122. anno* *Il 123. anno* *Il 124. anno* *Il 125. anno* *Il 126. anno* *Il 127. anno* *Il 128. anno* *Il 129. anno* *Il 130. anno* *Il 131. anno* *Il 132. anno* *Il 133. anno* *Il 134. anno* *Il 135. anno* *Il 136. anno* *Il 137. anno* *Il 138. anno* *Il 139. anno* *Il 140. anno* *Il 141. anno* *Il 142. anno* *Il 143. anno* *Il 144. anno* *Il 145. anno* *Il 146. anno* *Il 147. anno* *Il 148. anno* *Il 149. anno* *Il 150. anno* *Il 151. anno* *Il 152. anno* *Il 153. anno* *Il 154. anno* *Il 155. anno* *Il 156. anno* *Il 157. anno* *Il 158. anno* *Il 159. anno* *Il 160. anno* *Il 161. anno* *Il 162. anno* *Il 163. anno* *Il 164. anno* *Il 165. anno* *Il 166. anno* *Il 167. anno* *Il 168. anno* *Il 169. anno* *Il 170. anno* *Il 171. anno* *Il 172. anno* *Il 173. anno* *Il 174. anno* *Il 175. anno* *Il 176. anno* *Il 177. anno* *Il 178. anno* *Il 179. anno* *Il 180. anno* *Il 181. anno* *Il 182. anno* *Il 183. anno* *Il 184. anno* *Il 185. anno* *Il 186. anno* *Il 187. anno* *Il 188. anno* *Il 189. anno* *Il 190. anno* *Il 191. anno* *Il 192. anno* *Il 193. anno* *Il 194. anno* *Il 195. anno* *Il 196. anno* *Il 197. anno* *Il 198. anno* *Il 199. anno* *Il 200. anno* *Il 201. anno* *Il 202. anno* *Il 203. anno* *Il 204. anno* *Il 205. anno* *Il 206. anno* *Il 207. anno* *Il 208. anno* *Il 209. anno* *Il 210. anno* *Il 211. anno* *Il 212. anno* *Il 213. anno* *Il 214. anno* *Il 215. anno* *Il 216. anno* *Il 217. anno* *Il 218. anno* *Il 219. anno* *Il 220. anno* *Il 221. anno* *Il 222. anno* *Il 223. anno* *Il 224. anno* *Il 225. anno* *Il 226. anno* *Il 227. anno* *Il 228. anno* *Il 229. anno* *Il 230. anno* *Il 231. anno* *Il 232. anno* *Il 233. anno* *Il 234. anno* *Il 235. anno* *Il 236. anno* *Il 237. anno* *Il 238. anno* *Il 239. anno* *Il 240. anno* *Il 241. anno* *Il 242. anno* *Il 243. anno* *Il 244. anno* *Il 245. anno* *Il 246. anno* *Il 247. anno* *Il 248. anno* *Il 249. anno* *Il 250. anno* *Il 251. anno* *Il 252. anno* *Il 253. anno* *Il 254. anno* *Il 255. anno* *Il 256. anno* *Il 257. anno* *Il 258. anno* *Il 259. anno* *Il 260. anno* *Il 261. anno* *Il 262. anno* *Il 263. anno* *Il 264. anno* *Il 265. anno* *Il 266. anno* *Il 267. anno* *Il 268. anno* *Il 269. anno* *Il 270. anno* *Il 271. anno* *Il 272. anno* *Il 273. anno* *Il 274. anno* *Il 275. anno* *Il 276. anno* *Il 277. anno* *Il 278. anno* *Il 279. anno* *Il 280. anno* *Il 281. anno* *Il 282. anno* *Il 283. anno* *Il 284. anno* *Il 285. anno* *Il 286. anno* *Il 287. anno* *Il 288. anno* *Il 289. anno* *Il 290. anno* *Il 291. anno* *Il 292. anno* *Il 293. anno* *Il 294. anno* *Il 295. anno* *Il 296. anno* *Il 297. anno* *Il 298. anno* *Il 299. anno* *Il 300. anno* *Il 301. anno* *Il 302. anno* *Il 303. anno* *Il 304. anno* *Il 305. anno* *Il 306. anno* *Il 307. anno* *Il 308. anno* *Il 309. anno* *Il 310. anno* *Il 311. anno* *Il 312. anno* *Il 313. anno* *Il 314. anno* *Il 315. anno* *Il 316. anno* *Il 317. anno* *Il 318. anno* *Il 319. anno* *Il 320. anno* *Il 321. anno* *Il 322. anno* *Il 323. anno* *Il 324. anno* *Il 325. anno* *Il 326. anno* *Il 327. anno* *Il 328. anno* *Il 329. anno* *Il 330. anno* *Il 331. anno* *Il 332. anno* *Il 333. anno* *Il 334. anno* *Il 335. anno* *Il 336. anno* *Il 337. anno* *Il 338. anno* *Il 339. anno* *Il 340. anno* *Il 341. anno* *Il 342. anno* *Il 343. anno* *Il 344. anno* *Il 345. anno* *Il 346. anno* *Il 347. anno* *Il 348. anno* *Il 349. anno* *Il 350. anno* *Il 351. anno* *Il 352. anno* *Il 353. anno* *Il 354. anno* *Il 355. anno* *Il 356. anno* *Il 357. anno* *Il 358. anno* *Il 359. anno* *Il 360. anno* *Il 361. anno* *Il 362. anno* *Il 363. anno* *Il 364. anno* *Il 365. anno* *Il 366. anno* *Il 367. anno* *Il 368. anno* *Il 369. anno* *Il 370. anno* *Il 371. anno* *Il 372. anno* *Il 373. anno* *Il 374. anno* *Il 375. anno* *Il 376. anno* *Il 377. anno* *Il 378. anno* *Il 379. anno* *Il 380. anno* *Il 381. anno* *Il 382. anno* *Il 383. anno* *Il 384. anno* *Il 385. anno* *Il 386. anno* *Il 387. anno* *Il 388. anno* *Il 389. anno* *Il 390. anno* *Il 391. anno* *Il 392. anno* *Il 393. anno* *Il 394. anno* *Il 395. anno* *Il 396. anno* *Il 397. anno* *Il 398. anno* *Il 399. anno* *Il 400. anno* *Il 401. anno* *Il 402. anno* *Il 403. anno* *Il 404. anno* *Il 405. anno* *Il 406. anno* *Il 407. anno* *Il 408. anno* *Il 409. anno* *Il 410. anno* *Il 411. anno* *Il 412. anno* *Il 413. anno* *Il 414. anno* *Il 415. anno* *Il 416. anno* *Il 417. anno* *Il 418. anno* *Il 419. anno* *Il 420. anno* *Il 421. anno* *Il 422. anno* *Il 423. anno* *Il 424. anno* *Il 425. anno* *Il 426. anno* *Il 427. anno* *Il 428. anno* *Il 429. anno* *Il 430. anno* *Il 431. anno* *Il 432. anno* *Il 433. anno* *Il 434. anno* *Il 435. anno* *Il 436. anno* *Il 437. anno* *Il 438. anno* *Il 439. anno* *Il 440. anno* *Il 441. anno* *Il 442. anno* *Il 443. anno* *Il 444. anno* *Il 445. anno* *Il 446. anno* *Il 447. anno* *Il 448. anno* *Il 449. anno* *Il 450. anno* *Il 451. anno* *Il 452. anno* *Il 453. anno* *Il 454. anno* *Il 455. anno* *Il 456. anno* *Il 457. anno* *Il 458. anno* *Il 459. anno* *Il 460. anno* *Il 461. anno* *Il 462. anno* *Il 463. anno* *Il 464. anno* *Il 465. anno* *Il 466. anno* *Il 467. anno* *Il 468. anno* *Il 469. anno* *Il 470. anno* *Il 471. anno* *Il 472. anno* *Il 473. anno* *Il 474. anno* *Il 475. anno* *Il 476. anno* *Il 477. anno* *Il 478. anno* *Il 479. anno* *Il 480. anno* *Il 481. anno* *Il 482. anno* *Il 483. anno* *Il 484. anno* *Il 485. anno* *Il 486. anno* *Il 487. anno* *Il 488. anno* *Il 489. anno* *Il 490. anno* *Il 491. anno* *Il 492. anno* *Il 493. anno* *Il 494. anno* *Il 495. anno* *Il 496. anno* *Il 497. anno* *Il 498. anno* *Il 499. anno* *Il 500. anno* *Il 501. anno* *Il 502. anno* *Il 503. anno* *Il 504. anno* *Il 505. anno* *Il 506. anno* *Il 507. anno* *Il 508. anno* *Il 509. anno* *Il 510. anno* *Il 511. anno* *Il 512. anno* *Il 513. anno* *Il 514. anno* *Il 515. anno* *Il 516. anno* *Il 517. anno* *Il 518. anno* *Il 519. anno* *Il 520. anno* *Il 521. anno* *Il 522. anno* *Il 523. anno* *Il 524. anno* *Il 525. anno* *Il 526. anno* *Il 527. anno* *Il 528. anno* *Il 529. anno* *Il 530. anno* *Il 531. anno* *Il 532. anno* *Il 533. anno* *Il 534. anno* *Il 535. anno* *Il 536. anno* *Il 537. anno* *Il 538. anno* *Il 539. anno* *Il 540. anno* *Il 541. anno* *Il 542. anno* *Il 543. anno* *Il 544. anno* *Il 545. anno* *Il 546. anno* *Il 547. anno* *Il 548. anno* *Il 549. anno* *Il 550. anno* *Il 551. anno* *Il 552. anno* *Il 553. anno* *Il 554. anno* *Il 555. anno* *Il 556. anno* *Il 557. anno* *Il 558. anno* *Il 559. anno* *Il 560. anno* *Il 561. anno* *Il 562. anno* *Il 563. anno* *Il 564. anno* *Il 565. anno* *Il 566. anno* *Il 567. anno* *Il 568. anno* *Il 569. anno* *Il 570. anno* *Il 571. anno* *Il 572. anno* *Il 573. anno* *Il 574. anno* *Il 575. anno* *Il 576. anno* *Il 577. anno* *Il 578. anno* *Il 579. anno* *Il 580. anno* *Il 581. anno* *Il 582. anno* *Il 583. anno* *Il 584. anno* *Il 585. anno* *Il 586. anno* *Il 587. anno* *Il 588. anno* *Il 589. anno* *Il 590. anno* *Il 591. anno* *Il 592. anno* *Il 593. anno* *Il 594. anno* *Il 595. anno* *Il 596. anno* *Il 597. anno* *Il 598. anno* *Il 599. anno* *Il 600. anno* *Il 601. anno* *Il 602. anno* *Il 603. anno* *Il 604. anno* *Il 605. anno* *Il 606. anno* *Il 607. anno* *Il 608. anno* *Il 609. anno* *Il 610. anno* *Il 611. anno* *Il 612. anno* *Il 613. anno* *Il 614. anno* *Il 615. anno* *Il 616. anno* *Il 617. anno* *Il 618. anno* *Il 619. anno* *Il 620. anno* *Il 621. anno* *Il 622. anno* *Il 623. anno* *Il 624. anno* *Il 625. anno* *Il 626. anno* *Il 627. anno* *Il 628. anno* *Il 629. anno* *Il 630. anno* *Il 631. anno* *Il 632. anno* *Il 633. anno* *Il 634. anno* *Il 635. anno* *Il 636. anno* *Il 637. anno* *Il 638. anno* *Il 639. anno* *Il 640. anno* *Il 641. anno* *Il 642. anno* *Il 643. anno* *Il 644. anno* *Il 645. anno* *Il 646. anno* *Il 647. anno* *Il 648. anno* *Il 649. anno* *Il 650. anno* *Il 651. anno* *Il 652. anno* *Il 653. anno* *Il 654. anno* *Il 655. anno* *Il 656. anno* *Il 657. anno* *Il 658. anno* *Il 659. anno* *Il 660. anno* *Il 661. anno* *Il 662. anno* *Il 663. anno* *Il 664. anno* *Il 665. anno* *Il 666. anno* *Il 667. anno* *Il 668. anno* *Il 669. anno* *Il 670. anno* *Il 671. anno* *Il 672. anno* *Il 673. anno* *Il 674. anno* *Il 675. anno* *Il 676. anno* *Il 677. anno* *Il 678. anno* *Il 679. anno* *Il 680. anno* *Il 681. anno* *Il 682. anno* *Il 683. anno* *Il 684. anno* *Il 685. anno* *Il 686. anno* *Il 687. anno* *Il 688. anno* *Il 689. anno* *Il 690. anno* *Il 691. anno* *Il 692. anno* *Il 693. anno* *Il 694. anno* *Il 695. anno* *Il 696. anno* *Il 697. anno* *Il 698. anno* *Il 699. anno* *Il 700. anno* *Il 701. anno* *Il 702. anno* *Il 703. anno* *Il 704. anno* *Il 705. anno* *Il 706. anno* *Il 707. anno* *Il 708. anno* *Il 709. anno* *Il 710. anno* *Il 711. anno* *Il 712. anno* *Il 713. anno* *Il 714. anno* *Il 715. anno* *Il 716. anno* *Il 717. anno* *Il 718. anno* *Il 719. anno* *Il 720. anno* *Il 721. anno* *Il 722. anno* *Il 723. anno* *Il 724. anno* *Il 725. anno* *Il 726. anno* *Il 727. anno* *Il 728. anno* *Il 729. anno* *Il 730. anno* *Il 731. anno* *Il 732. anno* *Il 733. anno* *Il 734. anno* *Il 735. anno* *Il 736. anno* *Il 737. anno* *Il 738. anno* *Il 739. anno* *Il 740. anno* *Il 741. anno* *Il 742. anno* *Il 743. anno* *Il 744. anno* *Il 745. anno* *Il 746. anno* *Il 747. anno* *Il 748. anno* *Il 749. anno* *Il 750. anno* *Il 751. anno* *Il 752. anno* *Il 753. anno* *Il 754. anno* *Il 755. anno* *Il 756. anno* *Il 757. anno* *Il 758. anno* *Il 759. anno* *Il 760. anno* *Il 761. anno* *Il 762. anno* *Il 763. anno* *Il 764. anno* *Il 765. anno* *Il 766. anno* *Il 767. anno* *Il 768. anno* *Il 769. anno* *Il 770. anno* *Il 771. anno* *Il 772. anno* *Il 773. anno* *Il 774. anno* *Il 775. anno* *Il 776. anno* *Il 777. anno* *Il 778. anno* *Il 779. anno* *Il 780. anno* *Il 781. anno* *Il 782. anno* *Il 783. anno* *Il 784. anno* *Il 785. anno* *Il 786. anno* *Il 787. anno* *Il 788. anno* *Il 789. anno* *Il 790. anno* *Il 791. anno* *Il 792. anno* *Il 793. anno* *Il 794. anno* *Il 795. anno* *Il 796. anno* *Il 797. anno* *Il 798. anno* *Il 799. anno* *Il 800. anno* *Il 801. anno* *Il 802. anno* *Il 803. anno* *Il 804. anno* *Il 805. anno* *Il 806. anno* *Il 807. anno* *Il 808. anno* *Il 809. anno* *Il 810. anno* *Il 811. anno* *Il 812. anno* *Il 813. anno* *Il 814. anno* *Il 815. anno* *Il 816. anno* *Il 817. anno* *Il 818. anno* *Il 819. anno* *Il 820. anno* *Il 821. anno* *Il 822. anno* *Il 823. anno* *Il 824. anno* *Il 825. anno* *Il 826. anno* *Il 827. anno* *Il 828. anno* *Il 829. anno* *Il 830. anno* *Il 831. anno* *Il 832. anno* *Il 833. anno* *Il 834. anno* *Il 835. anno* *Il 836. anno* *Il 837. anno* *Il 838. anno* *Il 839. anno* *Il 840. anno* *Il 841. anno* *Il 842. anno* *Il 843. anno* *Il 844. anno* *Il 845. anno* *Il 846. anno* *Il 847. anno* *Il 848. anno* *Il 849. anno* *Il 850. anno* *Il 851. anno* *Il 852. anno* *Il 853. anno* *Il 854. anno* *Il 855. anno* *Il 856. anno* *Il 857. anno* *Il 858. anno* *Il 859. anno* *Il 860. anno* *Il 861. anno* *Il 862. anno* *Il 863. anno* *Il 864. anno* *Il 865. anno* *Il 866. anno* *Il 867. anno* *Il 868. anno* *Il 869. anno* *Il 870. anno* *Il 871. anno* *Il 872. anno* *Il 873. anno* *Il 874. anno* *Il 875. anno* *Il 876. anno* *Il 877. anno* *Il 878. anno* *Il 879. anno* *Il 880. anno* *Il 881. anno* *Il 882. anno* *Il 883. anno* *Il 884. anno* *Il 885. anno* *Il 886. anno* *Il 887. anno* *Il 888. anno* *Il 889. anno* *Il 890. anno* *Il 891. anno* *Il 892. anno* *Il 893. anno* *Il 894. anno* *Il 895. anno* *Il 896. anno* *Il 897. anno* *Il 898. anno* *Il 899. anno* *Il 900. anno* *Il 901. anno* *Il 902. anno* *Il 903. anno* *Il 904. anno* *Il 905. anno* *Il 906. anno* *Il 907. anno* *Il 908. anno* *Il 909. anno* *Il 910. anno* *Il 911. anno* *Il 912. anno* *Il 913. anno* *Il 914. anno* *Il 915. anno* *Il*

eseguirsi nell' Autunno, quando sieno imminenti le prime piogge; ma se la pioggia tarderà, dato già il fuoco, e raffreddato il terreno, sarà bene adacquarlo, acciocchè l'acqua ne fermi la cenere, ne scioglia i sali, e ne s'incorpori colla terra; e così non starassi a rischio, che venga il vento, e porti via le ceneri. Una tale industria è stata da me praticata molto uile purchè la quantità delle ceneri non sia molta, e tanta, che ne abbia poi a scottar le piante, come sopra fu avvertito.

424. La miglior maniera da praticare questa industria, sarebbe quella di cuocer la terra col fuoco di sotto; ciò, ch'è alquanto difficile ad eseguire, ma potrebbe farsi un fosso, ed in esso una volta di pietre, simile alla fornace della calce, e sopra la volta un buon strato di terra; e cotta, che sarà competentemente, levata una, e se non potrà cuocere un'altra partita, e così tutta in varie fiate. A questo proposito racconta il Pontedera, *Disert.* 2. d'aver egli veduto ciò, che praticavano alcuni Agricoltori assai periti, i quali per render fertile un campo sfruttato, fendevano il terreno in grossi cespi prima dell'està, e dopo averli lasciati cuocer dal Sole, nel fine poi dell'està gli ammontavano insieme in vari mucchi a maniera di volta, e mellevi sotto delle materie combustibile, vi davano il fuoco, e cuocevano le zolle della terra. Di costoro soggiugn' egli, ch'erano le raccolte del grano portentose: *forum autem immensa raperunt horrea messes*. Investivano quelle zolle di tanta fecondità, che per quindici anni continuati, senza mai lasciare a riposo quel terreno, per ogn'anno rendeva loro abbondantemente le biade.

425. Son più d'una le ragioni fisiche, per cui cagiona il fuoco sì gran fertilità, e le toccherà ben tutte Virgilio da buon filosofo *Geor.* 1. v. 84.

*Sape etiam steriles incendere profuit agros,
Atque levem stipulam crepitantibus urere flammis.
Sive inde occultas vires, & pabula terra
Pingua concipiunt; sive illis omne per ignem
Encoquatur vitium; atque exudat inutilis humor:
Sed plures calor ille vias, & cata relaxat
Spiramenta, neque veniat, quâ succus in erbas.*

La prima, e principal ragione ella è, che la terra s'impregna di particole sulfuree, ed ignee, le quali colla loro attività somministrano alle piante quelle occulte forze, che accenna il Porta, e che danno tutto il vigore alla pianta, e son come lo spirito suo, che la fa vivere, e vegetare. Conferma ciò molto bene il testè riferito sperimento, che 'l fuoco acceso dalla parte di sotto della terra, la feconda incomparabilmente più, che non fa il fuoco acceso secondo il solito sulla superficie del terreno: ne io vi trovo altra più acconcia ragione, se non perchè nel primo caso il fuoco di sotto investe, e penetra tutta la terra, e può ella imbeersi di tutto il suo alito, ma non così nel secondo caso, in cui per la maggior parte se ne sfuma in aria con la fiamma l' igneo vapore; laonde inferisco, che 'l fuoco rappreso, e smorzato ne' pori della terra è la principal sorgente di tanta fertilità. La seconda ragione è per lo pingue pabolo, che vi lascia il fuoco, e son le ceneri coi lor sali, da se impinguantì. La terza, perchè 'l fuoco cuoce, e digerisce qualche cattivo umore, che può trovarvisi, e consuma le ree sementi de' triboli, e dell' erbe salvatiche, che vi malcrebbono. La quarta, perchè col suo calore rinfrescando la terra, ed aprendo i suoi pori, la fa più bibula, per attrarre in maggior copia dall' aria, e portare alle radici della pianta materia, da nutrirla. Questo è quanto può dirsi per la buona-

preparazion della terra, e sarà ella così più fertile ed atta a piantarvi dentro, non che i nostri fiori, ma chechessia di più sodo provento.

C A P O .XXIX.

Del piantare.

416. **C**ercasi prima sapere il giusto tempo, e poi la buona maniera, da piantare i fiori. Intorno al tempo, sarà esso poscia meglio determinato di ciascuna specie, nel trattar che faremo della coltura lor particolare; solamente diciam qui in generale, che tutte quelle specie, le quali fioriscono nell' Inverno, o nella Primavera, piantansi nell' Autunno; cioè nel suo principio in Settembre, se 'l clima sia freddo; acciocchè prima, che arrivi il forte gelo, le piante possano trovarsi nate, radicate, e rinforzate tanto, che sieno abili a sostenerlo: ma ne' climi temperati, come il nostro, il giusto tempo della piantaggione sarà in Ottobre, e Novembre; sebbene possa farsi qualche variazione di accelerarla, o ritardarla più, o meno, secondo che vogliansi primaticci, o tardivi i fiori. Così pure possono piantarsi nell' Autunno le specie ancora, che fioriscono nell' Està, o nel medesimo Autunno; purchè sieno forti a bastanza, per reggere a' rigori dell' Inverno; e di queste se ne avranno i fiori di buon' ora prima del solito tempo, e possono anche piantarsi nella Primavera, ma faran più tarda la fioritura: tutto il rimanente, che potrebbe scapitar di condizione, o perdersi nell' Inverno, o che non abbia bisogno di lungo tempo; per dare il fiore, va piantata nella Primavera.

427. A piantare sogliono aspettarsi le prime piogge, per atturare il fuoco, concepito dal Sol estivo, il quale insieme coll' acqua può eccitar nella terra qualche violenta fermentazione, per cui vengano a patire certi germi più gentili, comechè possa quella giovare a certi altri più resistenti, per affrettarli a germinare. Quando però haffi a piantare, non sia la terra nè troppo asciutta, nè troppo molle, ma sia mezzanamente umida: perchè s' ella è secca, al bagnarsi di poi fermenta, e gonfiassi, e non avendo largo spazio, ove dilatarsi, specialmente, se stia ne' vasi, si restringe in se medesima, e fassi densa, e dura a tal grado, che quasi affoga le piante, nè si lascia facilmente penetrar dalle tenere radici, le quali perciò non vi si possono molto profondare. S' ella è troppo molle d' acqua, mal può maneggiarsi, e maneggiata s' impasta, ed indurasi pur come creta; a tal che deve cercarsi il buon punto, quand' ella sia già fermentata, e moderatamente umida.

428. Pe' fiori, che si hanno a piantare in terra, si suppongon già qui disposte le ajuele secondo il disegno, e però non resta altro, che rassettarvi dentro la terra, spianarla, e portarne la superficie, ugualissima; perchè altrimenti, se vi sieno inegualità, le radici piantate nel basso vengono a coprirsi di molta terra, la qual colle piogge scende giù dalle parti alte, e le opprime, e le piantate nell' alto vengono a perderla, e ne rimangono scoperte. La superficie può farsi piana, se 'l sito delle ajuele è alto sopra il livello delle strade, onde ne possa scorrer giù l' acqua superflua, altrimenti compongasi a tumolo, o a schiena, per dare all' acqua il pendio, come ben avvertisce il P. Rapini *Hort. l. 1.*

*Effusus ne terra iamem resaguet ad imbres,
Unde se si fando bulbos corrumpat aquosi,*

*Aggesto cliuium in modicum, paulumque tumenti,
Pendentique solo flores plantare iunobis,
Excidat ut prona tellure superfluus umor.*

429. Acciocchè le piante vengano disposte con buon ordine, e simmetria, tutta la superficie delle ajuoie dovrà dissegnarsi con linee rette, parallele, ed egualmente fra se distanti, lontane l'una d'altra circa un mezzo palmo, o ancora più, se sieno piante, che abbian bisogno fra se di maggior intervallo. Le linee potranno tirarsi colla guida di una lunga regola, e con una corda ben tesa, e vibrata sulla terra, sulla quale lascerà impresso il suo vestigio.

430. La regola generale per saper dare alle piante fra l'una, e l'altra la sua competente distanza, può esser questa: se sieno piante piccole, che nè crescono troppo in alto, nè troppo dilatano in ampiezza il lor cesto, come son Tulipani, Narcisi &c. la minor distanza sia di quattro dita, e la maggiore di sei, acciocchè non resti troppo voto il terreno, e faccia mala comparsa, come povero, e ignudo: se poi le piante sieno di maggior grandezza, e volume, a proporzion della lor mole le si darà un maggiore spazio, quanto possano abbondevolmente alimentarsi, e vestire con decoro la superficie. Acciocchè ogn'uno possa da se regolarli meglio circa la distanza suddetta, non solo per le piante da fiore, ma per tutte le altre, quante ne sono nell'Agricoltura, riduco la data regola a termini più individuali, e ristretti. La distanza d'una pianta dall'altra sia generalmente tanta, ch' elle cresciute alla perfetta lor statura, non abbiano vicendevolmente a coprirsi, sicchè vestano semplicemente il terreno, ma non l'ingombrino. La ragion fisica, ond' io cavo, esser giusta una tal regola, ella è, che deve dar-

starsi alla pianta tanto di spazio almeno, quanto stendonsi le sue radici, acciocchè le radiche della vicina non venghino a sottrarle il nutrimento: ma le radiche stendonsi per ordinario sotterra tanto, o poco meno, quanto stendonsi sul tronco in aria i rami; e però dando tal distanza fra l'una, e l'altra pianta, che i rami dell'una non vadano a coprir l'altra, sarà dato anche sotterra alle radici spazio bastevole per alimentarsi; e sopra terra ai rami aria, e largo sufficiente per la ventilazione, e per la penetrazione de' raggi del Sole.

431. Pe' fiori poscia, che s'hanno a piantar ne' vasi, la terra sia della più scelta, ed alquanto più sostanziosa di quella delle ajuole. E' ottimo, e comprovato dalla buona riuscita, il metodo in ciò prescritto dal Sig. Clarici, *Par. 2. c. 6.* e dal P. Ferrari; che si metta nel fondo del vaso, fin circa alla metà, della terra macera, e grassa; acciocchè le radici prolungate in questa terra vi trovino molta sostanza da nutrirsi: sopra di questa un suolo di terra d'ortaglia più tosto magra, e arenosa; acciocchè la radica, o il bulbo stando in questa terra, sian più sicuri, che non nella grassa, che potrebbe farli corrompere; e poi sopra di quella uno alla bocca del vaso un altro suolo di terra pingue, che anderà somministrando insensibilmente il suo grasso collo scolar dell'acqua. Vi è bisogno ne' vasi di questo alimento più sostanzioso, perchè la pianta qui vi ristretta non ha onde vivere altro, che di quel limitato alimento, che sta lì dentro, e poi le manca molto de' benefici influssi, che vengon dell'attacco con la terra del suolo. Che si diano realmente cotesti influssi, cioè gli aliti terrestri, altrove asseriti, e ch'essi meglio si comunichino alle piante attaccate al suolo, che non a quelle de' vasi, lo mo-

fra la frequente sperienza, che per ordinario quelle in piena terra pianzate riescon più sode, e vigorose, di queste de' vasi: nè io so trovarvi altra ragione più confacente, che coteffa dell'afflusso più comodo, e copioso dell'alito terrestre, che vien comunicato di sotterra, e che dalle parti convicine vi concorre.

432. Per tal ragione, sempre che si potrà, metterem le piante nel terreno più tosto, che dentro i vasi, ne quali v'è di più l'incomodo, di doverli frequentemente adquare, massime nell'està, per la maggior copia dell'umido, che traspira. Ma pure hanno i vasi i suoi vantaggi, sono amovibili, e ne' paesi freddi posson ritirarsi al coperto dentro le Conserve tutte quelle piante, che non reggono al gelo: possono i vasi tenersi inclinati, quando si teme, che la continuazion delle piogge possa corromper le piante, o per altri simili motivi: possono trasportarsi da un sito all'altro, per ripararli dal vento, o per mutar loro il prospetto, e dar loro ora il Sole, ora l'ombra, come richiede il bisogno: possono ordinarsi con simmetria, e buon ordine, o sparsi per lo giardino, o raccolti insieme a formarvi delle Piramidi, e degli Anfiteatri, ovvero in lunga serie ordinati, a far cordone ne' viali, ed in altre leggiadre guise disposti vi campeggian sempre, ed esser sogliono uno de' migliori ornamenti del giardino.

433. Per la buona qualità de' vasi richiedesi 1. che sieno ben cotti, acciò sieno più durevoli: 2. che sieno formati con giusta proporzione; la più comoda per gli usi, cioè che l'altezza perpendicolare del vaso sia uguale al diametro del suo orifizio; in tal guisa verranno di larga bocca, ed ampia: l'ampiezza della superficie giova alla terra, che così sta più esposta all'aria, e alla pioggia, e giova, per
aver

aver più spazio da meglio coltivarla; ciò che particolarmente ne' Garofani riesce più comodo, anzi è necessario, per farvi meglio le Margotte, le quali richiedono largo spazio, da poter piegare, i lunghi bracci della pianta, come a suo luogo s' insegnerà.

3. Non approvo io vasi, che si restringono in bocca, e poi dilatan la pancia, ma lodo quei, che scendono ugualmente, e si van restringendo al piede a maniera di cono troncato; perchè in questi riesce agevole il cavar, e trasplantar la pianta con tutta la terra, come sta senza niente molestarla; ed in quelli a stento può cavarfi, e bisogna tagliare intorno tutta quella terra, che n' empie la pancia con tutte le barbe, che vi si erano insinuate.

4. Sieno i vasi più tosto grandi, che piccoli, ma di grandezza moderata, tanto che possano senza grave fatica trasferirsi da un luogo all' altro, e la lor base sia più tosto larga, che stretta, per poter star fermi all' impeto de' venti.

5. Debbono esser bucati in fondo, o anche meglio di fianco, sì per non dar l'adito, da entrarvi dalla parte di sotto gli animali nocivi, Formicole, Lumbrici, Grillotalpe, e simili; come ancora perchè spesso avvien, che 'l sedimento della terra ne ottura il buco, e l' acqua superflua, non potendovi permeare, corrompesi, e guasta la pianta.

Ovunque però sia il buco, o sotto, o immediatamente sopra il fondo, sia più tosto largo, che angusto, quanto entrar vi possa un dito della mano, ad evitare il pericolo, che mai si otturi.

Per ultimo è da avvertire, che i vasi nuovi tengansi per qualche giorno nell' acqua, prima di mettervi dentro la terra, affin di estinguere in essi quel fuoco, o alito sulfureo, che seco menano dalla fornace, il qual riesce alle piante pernizioso.

434. La suddetta preparazione de' vasi, e delle

ajuele, debbesi far preventivamente con la mira; e col riguardo alla qualità delle piante, che si vorran piantare; dacchè altre aman la terra grassa, ed altre la magra, altre la forte, altre la tenera, e debbole, altre godon del sito umido, e ombroso, ed altre del secco, e solatio; e però fa duopo preparar loro la terra, e destinarle il sito, più convenevole. Generalmente parlando, può qui dirsi, che a' bulbi convenga la terra men grassa, più sciolta, e più leggiera, e 'l sito più tosto fresco, ed ombroso alle radiche e tuberì la terra alquanto più grassa, e più soda, e 'l sito più esposto al Sole; ma pure vi son le sue eccezioni, da darsi a' suoi luoghi particolari. Di più nella piantaggione debbesi aver la mira alla fioritura, cioè piantando con tal disegno, che il giardino, al fiorire abbia a far di se vaga mostra per l'ordine, per la simmetria, per la varietà, e per la corrispondenza delle spezie de' fiori, e de' lor colori; ciò, che si rimette al buon gusto del fiorista: ed acciocchè tutto ad un colpo d'occhio possa goderli bell', e fiorito il Perterra, le piante alte, e fronzute si mettan sempre negl' ultimi confini dietro alle basse, per non coprirle, e per servire colla loro verzura, come di fondo oscuro, che faccia maggiormente risaltare il bel colore de' fiori di quelle, che le stan davanti; così pure coll'ordin medesimo i testi più grandi vadan dietro a' più piccolì.

435. Per le radiche, bulbi, tuberì, e piante, che non saran per fiorire in quell'anno, si destini qualche ritaglio di terreno, che stia fuori del disegno, come deve farsi per lo semenzajo; perchè farebbe sconcio alla vista quel sito voto di fiori in uno spianato tutto gajo, e fiorato: oltre di che conviene ancora per altri motivi, tener segregate dalle più adulte tutte le piccole piante; sì perchè le grandi

di le aduggiano sotto la lor ombra , sì perchè le piccole han bisogno di qualche cura particolare ; tra le quali una è , che la lor tenerezza , come di bambine , richiede un latte più dilicato , e la lor gioventù un alimento più abbondante , e sostanzioso , cioè terra fertile , e ben crivellata , tenera , e grassa , siccome il sito proprio per loro debb' essere umido , e fresco .

436. I diligenti Fioristi tengono notate in ben ordinato catalogo tutte le differenti spezie , e tutte le varie razze de' proprj fiori ; ciò che serve non solamente , per saperli ben disporre con ordine , nel piantarli , ma per altri comodi usi ; pe' quali segnano con numeri , o con altro distintivo le ajuole , ed i vasi , e notano nello stesso catalogo il luogo , ove son piantati ; e ciò serve per poter dare qualche cura speciale alle razze più scelte , o a quelle , che particolar coltura esigono ; e serve per saper , onde pigliare i rampolli , e le intiere piante , per darne ad altri , che della tal razza dimandano , o per moltiplicarle a conto proprio , e serve per poterne meglio dimandar conto da' Giardinieri , e render loro più difficili i fatti , quando alcuna ne manchi . I vasi possono segnarsi o con la lima , o meglio con numeri coloriti ad olio , per essere indelebili , o come altri fogliono , con laminette di piombo conficcate sulla terra de' vasi , ciascuna col suo numero inciso .

437. La nota medesima deesi conservar da un anno all' altro , per saper qual gener di fiori vi sia stato in ciascuna ajuola , o vaso nell' anno precedente , affine di non ripiantarvi di quello stesso , ma d' altro gener diverso . Conciossiachè si sa per isperienza nella coltura degli ortaggi , ed in tutta l' Agricoltura , che in quel terreno ov'è stata una pianta , non vi

alligna bene un'altra della medesima specie, ma ben vi nasce una di specie differente: così la vigna nuova non può piantarsi immediatamente in quel terreno, ond' è stata tratta la vecchia, se non dopo alcuni anni, che quella terra sia stata a riposo: così ad un campo, dopo che ha faticato a nutrir le biade, bisogna dar qualche anno di riposo, prima di tornarvi a seminar la stessa biada: ma pure i terreni effettivamente non riposan mai; perchè non cessan mai di produrre o erbe salvatiche, o altre dimestiche, che noi vi seminiamo; e sol riposano rispettivamente, cioè rispetto a quella tal specie di pianta, e di questo riposo hanno essi certamente bisogno: perchè ogni pianta tira il sale, e 'l sugo a se conveniente, e lascia intatto il resto più confacevole, ed omogeneo per le altre specie; e quindi la terra dopo aver lungamente somministrato il sale, e 'l sugo proprio di una specie, ne rimane spogliata, ed impoverita sì, che non ne ha più, per nutrir quella specie medesima, sebbene ne tenga di altra qualità, per somministrarlo ad altre specie differenti; e però bisogna dare alla terra il tempo, per rinfrancarsi, e riguadagnar quella tal sorta di sale, e sugo già consumato.

438. Par, che siensi date sin' ora tutte le più importanti prevenzioni, per poter venire all' esecuzione di piantar già i fiori. Al ben eseguirlo, come conviene, il primo avvertimento sia, che vi assista il Padrone, per regolar questa, ch' è forse l' opera di maggior rilievo nel mestier de' fiori, e per impedire i furti, che in tal occasione soglion succedere, mentre si hanno le radiche alle mani. Nel piantare non si metta mai nè piede, nè ginocchio dentro le ajuole, per non calcarne la terra; e perciò si è prescritto nel disegno del giardino, che le ajuole non sien più larghe di quel, che possa stendersi
il

il braccio dell' uomo dalle strade laterali, per arrivar fino al mezzo. Deve prima guardarsi, ove abbia l'occhio la radica, per metterlo sopra, e poi tenendola fra due dita coll'indice, e l' pollice, colle restanti tre dita strette insieme a maniera di paletta, scava la terra, e vi si mette dentro la radica. Discendo a questa minuzia, perchè i giardinieri usano di pigliar fra le punte di tutte le dita insieme la radica, e con essa premendo il terren morbido la approfondano; ciò che io non approvo; sì perchè forzano la radica, e tal volta trova ella duro, e si maltratta, o si rompe; sì perchè con quella pressione vieu calcato il terreno, e perde la morbidezza li, ove più importa, immediatamente sotto la radica. Altri prevalgonfi del Piantatore, come sta in uso negli orti, il qual comprime alquanto meno la terra, ma gettando la radica poi dentro la buca fatta, non si sta ficuro, che vi cada coll'occhio in alto: a questo male però truova pronto il rimedio la provida Natura; rovescia in giù le radici, ed in sù rinversa il germoglio con egual facilità, e per quel che ne appare, senza notabile incomodo della pianta. E' volgare questo fenomeno, ma pur è tanto ammirabile, e tanto difficile a spiegarsi, che forse non se n'è trovata sin' ora la vera ragion fisica, e come s'industri di assegnarne più d' una il P. Regnault *Tom. 3. Fraten.* 1. pure il mio intelletto non n'è interamente appagato, nè altra ne sovviene a me, che lo appaghi.

439. La profondità, alla qual debbonfi sotterrare le radiche, i bulbi &c. è varia, e dipende dalla lor mole: se son piccole, non van messe più sotto di tre dita, come si fa con gli Anemoni, Ranuncoli, ed altri di piccola cipollata; e se son di maggior mole, van messe più sotto, massime i bulbi,

ma per ordinario non più di sei dita: il tutto poi cuopresi di terra, e se ne uguaglia la superficie. Se il tempo non promette pioggia, e se ne vorrà accelerar la nascita, potrà la terra innaffiarsi pian piano, finchè ne farà competentemente inumidita: i vasi, che hanno il comodo da potersi trasportare, sarà utile che tengansi in luogo fresco, e poco dominato dal Sole, finchè sian nate le piante. Per i Tulipani Persiani, e quelli altri rossi primaticci, che qui chiamano Pavoni, darassi a luogo l'avvertenza, di preparar loro al di sotto un terreno duro, e battuto, o anche coperto di mattoni, acciocchè non vadano a perdersi sotterra.

440. Possono ben mettersi in una medesima ajuola, o in uno stesso vaso, quando sia grande, più specie, e generi differenti di fiori, o per capriccio di varietà di colori, e di forme, o per aver sempre fiorito tutto il giardino, piantando insieme quelli diversi generi, che van fiorendo successivamente l'uno dopo l'altro per tutte le stagioni dell' anno. Però in ciò fare due pericoli occorrono, ed uno è, che si sfrutti la terra, col farla continuamente faticare in tante varie produzioni; e però debb' ella essere ben sostanziosa, e deve al fin dell' anno tutta cambiarsi, o ben conciarsi per rinvigorirla: l' altro pericolo è, che potranno incontrarsi due sorti di piante eterogenee, come ne son molte, le quali stando vicine, mostrano sì chiaramente la lor nimistà, che l' una opprime l' altra, o che la fa morire, o che la infievolisce. E' celebre la nimistà fra il Ranuncolo, e l' Anemone, fra la Rosa, e la Fice, fra il Cielamine, ed il Cavolo, fra la Cicuta, e la Ruta, fra la Fava, e l' Orobanche &c. e però tali piante, di cui l' esperienza, o la ragione mostrerà, che

che sien frà lor contrarie, s' hanno a tener segrete.

441. Che ancor le piante insensate patiscano le proprie antipatie, non è ciò senza fisica ragione; perocchè altre d'alta statura fan uggia cattiva alle vicine colla grand' ombra, e questo basta per ammorbare; altre hanno la proprietà di stender le radici che ne' confini altrui, ed inferir le sue radici fra le radici dell' altra pianta, e avviticchiarsi, e strangolarla, o almeno rubarle il nutrimento, come ne parla Teofrasto: *Rapiunt enim alimentum suo am-
plo discursu, implexuque necant. De Caus. Plant. l. 3.
c. 15.* Altre son d' indole troppo vorace, ed ove tengano al fianco piante, le quali non si nutriscono dello stesso alimento omogeneo al suo proprio, le lascian vivere in pace; ma se sian di quelle, che vivon del suo medesimo sugo, e sieno egualmente voraci, e possenti, scambievolmente distruggonfi, o pure nel caso d'inequal forza, chi può più, vince, ed abbatte la più debole: *Planta indolis non unius,
et succo diverso alenda, amica conjunctione gestiunt.
Gemini enim pradones terram insident in mutuum perniciem: Verulam. Sil. Sil. Centur. 5.* Per questo capo comunemente assegnato da moderni Filosofi, credesi, che l' Ranuncolo insievolisca, o uccida l' Anemone vicino; perchè entrambi son voraci, e sfruttano assai la terra; ma il Ranuncolo, ch' è più corpulento la vince, e tira a se il sugo con perdita dell' Anemone.

442. Con tutto ciò io oso aggiugnere al lor savio parere, che fra le ragioni fisiche dell' antipatia d'alcuni vegetabili v' entri ancora qualche alito cattivo, che vada alla vicina pianta, e possa riuscir dannosa ad una sorte di pianta, e ad un'altra no. Il motivo, che ho di pensar così, è il riflettere,

T. II.

V v

che

che due piante della specie medesima, come due Ranuncoli, egualmente voraci, e poderose, entrambe vegetano prosperamente accanto in sullo stesso terreno, ed ambedue vi trovano bastantemente sugo, e sussistenza, con tutto, che l'una, e l'altra succhino l'istessa qualità di sugo omogeneo. Se dunque due Ranuncoli vi trovano il suo competente alimento; benchè ambidue voraci; perchè col Ranuncolo non ve lo troverà l'Anemone, forse del Ranuncolo men vorace, o che almeno non esige tanta copia di cibo, per essere men corpulento? Per questo motivo pare a me, che debba cercarsi altra cagione dell'antipatia, in certi casi almeno, come questo qui dell'Anemone col Ranuncolo; e che possa ricorrersi a qualche maligno effluvio, che arrivi dalla pianta inimica alla vicina antipatica, e l'avveleni. E' cosa certa per altro, comprovata con isperimenti, ch'ella è molto grande la quantità dell'alito, che mandan fuori le piante con la continua traspirazione; e nel caso particolare del Ranuncolo coll'Anemone, può fondarsi presunzione contra il Ranuncolo, che avveleni l'Anemone col suo alito, essendo il Ranuncolo di sua natural qualità caustico, e velenoso.

443. Terminato il piantamento, se potrà restare alcuna porzione di radici &c. sarà bene a conservarle per qualche mese, finchè sian nate le piante, affin di riempirne i luoghi voti, ove mai siasi qualche radica imputridita. Ma perchè queste piante poi verrebbon tardive, e le tardive per lo più riescono men buone, potrà farsi in quest'altra guisa, planteremo alcune radici al giusto suo tempo in luogo separato, e queste qui saran destinate a riempire i luoghi voti, e con sol traspantarle, e metterle ove mancano, sarà levato lo sconcio, che vi
fa

fa la mancanza, e si avran tutte di ugual taglia le piante per maggior venustà delle ajuole.

C A P O XXX.

Del traspiantare.

444 **E**lla è operazione troppo violenta lo fradicare una pianta dal suo nativo solo, con cui erasi glà imparentata, e strettamente abbracciata, per trasferirla in altro terreno, e farvela abbarbicare, e però qualche volta vi si perde la pianta, quando non si sappia ciò eseguire, o ella almeno quasi sempre qualche detrimento vi patisce. Non vi patirebbe niente, se si potesse cavar intera con tutto il pane della terra, a cui stanno attaccate le radici, senza romperne alcuna: ma in molti casi o non può ciò riuscire, o è sol opera di molta perizia, e diligenza, la quale siam qui per suggerire. Per le piante, che son ne' testi, riesce più facile a poterle cavar intere; ma per ciò fare, bisogna, che la terra o sia molto asciutta, o molto bagnata; perchè l'asciutta sarà duretta, e al cavar della pianta non si staccherà dalle barbe; e così la bagnata sarà viscosa, e tegnente, per quanto basta a trar fuori la pianta con tutto l'intero pane della terra; ma essendo sol mezzanamente umida, si sconcerterà facilmente al cavare, trasportare, e riporre a suo luogo l'intero cesto. Allora dunque con un chiodo, o altro ferro, competentemente lungo, e sodo andate scavando intorno intorno alla parete del vase fino a tanto, che rovesciando il cesto sossopra, e scotendolo alquanto, si stacchi, e se ne venga fuori tutto intero il pane, riparandolo con le mani; e

scavato lo con destrezza, lo riporrete nella buca già preparata, senza che la pianta possa patirvi minima lesione.

445. Meglio, e con più agevolezza, otterrebbe questo medesimo, se si facesser lavorare dal Vaso alcuni testi, spaccati in due metà dall'alto, al basso, e poi commessi; e legati intorno con funicelli, i quali vasi faran destinati a questo fine di mettervi quelle piante, che dovranno poi trapiantarsi; e con sol tanto slegare, e separare le due metà del testo, avrassi speditamente tal, qual era, e come stava la pianta; per ripostarsi a suo luogo. Pur sarà cosa ottima, d'imitar la pratica, che oggi giorno costumasi per lo sicuro trapiantamento degli alberi: mettonsi i piantoni da principio dentro corbelli pieni di terra, e le nostre piccole piante possono piantarsi in cestelle fatte di giunco, o panier di verghe &c. e quivi nate, e cresciute, senza punto incomodarle, fatta in terra la buca, ove si vorran collocare, vi vi si ripongon dentro con tutta la cesta, o il paniero, e si ricuopra di terra.

446. Però a cavar sana, ed intera dal terreno la pianta, riesce non poco difficile; per ragion, che quivi ella non avendo limiti circoscritti, come nel vaso, stende ampiamente le barbe, nè si può fare a meno, nello scavar della terra in giro, di non mozzarne le cime; e di più suol profundar molto sotterrando il tronco principale della radice, e raro è il caso, che questo ne venga su intero; senza nè romperlo, nè maltrattarlo: ma cotesta è la sua parte più importante, e senza di quella, par che la pianta, debba perder molto del suo vigore; dacchè le barbe laterali facilmente rimettonsi, quando resti sano il tronco, ma rotto il tronco, vi passa del tempo, a potersi rimettere, seppur non muoja. Qui sta dunque

que la maggior importanza, ed in ciò è da metter-
si la prima cura, a cavar profondamente, e larga-
mente la terra, per far sortire sano, ed intero tut-
to il corpo della radice, con tutte le sue braccia,
fino alle ultime barboline.

447. La cautela prescritta, di cavar tutto inte-
ro il cesto, ella è soltanto necessaria per certe pian-
te particolari troppo delicate, e gentili, delle qua-
li mostra l'esperienza, che patiscano danno sensibi-
le per ogni leggier disturbo, che le si arrechi, nel
rimoverle dal nativo suo letto, e tali son per lo più
le piante a fiore, ed io ne ho speriencia certa ne'
Ciani, ne' Ranuncoli, negli Anemoni, ed in più al-
tri: laonde per coteste tali dee procurarsi di evi-
tar tutte le volte, che si potrà, il traspiantamento,
o di farlo con la predetta cautela. A questo fine,
ho delineato nella Tavola 2. fig. 11. lo stromento
proprio da poter cavare intiera, come sta la pianta
con tutto il pane della terra, qual la rapporta il
P. Ferrari. E' formato di una latta di ferro, lun-
ga circa un palmo, larga poco più di mezzo palmo,
alquanto incurvata, e fornita del suo manico, non
guarì dissimile alla Cazzuola de' Muratori, la qua-
le può anche servir benissimo a questo medesimo uso.
Si caccia in terra lo stromento profondamente per
quanto paja, che arrivi fino al chiodo della radice,
e con esso tagliasi tutto in giro il pane, e alla lar-
ga tanto, che si stia sicuro di non tagliar le bran-
che delle radici, eccetto che non fosser ceste lon-
tane, ed estreme code de' capellamenti; ed all' ul-
timo collo stesso stromento già profundato si fa forza,
e si leva su la pianta con tutta la massa della ter-
ra, e vassi a riporla nella buca destinata.

448. Però per certe altre piante, facili ad ap-
pigliarsi non è necessaria tutta questa cautela, anzi

con-

corre opinione, che sia cosa giovevole, e praticasi molto comunemente nello traspiantar alberi, ed erbe d'ortaggi, di troncare a bella posta, e cimar tutt'intorno le barbe della radice: così la sentiva tra i molti il Sig. della Quintinie, che passa per un oracolo tra gli autori di Agricoltura, a cui si hanno delle molte obbligazione per la sua perizia: potava egli alla disperata le radici degli alberi, al riferir del Sig. Pluche *Spett. d. Nat. Tom. 3. Dist. 6.* appena ve ne lasciava due, o tre, e queste pure le scorticava in maniera, che non le teneva più lunghe di dieci, o al più dodici oncie. Però alcuni Dilettanti di prima sfera, tra quali il Sig. Normand, tanto il padre, quanto il figliuolo, amendue successori del Sig. de la Quintinie, dopo aver fatte con tutta la maggior diligenza delle replicate sperienze, han trovato, che un albero trapiantato con tutte le sue barbe, purchè sian sane, fa molto miglior riuscita, e cresce con più vigore, e prestezza d'un altro postogli accanto, a cui sieno state lasciate poche radici, e queste assai corte. E se mai è accaduto il contrario, hann' osservato, che quasi sempre v'era stata qualche cagione sensibile di questo disordine, e che ciò non era mai provenuto dalle radici. Sebbene dunque non sia del tutto necessaria per molte piante la prefata cautela, però ella è sempre cosa più utile, a non incomodar per niente la pianta, o per lo meno, che si può, massime nella radice, lasciandole tutte quante le barbe con suoi capellamenti, purchè sian sane, cioè a dire non iscortecciate, non ammortite, e non intarlate: imperocchè allora non sì tosto avran esse principiato a barbicare, che tramanderanno indubitatamente alla pianta più succo, e più pascuolo, che non farebbono, se fosser cimate. Non è prudenza, defraudare

un albero (per mezzo di certe regole difficili, e per lo più stiracchiate) delle radici, mentre si brama, ch'egli ne butti, e stare in tanto all'aspetto d'una cosa, che attualmente si possiede, come savia-mente conchiude il citato Autore, seguendo Teofra-sto, che il cimar delle radici chiama sciocchezza: *Sulsum est amittere radices, quas habemus, ut acqui-ramus novas.*

449. Quel cimare delle radici, che qui vietasi nel trapiantare, prescriveasi come utile, o necessa-rio per le rame, e per le foglie, sgravandone la pianta di tutte quelle, che parran superflue: il che però non s'intende per quelle, che si trapiantano con tutto il suo pane, le quali potran lasciarsi in- tatte, dacchè non si è per loro innovato altro, che il mero sito; ma parlasi per tutte quelle, che si son cavate ignude, e molto più se le radiche v'ab- bian sofferto qualche inevitabile detrimento: que- ste, primachè si rinfranchino del danno patito, e prima che le radiche s'imparentino con la nuova terra, non han quasi puoto di lena, per alimentar tanta gran famiglia di rame, e foglie; e però la pratica ci ha insegnato, a scoronar gli alberi affat- to, o almeno a potarli assai corti, e per pari ragio- ne a sgravar le nostre piante a fiore di quel poco al- meno, che si potrà; mentre non ci è permesso d'ordinario lo scoronarle affatto, senza pericolo di perdervi la pianta, ma sollevarle qualche braccio men principale, qualche porzion delle foglie, e scortarne le cime.

450. Acciocchè poi la pianta meglio, e più pre- sto s'imparenti col nuovo suolo, mettasi nel fondo della buca un poco di terra sciolta, sottile, e mor- bida; le radici disponganfi larghe, e le si dia la lor naturale estensione, acciocchè abbia per se cia-

scena il suo spazio, onde tirare il sugo, senza rubarlo alla compagna: quindi vi si sparga sopra dell'altra terra sciolta, e sottile, per coprirla, e poi se la pianta lo ami, un poco di concime, il qual potrà all'ultimo coprirsì ancor di terra. Alcuni usano di preparare un letto di concio in fondo alla buca, ma per più ragioni, come dice il Sig. Pluche, chi ha fior di senno non lo fa mai: imperocchè i fali, che scendon sempre all'inghiù, essendo più bassi delle radici, non apporterebbon loro verun giovamento. Le radici poi trovandosi fasciate da una materia fecciosa, che presto si putrefà, correrebbon pericolo d'imputridirsi fra quel marciume ancor esse. Oltre di che il concime impedisce, che la terra non si accosti, e combaci perfettamente colle barbe, e lasciavi nel dilatarsi de' vacui, dove i capellamenti non potendo far presa, s'affaticano in vano, e languiscono, o eziandio sen muojono. Ma non così fa il letame, o qualunque altra sorta di concio, con cui le piante si governano al piè a fior di terra: perchè allora i lor fali, e i lor succhi discendono tutti alla volta della radice, e le apportano del gran giovamento. Ne' paesi freddi hanno parimente in uso, (come praticasi ne' Paesi montuosi della Romagna cogli Agrumi) di formarvi al piè una sovraccoperta di stabbio, che serve insieme per nutrimento, e per riparo, così del freddo, che potrebbe assiderar la pianta, come da Nebbioni pestiferi, che varrebbero a soffocarla, allorchè sopraggiungono i primi caldi.

451. Se la pianta è di radici dure, e sode, coperta ch'ella è, vi si calca la terra con le mani, o anche co' piedi, se fosse arbore, per farla più d'appresso accostare alle radici, e poi vi si versa sopra una buona quantità d'acqua, la quale stempera, e
scio-

scioglie la terra, e ne trasporta seco la parte più sottile, e la incorpora con le barbe. Ma per le piante piccole di radice tenera, come esser sogliono le nostre da fiore, io disapprovo il calcar della terra, perchè si renderebbe dura, ed impenetrabile alla tenerezza delle radici: anzi si ha da procurar sempre di mantenerla soffice, e morbida. A questo fine avverto, che dovendosi adacquare la pianta, subito che sarà posta in terra, non devesi l'acqua versar tutta di botto in una volta, nè con impeto, perchè strascinerebbe seco molta terra, e la renderebbe densa, e dura, e le farebbe perdere la morbidezza; ma si versi con man bassa, e leggiera, pian piano col'innaffiatojo, e prima sene metta un poco, che non penetri più di un dito, e si lasci alquanto risposare: poscia si torni a versarne altrettanto, e così interpolatamente, dando il tempo all'acqua, finchè penetri più alle radici. In questa maniera ottenghiam, che la terra sene rimanga dalla parte di sotto sempre morbida per tutto l'anno; dacchè farà ella nella sola superficie una crosta duretta, e resistente all'impeto dell'acqua, quando in avvenire sarà innaffiata.

452. Il tempo opportuno per trapiantare, se sia pianta cavata con tutto il pane, può esser di qualunque stagione, ancor d'Estate: ma in altro caso il tempo proprio è dal principio di Novembre fino al fine di Marzo al più tardi, cioè nelle stagioni fresche, prima che cominci a dominare il caldo: e però si avverte, a tener la pianta per qualche tratto di tempo difesa dal caldo sole, finchè paja, che siasi appigliata; ciò, che dovrà molto più osservarsi, o quando sopravvenisser giorni caldi, o quando la necessità ci forzasse a trapiantare in stagione tutt'ora calda. Colle piante vecchie, o in-

fermicce se non si osservino appuntino le date precauzioni, si corre rischio di perderle.

453. Le novelle, che cavansi dal semenzajo, per dividerle, slargarle, e riporle ne' siti lor destinati, non potendosi d'ordinario trarre con tutto il pane ad una ad una, cavansi a molti insieme, tagliando un tocco di terra: quindi se la terra non è troppo secca, e dura, nè troppo molle, e tenace, ma sol' umidetta, e sciolta, scuotendola pian piano, se ne cadrà giù da se, e resteran le ignude radici, per poterle poi distrigare con destrezza, senza mica romperle: ovvero in qualunque caso, per distaccarne la terra, s' intridano in vaso d'acqua, e quivi stemperata la terra con un poco d'agitazione, e coll'ajuto delle mani, tutta subito si staccherà, e monde lascerà le radici. Finalmente i piantoncelli, di cui parliamo, hanno da trapiantarsi in età competente, quando non sieno nè piccòli tanto, che ancor la barbicola sia corta, e poco abile a sostentarli; nè tanto adulti, che la barba sia già troppo lunga, e mal possa cavarli sana, ed intatta; e però sarà il piantoncino nella sua giusta età, quando gli convenga con proprietà il nome di Barbatella, qual chiamasi da' Toscani.

454. Con tutto che siasi detto già sopra, che la maggior parte delle piante a fiore perdano di condizione col trapiantarle; ve ne son però alcune, che vi fan guadagno, come dirò a suo luogo delle Rose, delle Violè, delle Malve doppie arboree, e de' Garofani: anzi il Rajo *L. 1, Cap. 20, Hist.* citando il P. Laurembergio dice, che quando i Garofani nati di seme riescono semplici, col trapiantarli poi nell'Autunno, e di nuovo alla Primavera veggente, strappandogli per quell'anno tutt' i fiori, divengano doppij. Se ciò sia vero, nol so, e peno

a cre-

a crederlo; ma pur è vero, che le piante facili a radicarsi, e quelle ancora cagionevoli, che patiscono col trapiantarle, quando però sieno cavate cautamente con tutto il pane, senza mica incomodarle, ricevon sensibile giovamento: a motivo che, sfruttata che sia la terra del primiero sito, trasferite in un altro, trovano qui altra nuova sostanza, onde nutrirsi, e si rinvigoriscono, e vi fanno aumento: e però a quelle, tratte con tutto il pane, oltre che di sotto preparasi un letto morbido di buona terra, e grassa, levasi d'intorno, e scuotesi tutta quella terra, che si può senza lor molestia, per rimettervela nuova, e sostanziosa. Questa medesima industria deve praticarsi, per rinovar la terra a tutte quelle piante, che durano più d'un anno, e si lasciano nel primo lor sito, cavandole intorno quanta terra si potrà, senza grave offensione delle radiche, e rimettendone della nuova, e pingue. Per l'assegnata ragione, trapiantando con le prescritte circospezioni, sarà verissimo il detto di Teofrasto per tutte generalmente le piante, che tutte profitino col trapiantamento: *Omnia translata meliora, grandioraque sunt. Hist. plant. L. 7. C. 5.*

C A P O XXXL

Del governo, che dovrà farsi delle Pianta.

455. **T**Erminata che sarà la piantagione, mentre aspettasi la nascita delle piante, se correran giorni caldi, far' cosa giovevole, come si è avvertito, che i tessi movibili si tengono in luogo fresco; perchè tutte,

le piante per nascere , anno spezial bisogno del freddo , e dell'umido . Nate poi che sono , dovranno esporli al Sole , non già per tutto il giorno , come pur si è detto , ma più tosto si mettano in sito , ove godan del Sole per una metà del dì , o almeno per alcune ore , massime nell'inverno , quando ne hanno il maggior bisogno . Sino all'intera nascita si tenga sempre moderatamente unida la superficie , acciocchè il tenero germoglio , che vi spunta , non debba far violenza , nè scambievolmente riceverla , per romper la dura crosta , che vi si forma , quando la terra è asciutta . Però dopo la nascita , non solo non è più necessario , di tener bagnata la superficie , ma è anzi spediente , di andarla mantenendo più tosto arida ; e giova eziandio di tanto in tanto , avvezzar la pianta , a sostenere la sete , differendole l'adacquamento , finchè non dia segno , che cominci a languire . Che giovi questa spezie di crudeltà , me l'ha mostrato più volte la sperienza , molte piante si perdono per lo troppo adacquare , particolarmente se sieno gracili per infermità , o tenere di prima nascita , come ne darò pruove , e farò per avvertirlo con ispezial premura de' Garofani . N' è la ragione , che l'acqua stagnante corrompesi , e corrompe seco la pianta , massime s' ella sia debole , o in altra maniera disposta alla corruzione ; e l' tenerla a dieta di tanto in tanto , fa che digeriscasi , e' vapori la rea uliginè per lo troppo umido contratta .

456. Colle piante nobili nascono sempre insieme le vili erbe , e se non s' abbia cura d' estirparle , s' ingrasseranno dell' alimento , dovuto a quelle , e con la moltitudine , e grandezza loro ingombrandole , le opprimeranno : ella è questa una delle principali cure , che debbe aver il giardiniere , ma pe-

es-

esser la più tediosa, più volte vien trascurata. Bisogna andarle continuamente estirpando, e per tre volte almeno dare una ripassata generale a tutto il giardino in tre differenti tempi, ne quali tornano a forger l'erbe cattive: oltre la detta prima mano, che nasce insieme nell'Autunno, ne spuntano altre nel decorso dell'Inverno, e poi le ultime nella Primavera. Con quelle della prima mano può usarsi da principio qualche connivenza di tollerarle, finchè le piante domestiche sieno tutte nate, e cresciute alquanto, s'elle sien delle piccole, nate da seme; per lo riguardo di non incomodarle, e smuoverle dal loro sito, come avverrebbe, anzi protterebbonsi sveller collo sconvolgimento, che si fa della terra, nello strappar le salvatiche: quindi strappansi queste poco di poi, quando parrà, che le domestiche abbiano profundate le radici, quanto lor basti per tenerse salde. Per quanto si potrà non si permetta mai al salvatico, che cresca molto, e si fortifichi; ma pur quando convenga di dover strappare una pianta già cresciuta, e per la sua vicinanza intrigata colle radici della domestica, ci vuol dell'arte a svellerla, senza che questa ne venga smossa, e sconcertata. L'arte sta in questo; piegate dal canto opposto la domestica colla mano sinistra, e con essa ne afferrate il tronco, premendo intanto fortemente il pane intorno della terra, per tenerlo fermo nel suo sito, e nell'atto medesimo, con la destra, afferrato il tronco della salvatica, fate violenza in contrario verso la banda opposta, per isradicarla.

457. L'erbe posson levarsi, o zappettando col sarchiello, o strappiandole colle sole mani; ed acciocchè ne vengano con tutta la radice, per le più tenaci scavasi un poco la terra intorno al piede, ed afferando il capo della stessa radice, ne verrà ella

fino

sopra, o tutta intera, o almeno non resterà parte alcuna del tronco, che possa ripullulare. Il tempo da estirpar l'erbe non è, nè quando la terra è troppo bagnata, perchè allora la radice si tira dietro tutta la gleba della terra, e ne sconcerta le piante, nè quando è troppo arida, e dura che resiste al cavamento della radice, ma quando ella è moderatamente umida, e più arrendevole. Sopra tutto abbiasi cura sempre, di spiantar l'erbe estranee, prima che compiano la lor semenza, altre delle quali la maturano eziandio nell' Inverno, e sulla fine, come i Muschi, e Lichetti, ed avvegnachè non mancheranno i venti, di portarne altronde delle altre, pur farà un gran risparmio di fatica per lo seguente anno, quando vi manchino quelle moltissime, che sarebbon quivi cadute su 'l proprio suolo, se vi si fosser compiute. Nè solamente le ajuele, ed i tetti debbon tenersi netti, e puliti dalle mal' erbe, ma parimente le strade, e tutto il ricinto del giardino, tanto per la pulizia, quanto per lo pericolo, che v'è della rea semenza, la quale agevolmente spargesi, e va ad infettare il terren colto.

458. Le piante malsane sopra di se hanno altresì del cattivo, e del superfluo, di cui debbon essere ripulite: tutto quel, che vi si truova di marcio nelle radiche, di guasto, di secco, di gialliccio, di appassito, e smorto nel tronco, ne' rami, e nelle foglie, o si riseca fino al vivo, o strappasi, ma senza squarci, ed ove convenga per la gravetza del taglio, se ne medicchi la ferita col solito impiastro. Il guasto, se non levissi, propaga il contagio nella parte vicina, e tutto ciò, che vi ha di vizzo, squallido, e secco, poichè la Natura lo abbandona, gli si leva, non sol come superfluo, e di mala apparenza, ma perchè ingombra inutilmente la pianta, e

se impedisce di goder liberamente dell'aria, e del Sole; e lo mostra l'esperienza, che liberata da quel ingombro, cresce sensibilmente più lieta. Con quelle piante, che sfoggiano in molta copia di fiori, bisogna usar coraggio, a strapparne una buona quantità, subito che si veggan spuntare, senza lor dare tempo da crescere, per la ragione, che sona per dire. Se ne lascian tanti, quanti ne possa la pianta secondo il suo vigore comodamente allevare, e portar pingui, e ben nutriti, senza che sia obbligata a sforzarsi; e si lascian sempre i primi, e principali, levandogli d'attorno i secondari, e laterali, che riescon più piccoli: ma dovendo perdonarla ad alcuni di cotesti, si lascino i più bassi, e più lontani dal primario, che sta in sulla cima; perchè così resterà per questo più lungo lo stelo, e di più farà esso molto meglio nutrito, poco men, che se fosse rimasto solo: i più bassi, come ultimi a nascere, trovansi allora piccolini, e come tali han bisogno di poco nutrimento, laonde può per allora la pianta impiegarlo quasi tutto alla nutritura del primogenito. Questi per lo motivo medesimo subito che sarà maturo, si coglierà, e così gli altri di mano in mano, acciochè la pianta ne venga sgravata, e l'alimento ne venga con più abbondanza ai succedenti fiori contribuito.

459. Per due ragioni convien alleggerir la pianta, quando va carica di molti fiori, ed una è l'accennata, cioè per far riuscire belli, e grossi que pochi, che gli si lasciano. L'altra ragione più importante è la conservazion della medesima pianta, la qual mettesi a rischio di perderla, o d'indebolirla tanto, che divenga sterile, senza dar più fiori, o molto pochi nell'avvenire. Così mostra l'esperienza in ogni genere di pianta, o sia da fiore, o si

da

da frutto; e questa ragione noi abbiamo assegnata nel Cap. 22. n. 311. come la più principale, parlando pella perdita, che fa di delle bellissime razze di Ranuncoli, e di altri generi, venutici dalle semenze; perchè ci lasciam vingere dalla vanità, di veder gaja, e ricca di molti fiori la pianta novella, nè ci sappiamo indurre, a sgravarela. Così pure gli alberi, se tutti que' fiori, di cui si caricano concepiscano il frutto, e si mantengano, o se ne muojono nel prossimo Inverno, o restano così spollati, ed inabili, che cessan di fruttare per più d' un anno; e però in tal caso di molta carica il provido giardiniere deve andar strappando colle sue mani (come fu detto nel citato luogo) i fiori o le frutta, mentre tuttavia son piccole, lasciandone una quantità alle forze dell' albero proporzionata.

460. La vera ragion fisica di ciò può esser questa: la pianta per la nutrizione del fior, e frutto, che sono il suo ultimo fine, par che si svisceri; v' impiega realmente i sughi più forbiti, e più vitali, ch' ella in certi vasi particolari va raffinando, e preparando per tutto l' anno: con tai sughi sostiene essa pure la sua vita, ma quando vadano a competenza la vita della madre, e della prole, o che la prole sia molta, o che la vital sostanza sia da se poca, e non sia bastevole per entrambe, la suol fare da madre amorevole, che per conservar la vita ai figli, tutto per essi consuma il nutrimento, e per se o non ne trattiene niente, o assai poco; e per ciò o sen muore, o ne rimane per lungo tempo estenuata. Che sia ciò vero, cavatelo di quà: volete perduta una vigna? non la putate; ed i lunghi tralci si caricheranno di molti grappoli, per nutrire i quali ne resterà oppressa la vite. Non poche spezie d' alberi fruttano un anno sì, ed un altro no, come
 son

son gli Ulivi , Meli &c. e perchè mai han bisogno di un anno di riposo? se non per riparar le forze consuete, e gir riacquistando nuova sostanza, e prepararla, e compartirla poi alle frutta, che faran per nascere? Se mai avvenga, che una brina gagliarda abbruggi, e secchi le gemme, ed i fiori, nel primo lor sbucciare, ovvero li abbattano le grandini, ed i venti tempestosi, ripullulano è vero le seconde gemme, ma senza i secondi fiori, o con pochi fiori deboli, ed infecundi, che appena maturano alcun frutto. La ragione di tale infecundità non può esser altra, come ben pensa l'ingegnoso Pontedera, che 'l consumo già fatto nella produzione de' primi fiori di quella vital sostanza, che dicevamo, la qual raccogliasi, e preparasi in certi vasi particolari, e consumata una volta, ci vuol del tempo a ristorarla; e per tal mancanza i secondi fiori, o non rinascono, o riescono sterili per la debolezza. *Omnis enim fere peculiarium vasorum succus in primis germinibus floribusque explicatis consumptus fuerat. L. 1. C. 36.*

461. L'assegnata ragione, com'è verissima a riguardo de' fiori, e delle frutta, così è ingannevole, e falsa, applicata alle foglie, di cui si veste la pianta: grav'errore commetterebbe in Agricoltura chi si volesse guidare sullo stesso principio, che per motivo di voler sgravata la pianta, le strappasse le foglie, sulla falsa idea, che quel sugo, ch'ella impiega a nutrir le foglie, possa risparmiar, ed impiegarlo più utilmente a nutrire i fiori, e le frutta con maggiore abbondanza. Più d'uno si è ingannato, ed è restato deluso da questa falsa presunzione, avendo di poi mostratq l'infelice successo, che spogliata delle foglie, vi patisce la pianta, i fiori vi riescono squallidi, e le frutta vi restano acerbe,

e perd' ella il vigore di maturarle. Uno di tali eventi raccontato viene da Cristiano Wolfio *Dissert. De Pomæ ex trunco arboris enato: Comment. Acad. Petropol. Tom. 8. ad ann. 1736.* Pochi anni addietro, dic' egli, una persona male istruita nella Teoria della vegetazione, e nella pratica dell' Agricoltura, spampand' totalmente una sua vite, pensando che l' uva stando così più esposta al Sole, dovesse più presto, e molto meglio maturarsi; però restò delusa la sua aspettazione, e con sua meraviglia succedè tutto al rovescio, rimanendo i grappoli acerbi, come che la stagione correffe calda, e favorevole alla maturazione.

462. Ella è comune opinione de' Naturalisti, fondata sulla ragione, ed esperienza, che 'l sugo, il qual viene indigesto dalle radici, mentre spandesi, e diramasi per tutte le foglie, quivi si raffina, e purifichi, e quindi vada poi digerito, ed attenuato ne' sottilissimi canali de' bottoni de' fiori, e delle frutta. Le ragioni, che ciò persuadono hanno dell'evidenza. 1. Perchè tutto ciò, ch' è nella pianta, fu ordinato dal Creatore alla produzion del fiore, del frutto, e del seme, come a suo ultimo fine, secondo che fu divisato altrove nel primo Trattato; e però le foglie non sono un mero inutile ornamento, ma debbono insieme servire al detto fine da mezzi, e da istromenti principali, come principale arredo son esse della pianta. 2. Perchè delle radici si fa l' uso, a che servono, e son fatte a succiar l'umore, qual viene dalla terra, confuso, e crudo, e per farne la prima digestione, e segregazione: del tronco, e de' rami si fa pure, che servono a dar passaggio ai differenti fluidi, e viapù cuocerli, e purgarli con nuove secrezioni; nè resta altro mestiere, a cui debbono esser deputate le foglie, se non che

a dare agli umori l'ultima mano, come son esse le ultime a riceverli, assottigliandoli, e raffinandoli tanto, che possano servir di nutrimento prima a se, e poi di là distribuiti a tutto il corpo della pianta, e la porzion più fina, e scelta alle gemme, a' fiori, ed alle frutta. 3. Dalle sperienze del Sig. Stefano Hales nella *Statica de' Vegetabili* viene ad inferirsi delle foglie un altro importante uso, ed è, ch'essendo esse molto porose, esala col calore del giorno dalle bocche aperte de' lor pori, e canaletti molta quantità d'umore; e con ciò, e con la dilatazion, che fa il calore, de' canali per tutto il corpo della pianta, viene ad eccitarsi un moto universale per tutto il fluido, il quale ascende sin dalle radici, per occupare il luogo già dilatato, ed accorre a riempiere il voto, che lascia il fluido, dalle foglie svaporato. Al contrario di poi la notte dalle aperte bocce fuccian le foglie l'aere, ed insieme l'umido della rugiada, l'uno, e l'altro impregnati di que' sali, e di quelle particelle, che feconda rendon la pianta di fiori, e frutta. Alle addotte ragioni corrisponde poi appunto l'esperienza suddetta, che sfrondata la pianta, o periscono i fiori, ed i frutti, o vi riescono mal condizionati; ed al contrario lasciandole tutte le foglie, i suoi fiori son più robusti, ed i pomi più saporiti.

436. In un sol caso permette la buona Agricoltura, di poter levare qualche parte delle frondi, quando una pianta sia tanto fronzuta, che non lasci penetrare i raggi del Sole, per riscaldare, e far maturare le frutta, come praticasi colle viti novelle, le quali lussureggiano troppo in pampane, e se lor non si levi una parte di quel ingombro, i grappoli se ne raftano acerbi: ma per le nostre piante da fiore non si dà quasi mai 'l caso, di doverle

sfrondare, se non sol per levar loro le frondi vizze, o invecchiate. Occorrerà più tosto di dover tagliare, o strappare interi rami, polloni, e polloncelli; come si pratica in Agricoltura, potando, e sgravando la pianta di tutto ciò, che parrà superfluo, e che non vale ad altro, che a sforzarla, per allevarlo inutilmente, se vi lasci: ma pure in questo affare medesimo bisogna andar cautelato, per saper discernere il superfluo, ed inutile dall'utile, e necessario. Come le foglie servono alla buona nutrizione della pianta, de' fiori, e delle frutta, così i rami, e le parti legnose servono almeno a far la prima digestione degli umori, ed a dirozzarli preventivamente, prima che vadano a raffinarsi nelle foglie; e però, come avvertisce il Sig. Pluche, son da levarsi le verghe, ed i polloni, che nascono dal tronco, ed i rami falsi, così detti, perchè nascono in certi luoghi fuor d'ordine, e non foglion dar fiori, e frutti; ma son da lasciarsi i rami, che vengon su a luogo proprio, e forgon vegeti, e vigorosi, ancorchè non sien per dare frutti, e fiori almeno per allora, ma li daranno poscia, ed intanto serviranno a' rami fertili per la preparazion degli umori.

464. Finalmente occorrerà tal volta, di dover anche recidere qualche parte delle radici, quando la pianta ne abbonda tanto, che per la copia del molto nutrimento ne va tutta in rigoglio di rami, e foglie, senza dar fiori, e frutta. A tal sorte d'alberi, che non dan frutto, questo è l'rimedio, provato giovevole da' periti Agricoltori; e questo medesimo rimedio prescrive il P. Ferrari per le nostre piante; così vuol, che facciassi coll' Anemone, il qual non rare volte, quando il rubero è troppo grosso, e polente, sfoggia in sole foglie; ed allora con-

vien

vien romperlo , e dividerlo in più pezzi , per costringerlo , a dar fiori , pe' quali si richiede un umor più cotto , e raffinato , e 'l poco umore , che può trarre la radice smembrata , può venir su meglio digerito , che non il molto , che traeva l' intera .

465. Resta ora a parlar dell' inaffiar , e zappar le piante , che son le due principali cure del buon governo . Della buona , o mala qualità dell' acqua da inaffiare sen' è già discorso , e rimane a dir del tempo ; e della maniera di farlo . Non è mai tempo opportuno , mentre la terra è calda ; perchè fermenta coll' umido , e scotta le piante ; sicchè per adacquare bisogna o prevenire il calor del Sole , o aspettare , che dopo il suo tramontare siasi refrigerata la terra .

466. Ma nell' Inverno non è sempre necessaria la prescritta cautela , quando è rimesso il calore , anzi ne' Climi freddi si differisce l' adacquamento dopo due , o tre ore , che sarà nato il Sole , quando non vi sia pericolo più , che l' acqua geli intorno alla pianta ; e però in cotesti paesi non s' inaffia la sera , perchè quell' acqua col freddo notturno accrescerebbe il gelo . Non così però nell' està , e ne' climi temperati , o caldi , sarà sempre più giovevole l' adacquar di sera , acciocchè la pianta già languida , e stitibonda dal sostenuto calore , possa subito ravvivarsi , e coll' umido , che attrae per tutta la notte , abbia il tempo , da ristorar le perdute forze .

467. La maniera d' inacquare sul terreno , essendo acqua corrente , non è altra , che quella praticata negli orti d' erbaggio ; e per inaffiar le piante ne' vasi , è presso a poco quella , prescritta per l' inaffiamento delle semenze Cap. 24. n. 345. badando principalmente , a non versar l' acqua con impeto , nè tutta in un luogo , acciocchè non rompa la crosta

sta della superficie, e non iscavi la terra, e poi l'ad-
densi; e però bisogna tener bassa la meno, e mover-
la continuamente. A questo fine sarà sempre meglio
prevalersi dell'innaffiatojo col becco sottilmente bu-
cherato, il quale ha un altro comodo uso, di po-
ter versar l'acqua a maniera di pioggia sopra la
stessa pianta, per levarla della polvere, e tutta rin-
frescarla. Se che il Clarici *Cap. 9. par. 1.* avver-
te, e che la pianta non deve mai esser bagnata
nell'innaffiarla, spargendovi l'acqua, senza toccar
né fusto, né foglie; ma dee ciò intendersi per
l'Inverno in paesi rigidi, ov'è pericolo, che vi ag-
geli l'acqua, sparfa di sopra, come ancora lo accen-
na il P. D'Ardenne *pag. 124.* però in altri tempi si
è provato, che riesce molto profittevole il bagnar
le foglie, ed anche il tronco, così delle piante ter-
ragnole, come delle arboree: Lavando frequente-
mente, (dice il Sig. Hales, *Stat. Veget. C. 4. Esper.*
42.) i tronchi degli alberi men vigorosi, si è sa-
puto farli uguagliare, ed ancor superare gli altri al-
beri lor coetanei: Ed io, (soggiugne il Sig.
Miller) ho soventemente sperimentato utilissimo, il
bagnar la sera la cima degli alberi, e di lavare, e
nettare con la scopa tutta intorno la scorza del tron-
co. Per le sperienze dello stesso Hales succia-
no le foglie, e 'l tronco quell'acqua pe' medesimi
pori, onde n'esala gran copia d'umido col calore
del giorno, o almeno otturati dell'acqua i pori, e
ristretti dal freddo, nova sostanza non si dissipa.

468. Nell'Està particolarmente, e nel tempo del-
la fioritura esigono le piante più frequente l'adac-
quamento; e se 'l padrone non invigili, sarà facile,
che 'l giardiniere lo trascuri, o lo faccia di rado,
o a tempo indebito, o in maniera impropria; v. g.
per risparmiarsi la briga, di dar acqua ai vasi ogni
gior-

giorno, come dovrebbe, tutto in una volta li carica di tant' acqua, che abbiano a star sazj per più giorni; ma è pur vero, che come le piante languiscono per la sete, così sazie più del bisogno s' infermano, e tal volta ne muojono. Non conviene, dice il P. d' Ardenè, se non qualche rara volta, anche in tempo di caldo, di versar tanta quantità d' acqua ne' vasi, che abbia ella a scorrer dal fondo: non può sperarsi alcun buon effetto da cotal profusione, ed ella riesce ordinariamente pregiudizievole; sì perchè l' acqua, che n' esce, porta seco i sali, e la parte più tenue dell' alimento, e di più la terra, così stemperata fermenta, e l' acqua, stando come morta per più giorni, si corrompe, e la pianta ricuopresi di pallor mortale, e vi può morire. L' ho detto, e torno a dirlo, che i Fioristi troppo assidui a dar acqua alle piante, ne uccidono un maggior numero, che non fanno i giardinieri trascurati, col negarle la quantità bisognevole. Si badi particolarmente a non essere indulgente in dar acqua alle piante ingiallite, infermicce, ed invècchiate, perchè peggiorano, e può sol giovarle, come agl' infermi la dieta, e' la sete: e si badi per fine, che non si otturi il buco inferiore, onde ha da scolar l' acqua superflua; e se abbondino le piogge, sarà bene chinare i vasi dalla banda opposta, onde soffia il vento.

469. Intorno all' altra principal cura delle piante, ch' è di zapparle, sen' è detto il giovamento, e sen' è data ragione, perchè tanto giovi il lavorarle intorno la terra nel cap. 28. n. 413. e seg. e qui resta solamente a dire della maniera di farlo. Dovrem farchiellarle tutte le volte, che vedrem rinate l' erbe cattive, acciocchè mai non rubino loro l' alimento, siccome pur tutte le volte, che la superficie della

terra si vedrà fucida, e ricoperta di nocevol muschio per la troppa umidità : giacchè quel viscido fucidume, che tutta cuopre le superficie, proibisce all'aria, e al Sole l'ingresso sotterra, ed alla rea uligine impedisce l'adito, onde poter svaporare; e però allora sarà ben cosa utile sventar la terra, zappetandola col farchiello, proprio per la coltura de' fiori, delineato nella Tav. 2. fig. 13. Ma ove questo per la foltezza delle piante non possa penetrarvi agevolmente, o si avrà un farchioncello, come un rampinette, o sarà sempre comodo, e pronto all'uso un semplice chiodo, il qual può insinuarsi in ogni angusto intervallo.

470. Vicino al pedale della pianta si smuova, e ricambj la terra, nè si scavi altro, che superficialmente, ove siavi pericolo, di romper le radiche, o smuovere dal suo sito la pianta: ma negl'interstizj più larghi sarà lecito, e ben proficuo di scavar più a fondo: che se con tutta la diligenza, che farà per adoperarsi, qualche radichetta se ne romperà, ciò ch'è inevitabile; sarà però sempre maggior del danno l'utile, che ne tornerà; e come alle grandi piante sempre giova la zappa, e nel zapparle profondamente, per più giovarle, non può evitarsi la frattura di qualche radica; pur è certo, che 'l giovamento è maggiore del nocumento; e con quella coltura la radica recisa presto rinfrancasi, ed in altre più vigorose si moltiplica; così avvien delle piccole piante, le quali allegransi molto sensibilmente della mossa del terreno, e pigliano vigor tale, che veggonsi crescere a momenti. Dalla piantagione fino al tempo della fioritura possono zapparsi almeno due, o tre volte, e l'ultima volta poco prima, che spuntino i fiori, e non già nel tempo medesimo, che
fiori-

florifcono; perchè in quell'atto debbono confiderarfi come le pregnanti, e parturienti, cui riefce incomode ogni lieve difturbo, e fe la paffan meglio, lafciaandole nel lor placido ftato di quiete. A quefto riguardo, fe di due piante nate infieme nel medefimo ceppo, una che riefca di cattivo fiore, farà fubito da eftirparfi, configliano i periti giardinieri a tagliarla più tofto da piede, acciocchè non fiorifca, fe lo eftirparla debba cagionar qualche confenfo alla vicina, mentre ftà in fiore.

C A P O XXXII.

Come abbiano a difenderfi le piante da' venti, dal caldo, dal freddo, dalle piogge, e dagli animali nocivi.

471 **T**Rattafi ora di guardar le noftre piante da tutti que' danneggiamenti, che potran patire dagli Agenti eftranci; e prima bilogna difenderle da' venti impetuofoi, o in altra guifa necevoli; e però fi è prefcritto nel Cap. 2. che nella fcelta del fite per lo giardino de' fiori s'abbia quefto riguardo, ch'è 'uno de' principali, cioè che non fia efpofto a tal forte di venti: ma quando pur non ci venga fatto, d'averne un fite a noftro grado, o bilogna tollerarne il danno, o dar mano a certi ripari che coftano fpefa, e fatica. I Fiorifti appassionati in quefte, e fimili congiunture, fan ritirare i vafi al coperto di qualche fpalliera, muro, o conferva, ed altri tengono preparati ripari di ftuoje, di tele, di cannecci, o anche di tavole, de' quali arnefi prevalgonfi pure a difender le piante da

T. II. Z z cal-

caldo, e dal freddo, ove sieno per lo eccesso dannosi. Almeno per tenerle salde dalla forza del vento, posson legarsi a bastoncelli, fitti nel terreno; ciò, che dovrà farsi indispensabilmente per tutte quelle, che di sua natura son di gambo alto, e fievole, le quali hanno uopo di appoggio.

472. Ma è più importante la difesa dal freddo per que' Paesi, ove quello domina con rigore straordinario. Nel nostro clima assai dolce anziché utile, riuscirebbe dannosa la difesa dal freddo, di cui han bisogno, per meglio fortificarsi le piante vernali, e raro è il caso, che arrivino a gelare i vasi, eziandio nelle nostre contrade più frigide. A proposito mi ricordo, ch' essendo entrato nel Giardino Reale di Palermo per vedervi le piante, che seco avea menate Sua Eccellenza il Sig. Vicerè, trovai che l' suo Giardiniere Franzese seriamente faceva preparare una stanza con suoi tavolati, per quivi ritirar, e ripostare i vasi in tempo di freddo. Non lasciai d' ammonirlo, che quì non eravamo in Parigi, ond' egli avea portate le sue idee della coltura, e che in vece di far prò alle sue piante, le farebbe grave danno, privandole di quel grande ajuto, che ricevono dal freddo in questo clima, dove i venti caldi, che spiran talora nello stesso cuor dell' Inverno, le fan languire. Ma il buon uomo, fermo nelle sue idee, non volle dar orecchio al sincero consiglio; e tosto, che vidde comparir la neve sulle montagne, ricoverò i testi nella Conserva; ma presto si accorse, d' aver rovinate le piante alla muffa, ed al mortifero pallore, di cui viddele ricoperte. Sicchè per climi caldi, o molto dolci, come questo, si hanno le piante a riparar sì dal caldo, ma non mai dal freddo.

473. Di più nè in questi climi, nè in qualunque

que altro, ancorchè rigidissimo, dovrà impedirsi, che vi cada sopra la neve; anzi se i testi si trovaser ritirati nelle Conserve, allora mentre nevica, dovrebbero estrarsi all'aperto, per non fraudar le piante di quel gran prò, che fa loro la neve, ch'ella è realmente una grassura, che manda il Cielo, meglio nutritiva d'ogni altra, che abbiamo in terra. Tal' è il sentimento concorde di tutt' i periti dell' Agricoltura, fondato sulla continua, e costante esperienza, soggiugnendo il Clarici C. 10. p. 1. 2. Anzi di comune consenso asserivano i giardinieri, che lasciandosi le vanezze in tempo di neve coperte, di modo che la neve non le tocasse, li bulbi, e particolarmente le radici, quasi poste in ghiaccio, la maggior parte perirebbero, come pur troppo ho veduto succedere nel giardino di un Nobile Cavaliere. Quel che nuoce alle piante, non è la neve, ma son le notturne gelate, che vengono a Ciel sereno, quando poi la mattina vi sopravenga il caldo Sole; e nuocono i venti Boreali, quando menano freddo tale, da far gelare la terra stessa de' vasi. Alla brina notturna, o sia gelata può rimediarsi, con bagnar la pianta coll' innaffiatojo, per iscioglierne il gelo, prima che s'alzi il Sole; sebbene nel nostro clima, anche nelle Città di Montagna, ove cadon frequente, e dense le brine, non mi son mai accorto di grave danno, che apportino alle piante vernerecce. Ma in altri climi più rigidi, come nella Lombardia, ed in tutt' i paesi Boreali, la necessità costringe per tutta l' Invernata a tenere i vasi dentro le Conserve, ed a coprir le ajule con tavole, stuoje, tele, capanne, ed altre simili coperture.

474. Le Conserve sieno ampie, alte, ariose, esposte al mezzo di, difese da Tramontana, e sieno asciutte, niente umide, abbiano molte aperture, per po-

ter dare di giorno la necessaria ventilazione, da chiudersi poi la notte, e ne' giorni umidi, e freddi. Le migliori, dice il Clarici, son le foderate di tavole, che non son calde, nè fredde; poi chè le ordinarie di muro in tempo dello sgelare, esalano alle volte certi vapori nocetvolissimi alle piante, vedendosene alcuna perire senza saperne la causa. Ne' giorni tiepidi dovranno i vasi cavarli dalla conserva, per farli godere dell'aria aperta, essendovi pericolo, che collo star lungamente chiusi, possano ammuffare, e generar Muschi, e Licheni, e le piante si corromperanno. Ma nell' esporli al Sole, procedasi con la riserba, che non passino immediatamente da un' estremo all' altro, da un gran freddo ad un gran caldo: così quando un vaso si trovasse gelato, procurisi di farlo disgelare pian piano, e quasi da se, portandolo in luogo di tepidezza; così nel primo bel tempo non bisogna tosto esporre le piante a campo aperto, come avverte Clarici sulla pratica della sua Lombardia, ma prima si porranno in altro luogo, coperto a guisa di portico, o loggia per tutto Aprile, e di là poi nel giardino circa il primo di Maggio; perchè, dice egli, sovengono in questo clima de' freddi di Primavera, peggiori di quelli d' Inverno, dovendosi per ciò star a vedere quello, che fa il Cielo.

475. Per quelle piante poi, che reggono alquanto più al freddo, e stan piantate nel terreno, come Anemoni, e Ranuncoli, come anche per quelle da bulbo, o sia cipolla, le quali non temono il gelo, fuorchè i Narcisi, e gli Ornitogali, se non v'abbia il comodo, da tenerle coperte con le nominate stuoje, capanne, casse di legno, e simili; alcuni usano di gettarvi sopra uno strato di paglia, o letame, o ritagli di corna, le quali cose non piaccio;

no al P. Ferrari *L. 1. c. 2.* per esser facili a produrre vermi, e perchè son rimedj, che hanno del ffordido; altri le riparan con muschio tratto da pedali degli alberi all' altezza d' un palmo; ed il Laurembergio *L. 4. c. 35.* loda le spazzature, e foglie secche delle Zucche, come quelle, che a priova fatta resistono in particolar maniera al freddo, e preservano da ogni nocumento: ma meglio d' ogni altro riparo, dice il medesimo, è l' Alga marina, la qual oltre al difender le piante dal freddo, senza mai farle congelare, le seconda mirabilmente per lo sale, che seco mena dal mare, come ragiona Verulamio *Sil. Sil. c. 5. Virtus ad salcin referenda magno fertilitatis adjumento.*

476. I ripari descritti per lo freddo son quasi tutti applicabili, a difendere le piante dal caldo, e dalle piogge, ove abbiano dell' eccessivo. Un buon rimedio, sempre pronto contro anche del vento, sarà il chinare i vasi, e coricarli su di un lato a ritroso del Sole, o del vento; ma il miglior riparo, e più universale a preservar le piante, ed i fiori da tutti gli agenti estrinseci, ed anche da' rigori del freddo, pare a me, che sia il tener grasse vote in tanta quantità, quante ne abbisogneranno, e con quelle coprìr le piante, ovunque sieno o nel terreno, o ne' vasi; essendo cosa facile ora a coprìrle nel tempo cattivo, ed ora a scoprirle nel propizio. Così noi usiamo, per riparare dal caldo qualche pianta eletta, o quando vogliam ritardarne la fioritura con tenervi sopra rovesciata una grassa in giorno, scoprendola poi la notte. Sulla traccia de' suggeriti ripari potrà l' ingegnoso giardiniere pensarne altri, che giusta le circostanze potran riuscirgli ancor più facili, e più utili al suo intento.

437. Resta ora a dar riparo al gran male, che fan-

fanno alle piante gli animali nocivi, i quali sono fra gli Agenti estrinseci forse i più micidiali, massime che appena trovasi contro di loro alcun efficace rimedio, e son tanti di numero gl'insidiatori, che mal se ne possano contar le specie, non che gl'individui senza numero. Per nominare i principali, san guasto alle nostre piante i Cani, i Gatti, i Sorci, gli Uccelli, le Talpe, le Grillotalpe, i Lombrichi, le Formiche, i Grilli, le Cavallette, le Lumache, le Ruche, e Bachi, le Scolopendere, che chiamiam i Centopiedi, le Forbici, le Porcellette, i Gorgogli, e più altri Insetti di nome ignoto. Oltre a questi, che son come inimici comuni per tutte le piante a fiore, vene ha degli altri, che fan guasto in certe particolari specie, de' quali parleremo nella particolar costura delle medesime.

478. A ragionar prima de' Cani, Gatti, e Sorci, egli è un dubbioso Problema, se sia più dannoso, che utile, a tener Cani, e Gatti nel giardino de' fiori, cioè i Cani per guardia contra de' ladri, (e i ladri ancora meriterebbero luogo onorato fra il ruolo degli animali più nocivi, e sol per decoro dell'umanità non vi si annoverano) ed i Gatti contra la infestazion de' Sorci. Vi è grande necessità di tenerli, ma non è piccolo il danno, che soglion farvi: l'innata lor pulizia gli obbliga a nascondersi sotterra le proprie immondezze; ed a ciò fare con minor fatica, ovunque veggon terra morbida, di profuso lavorata, là sen vanno a grappare, e scavan radici, e piante, e tutto mettono a scompiglio, massime ove sieno piante piccole, e guai al Semenzajo, se incappi nelle loro branche. I rimedj che posson suggerirsi pe' Cani sono, di tenerli incatenati la notte, ed in tutti que' tempi, ne quali non può il giardiniere badar sopra di essi: d'avvezzar-
da

da piccoli, e non metter mai piede sul terreno colto atterrendoli; e quando poi sien colti su 'l fatto, li stesso batterli, ove hanno scavato; e questo medesimo terrore sarà pur profittevole pe' Gatti. Ma per gli uni, e per gli altri gioverà molto, tenere in luogo opportuno, ed ovvio un mucchio di terra, o arena asciutta, ove possano andare a sgravarsi il ventre: possono anche cingersi intorno le grasse, e le ajuole di canne aguzze, o tenersi coperte di spine, e d'incannucciate stesevi sopra, come ho fatto io, finchè crescan le piante, e cuopran da se il terreno.

479. Il più corto rimedio sarebbe di non aver bisogno di loro; ma pur se la sicurezza del sito ci dispensa sovente dall'obbligo di tenere il Cane, quasi mai si dà il caso, che possano stare i fiori senza la guardia de' Gatti. I Sorci in pochi giorni, che mancò il Gatto, mi divorarono da 30. grasse di Rannuncoli con perdita di tutte le radici: senza Gatto non possono tenersi specialmente i Garofani, nè può sperarsene la semenza, di cui sono avidissimi i Sorci; così è de' Tulipani Persiani, le di cui cipolline scavano fin sotterra per divorarle, e così di più altri. Ma, dite voi, contra i Sorci non vi son cento altre maniere per liberarsene? Sì vi son trappole, balestre, e più altri ingegni di varie fogge, e vi son tossichi efficacissimi; ma pure senza il Gatto non istà mai sicuro il giardino, ove concorrano i Topi da tutte le bande ad interbranchi, e per molti, che se ne uccidano, ne restan sempre molti per danneggiare: la sola presenza del Gatto è un sì potente sconjuro, che anche morto gli atterrisce, e tien lontani: seppur sia vero ciò, che scrivon più Autori, che per fugare i Topi, basti

ezian-

eziandio tenere in quel luogo una pelle di Gatto piena di paglia, che lo tenga vivo.

480. Del resto per chi volesse prevalersi del tossico, lasciando le molte ricette, che prescrivon gli Autori, l'arsenico mescolato con pasta, e zuccherato è 'l più approvato dall'uso; ma si badi bene, ad evitare il pericolo, che v'è, di avvelenare i Cani, e Gatti di casa, o anche i ragazzi, e talvolta l'intera famiglia. Per chi volesse più utilmente adoperar le trappole, quelle son da preferirsi a tutte le altre, le quali posson pigliar più sforzi ad una volta, l' un dopo l' altro: tal' è una cassetta di legno, il di cui coperchio è situato a maniera di trabocchetto; dacchè circa la metà della sua lunghezza si regge sopra due perni, talmente equilibrato, che 'l peso del Sorcio lo fa traboccar giù da quella sola parte, ove sta fissata l' esca, e 'l Sorcio irrimediabilmente vi sdrucchiola, e cade nel fondo della cassetta; ma il coperchio, che prepondera un pochino dalla parte opposta, risale da se un'altra volta al suo sito, e rifà sempre l' istesso giuoco per tutt' i Sorci, che soprayengano. Un'altra di queste trappole mi fu suggerita da persona, che ne avea fatta l' esperienza: pigliasi una brocca di terra, e per entro alla sua bocca applicasi un cerchio di legno, o di fovero, intorno al quale stan conficcati tanti fili di ferro lunghi, ed in punta ben aguzzi, che vanno insieme a riscontrarsi circa la metà della profondità della brocca, ma che pur lascino qualche piccola entrata al Sorcio, e collo stesso entrarvi si dilatino per la pieghevolezza, in quella maniera medesima, come son fatte le nasse de' Pescatori, in guisa che il Sorcio può francamente penetrar dentro, ove sta l' esca, ma non può escirne, arrestato dalle punte aguzzate, che lo feriscono. Vi si metton per esca.

no-

nocci , nocciuole con alcuni pezzi di carta , e tali altre cose , che mosse facciano dello strepito , e se si ha un Sorcio vivo , per mettervelo dentro , al rumor , che farà questo , o quel primo , che v'incap- perà si assicureran poi tutti gli altri , che accorre- ranno allo strepito ; e mi attestava detta persona , che in luogo , ov' erano molti Sorci , arrivava quasi ad empierfene la brocca .

481. Degli Uccelli sono quasi soli a far danno i Passeri , specialmente alle semenze di fresco nate , a' Garofani , e Ranuncoli , smozzicandone le foglie , e'l cuore , e se son polloncelli , non ancora ben ra- dicati , li spiantano . Con questa mala razza astutis- sima poco si profitta col vischio , colla trappola , e cogl' inganni : sono in uso i spaventacchi di stracci neri , e le sonagliere fornite di velette , che gi- rano mosse del vento ; ma il più , che gli atterri- sce , e li tien lontani per qualche tempo , è l' ar- chibuso , di cui deve il giardiniere frequentemente valersi . Nell' Inverno , quando non trovan di che sostentarfi , allora sen vengono a far danno alle no- stre piante , ma in altri tempi non sogliono mole- starle .

482. Le Talpe , Grillotalpe , e Lombrici danneg- gian sotterra , o che rodon le radiche , e bulbi par- ticolarmente de' Tulipani , o che smuovon le piante , le rovesciano , ed anche le spiantano , se sien pic- cole , mentre travaglian di continuo a solcar la ter- ra con mine , e gallerie sotterranee . Nel nostro Re- gno s'iam liberi per quel , che so , dalla molestia del- le Talpe , nè io quivi le ho mai vedute , nè sento , che altri le sappia . Lasciando da parte i veleni , ed altri tentativi , riferiti dal P. Ferrari , per uccider- le , la più sicura forma , dice il Clarici , sarà lo sco- prire la via fatta da loro , cioè ove sia la terra .

sollevata in mucchiotti, e quivi, come prescrive il Ferrari, accostar con piè leggiero, perchè la Talpa di squisitissimo udito non senta, e se ne fugga, ed osservar con lunga pazienza, finchè vegga-si in qualche luogo muover la terra, ove lavora; allora dando un gran colpo colla zappa, o colla vanga, verrà ella cavata fuori con tutta la terra, e percotendola sarà morta. Può anche ucciderfi, tenendo pronto alla mano un legno col capo armato di chiodi acuti, e con quello dar un colpo forte sulla terra, che si vede muovere, ne resterà ella trafitta. Potrà pure collocarsi fortemente la terra, ove ha fatta la strada, che porta alla sua tana, e poste due cannuce, conficcate alle due estremità della strada calcata, stare ad osservare, quand' ella viene, o dall' uno, o dall' altro capo di strada, ove sia la tana, e suol venire al levar del Sole, o su' l' mezzogiorno, o verso la sera, e trovando quivi otturato il passo, vien costretta a scavare, e 'l giardiniere, che ne sta all' osservanza, vedrà muover la cannuccia, e farà il detto poc' anzi, per ammazzarla.

483. Per pigliarne molte insieme con inganno piacevole, prescrive il Ferrari, che prendasi un vaso di terra invetriato, e profondo un palmo, e mezzo, e si sotterri in un fosso sino alla bocca, rasente terra, o più basso, ed in quello mettersi una Talpa viva, la qual non potendo scappar di là, alza le strida da disperata: accorrono le vicine Talpe, o per darle ajuto, o per lo cieco amore, che ve le tira, massime nella Primavera, quando attendono alla generazione, ch'è il tempo proprio, per farne caccia più copiosa; e come son da se cieche, e guidale il cieco amore, vanno a cadere anch' esse in fondo al vaso. Con le grida di molte insieme cresce il piangisteco, e sentono ancor le lontane, e

fi raunano tutte, e tutte vi restan prese; facendo-
vi il giardiniere due guadagni, uno del danno ces-
sante, che cagionerebbono queste bestiuole, e l'al-
tro del lucro emergente; poichè ne vendono le
pelli, le quali per la nerezza, e morbidezza son
più fine del velluto nero, e son ricercate per fode-
re di vesti.

484. Le Grillotalpe (così nominate per la somi-
glianza, che hanno ai Grilli, e per la parità de'
costumi, che hanno colle Talpe, dette altramente
Cecarole, Zuccajuole, o Cicorbe) non ho io nota-
to, che facciano grave danno o alle radici, o
a' bulbi de' Tulipani, di cui si dicono esser ghiotte;
ma sol quello di scalar le piante, e smuover dal
suo sito le piccole, collo scavar di sotto la terra.
Prescriveasi dal Ferrari, e Clarici qualche rimedio
contro di questo insetto, ma non sene ha sicura spe-
rienza; e però dice Clarici: A rovina tal de' giar-
dini non si è per anche trovato altro rimedio, che
d'adoprarli per ritrovarle, quando si vanga il
terreno, ed ucciderle, o stare in attenzione, d'in-
topparle giusto sul punto che solcano, e smuovon la
terra, e con un colpo di zappa cavarnele fuori, e
schiacciarle: Il tempo d'intopparle, come diceami
il Giardiniere di Palazzo, è dopo d'aver adacqua-
to il terreno, che allora vengon su a solcar più age-
volmente nel morbido. Penetrano talora fin nella
terra de' vasi, e la mettono in iscompiglio, quando
il forame di sotto del vaso sia troppo grande; e
però in tal caso dovrà quello coprirsì con un coc-
ciò, per impedir l'ingresso a questo, ed a simili in-
setti: ma una volta che vi sono entrati, a farneli
sloggiare, fa uopo cavar la terra dal vaso, e tro-
vatele darle morte.

485. I Lombrichi nuocono col solo scavar la ter-

ra, ma per ordinario non cagionano grave nocumento: così le Porcellette, e le Forbicine, per qualche danno, che apportano poco notabile, basta che si uccidano, quando le troviamo. Più nocevoli cred'io i Centopiedi, e l'Escole, o sieno Ascaridi, vermicci sottili, o bianchi, o gialli, o neri. Gli uni, e gli altri so, che mangiano cose morbide, e putrefatte, e sempre che una radice, o bulbo si putrefa, vi si trovano; e de' Centopiedi ho notato, che vanno a sotterrare i lor parti al piè della pianta, di cui la radice altronde da se era già tocca di guasto, e que' piccoli animalletti finiscono di guastarla: ma puré più di una volta ho avuto motivo di giudicar, che diano anche il guasto, alle sane radici quando non ne trovino delle putride. I Centopiedi facilmente si lascian trovare sotto le grasse, ed in simili luoghi umidi, e coperti, ed i lor figli, e le Ascaridi si potran cercare al piè delle piante inferme, smovendo la terra, e scoprendo la radice, per ammazzarli, e curare insieme la stessa radice, riscandone il fradicio sino al vivo, con gettarvi poi sopra un poco di cenere, ed arena, ma sarà pur meglio medicarne la piaga coll'impiaastro di trementina, e cera.

485. Le Locuste, o Grilli non soglion far tanto danno, da prescriber rimedj, eccetto quando Iddio ci voglia gassigar colla lor moltitudine; ed allora non sarà gran fatto, che il Fiorista tolleri con pazienza la perdita de' suoi fiori, quando tutto il popolo piange la desolazione della Campagna. E' assai più frequente il danneggiamento delle Lumache, delle Ruche, e Bachi di ogni genere, nè può trascurarsene il riparo senza grave scapito delle piante, le quali essendo piccole, divorate totalmente, e delle grandi rodon tutto il tenero de' germogli, delle
fo-

foglie, e de' fiori. Le Lumache appiattansi al piè della pianta, o sulla superficie, ove sia umido il terreno, o altrimenti lo bucano, e sene stan poco più sotto, e poi la sera vengon su a divorar la pianta, ed il vederla corrosa è sicuro indizio, che quivi s'ia nascosta o Lumaca, o Ruca. Le Ruche altre son nere dello stesso color della terra, ed altre son verdi; le verdi abitano sulla pianta, siccome altri generi di Bachi, ed appiattansi tra le foglie, e dentro il seno istesso de' fiori, e regnano più che mai nella Primavera su' l' tempo della fioritura, ed il vedere allora sinozzicate le foglie, o i fiori, è segno certo del verme micidiale, ed ove troveransi le foglie attaccate insieme col vischio della sua bava, quivi sarà egli sicuramente nascosto.

487. Ma più perniziosa d' ogni altro verme è la Ruca nera, la qual regna nell' Autunno, e nel Verano. E' un vermuccio orrido, che si fa più grande del verme da seta, e per lo coloraccio lurido, non ostante la sua grossezza, confondesi con la terra, e se non guardisi attentamente, e non si cerchi con pausa, sarà sotto agli occhi, e non si scernerà. Le provide lor madri, che saran senza dubbio del genere de' Parpaglioni, e Farfalloni, vanno a deporre a piè delle piante nascenti, e per ordinario una per ciascuna pianta, benchè talvolta ne ho trovato un intero covile di piccioline sotto la medesima, ma forse di poi cresciute dividonsi, e ne va ciascuna a trovar la sua pianta, quando una sola non è più sufficiente per molte bocce. Il cibo più saporito per quest' Insetti sono i Ranuncoli, ed i Garofani: mi è succeduto più d' una volta, di trovarne pieno tutto il Giardino, uno per ciascun piede di Ranuncolo, o di Garofano da semenza: appena spunta di terra la tenera pianta, che la madre premurosa va

presto a deporvi il suo allievo; e se non si stia sull'osservanza continua in quel primo tempo, a cercarnele, sarà presto divorata, e perduta quella prima piantarella, e poi dietro a quella le circonvicine. Il segno certo della Ruca, è il trovar troncata qualche foglia, e spesso ne lascia qualch'una, o qualche pezzo troncato, e roso sulla terra; vedesi pure il buco aperto, quando la superficie sia piana, e la terra non sia mobile, che ne chiuda dietro al verme la ritirata. Suole appiattarsi lì sotto al piede, e non più di due, o tre dita lontano, e mentr'è piccolina, sene stà eziandio sulla superficie; più che cresce, alquanto più sotto si nasconde, ma non più di un dito per ordinario. Se non la trovate la prima volta, uguagliate, e calcate con la mano la terra intorno, e 'l giorno appresso potrete accorgervi del buco, ond'è uscita, e rientrata. Per non cercare invano altra volta quella Ruca, che avete già uccisa, segnatene il piede, o vagliavi di segnale, il non trovar più roso il cuor della pianta, e 'l vederlo crescere senza nuovo danno.

C A P O XXXIII.

Rimedj contra le Formicole, e Gorgogli.

488. **I** Delitti, di cui son ree le formicole, non son realmente più di due, ed un terzo, che lor viene comunemente imposto, imponsi a torto, ed io mi trovo in obbligo di pugarne l'impostura, a riguardo almeno di gratitudine, poichè si è scoperto nel Trattato R. l'ajuto, che porgon esse a' fiori per la produzione de' semi col trasporto, che vi fan delle polveri seminali. Il
pri-

poscia delitto è, che maturate le semenze, ven-
 orimo a furarle, o sulla pianta medesima, o anche
 gono penetrano fin dentro i nostri scrigni, ove le
 credevam ben custodite. Ad impedire il furto, non
 v'ha talora diligenza, che basti; ma purè il più del-
 le volte mi è riuscito di deluderne gli attentati;
 con tener coperto di velo il fiore, finchè sieno ben
 mature le semenze, e quindi conservandole in carte
 strettamente ripiegate, o dentro scatole ben serrate,
 che non abbiano spiraglio alcuno. L'altro reato è,
 che vanno scavando le loro tane in ogni terra col-
 ta, massime dentro i vasi con grave detrimento del-
 le radici. Sperar di estirpare un formicolajo, con
 farle raccorre insieme alla preda di un osso spolpa-
 to, del mele, del zucchero &c. non sembra possibi-
 le; dacchè mi ci sono vanamente impegnato per più
 anni, a distruggerne uno in mia camera, facendo-
 ne ogn' anno tanto grande smacco, che potevasi cre-
 dere ogni volta estinto, ma nella Primavera torna-
 va, poco men che intiero, a ricomparire un popo-
 lo di novelle formicole.

489. Penso, che neppure possa estirparsi un for-
 micolajo con versarvi dentro acqua bollente, o con
 iscavarlo con la zappa; perchè son così lunghe, e
 disperse le lor vie sotterranee, che non è cosa fa-
 cile, tutte raggiungerle, e disfarle. Sarà qualche
 rimedio, sinuover sovente, e profondamente la ter-
 ra intorno, per isturbar, e dissipare i lor lavori, ac-
 ciocchè annojate, di tanto vano fatigare, risolvàn-
 si una volta a mutar paese, ma pur sono così pro-
 terve, che per lo più la lor ostinazione stracca la
 nostra assiduità in disfare quel, che tornano sem-
 pre a rifare. Ne' vasi, ove il danno suol' esser maggio-
 re, è più facile il rimedio, che in piena terra: si
 può

può il vaso tenere tutto immerso nell'acqua per qual che giorno, finchè vi muojano le formicole affogate; oppure potrà cavarli la pianta dal vaso con tutto il pane della terra, e così distruggerne il formicolajo. Acciocchè poi s'impedisca loro assolutamente il farvelo, non basta ciò, che altri prescrive, che i vasi sien lavorati in tal forma, che abbiano tutto intorno all'orlo un canale, il qual tengasi pieno d'acqua, e ne impedisce l'accesso alla pianta; perchè possono, e sogliono farsi strada per lo buco inferiore del vaso; e però ad impedire ogni adiro più sicura maniera è quella, di far lavorare catini di terra cotta col fondo piano, due per ogni vaso, uno piccolo, quant'è la base della grasta, e l'altro più grande circa due dita, il qual si riempie d'acqua, e dentro vi si mette il piccolo, rovesciato, e su'l dorso di questo vi si pone la grasta, a qual resta così ben isolata, come una fortezza; cinta intorno di fosso d'acqua.

490. Oltre a' suddetti reati non par, che le formicole cagionino altro nocumento, ma pure lor si appone, che in altra differente maniera diano il guasto alle piante. Ad accusarle come ree, non manca nè la quantità, nè la qualità de' testimonj, così attestano tutt' i Periti di campagna, che sono i Villani, e quasi tutti gli Autori che scrivono di Agricoltura, e se i testimonj fosser concordi nell'asseguar la qualità del danno, che commettono, nessun giudice potrebbe assolverle: ma son essi tanto fra lor discordi, che la discordia medesima può servir d'argomento per l'innocenza delle Formicole. Altri più comunemente col P. Ferrari, Clarici &c. le accusano, che consumino le piante col rosicchiarle; ma il P. d' Ardene fa l'attestato contrario, come
te.

testimonio di veduta, e protesta di far loro giustizia in affermare, di non averle mai vedute nè ferire, nè succhiare il sugo de' fiori; come fanno i Gorgogli, nè divorarli come fan le Ruche; con tutto ciò, soggiunge egli, che se non son esse punto colpevoli di tai delitti capitali, dannegiano però niente, manco le piante in altra maniera nelle foglie, maltratandole coll' attrito, e col passeggiarvi sopra di continuo: ed ecco una nuova accusa, ancor essa calunniosa. Il Sig. Goedaert *Tom. 2. Esper. 45.* fa rec le Formicole di un'altra più strana maniera, asserendo, ch' elle vanno a gettar sopra i teneri occhi delle piante certo non so qual liquore, o semenza umida, da cui ne nascon poi i Gorgogli, vera peste de' Vegetabili; ed il Reaumur, che ciò riferisce, aggiugne, che oost pur dicono i Villani di Francia, e così anche la sentono i nostri Giardinieri, da me più volte interrogati. Una impostura come questa tanto sparsa, e comune, potrà aver fondamento sopra quel sì universale, ed antico errore, che possano generarsi gl' Insetti dalla putredine, o da che che sia altro, ancorchè non sia animale, ed accreditavane l' impostura, il veder quasi sempre accompagnate insieme sulle piante le Formicole co' Gorgogli; essendo cosa solita, che la compagnia de' cattivi faccia giudicar cattivo chi forse non lo è realmente.

491. Tal' è 'l caso presente del grave reato, di cui vengono accagionate le Formicole: sono realmente i Gorgogli, che sciatano, e rovinan le piante; e le Formicole, perchè frequentano la lor conversazione, ne sostengono la calunnia. Era per me un fenomeno degno da saper sene la ragione, perchè mai ove son Gorgogli, ivi costantemente truovinsi quasi sempre formicole in molto numero, che sopra vi passeggiano. Non son mai senza ragion sufficien-

te quelle azioni, che gli animali operano con costanza, ed uniformità in tutta la loro specie; e questo motivo andava io cercando per le Formicole. Guidato prima dall'error volgare, ch' elle rodono le piante pensai, che forse i Gorgogli servisser loro, come di scorta per la scelta delle piante più saporite al lor palato, le quali sapesser quelli meglio scegliere, e per coincidenza del gusto d' entrambi, concorressero insieme sulle medesime piante: e pensai ancora più verisimilmente, che forse i Gorgogli stessi fosser cibo più gradito alle Formicole, che non lo sien le piante, e che però vi corressero per divorarli. Di questo parere furon Leevenoechio, ed Artsochero, confermato dal Sig. de la Hire presso Schreuchzero, *Physica Sacra. Tom. 6. Tab. 587. Prop. 15.* i quali volevano, che noi siamo obbligati alle Formicole dello spopolare, che fanno animali tanto nocivi: ma pur mi faceva difficoltà il riflettere, che quelle desolatrici, e per lo numero, e per la voracità, appena mai lascerebbero vivo un sol Gorgoglio, quando che noi veggiamo ivi più numerosi i Gorgogli, ove concorron più numerose le Formicole.

492. Per saperne il vero, mi feci ad osservarne spesso, e per minuto gli andamenti, e dopo cento osservazioni non potei accorgermi mai, nè che le Formicole mangiassero i Gorgogli, nè che rodessero punto le piante. Le vedeva io sempre aggirarsi intorno ai Gorgogli, e non altrove; andar su, e giù fra di essi, e passeggiar con piè leggiero sopra i loro dorsi, e quelli starsene cheti, senza muoversi dal suo posto. Niente più di questo mi fu possibile notare, senza che mai abbia potuto accorgermi per lo corso d' un anno del vero motivo, per cui vanno le Formicole ai Gorgogli, eccetto che l'andarvi e l'attenervisi assiduamente; e coll' niente mo-

lestarli, era per me certo argomento di qualche loro interesse di rilievo, che ve le obbligasse. Impegnato sempre più a scoprirlo, tolsi una volta ad osservare un ramicello, in cui eran poche Formicole, per evitar la confusione, che l'occhio suol patire fra la moltitudine, e fermando lo sguardo attento sopra una sola, per notarne ogni minimo movimento, mi potei accorger prima, che la Formicola fermavasi un tantino sul dorso di ciascun Gorgoglio, e tosto battevalo sul codrione colle due antenne, che porta in testa; quindi aspettava ella un momento, e tirando avanti al seguente Gorgoglio, lo batteva similmente, e senza più passava dall' un all' altro, ed essi perseverando per lo più nella loro immobilità, pareva che non fosser punto penetrati dalla molestia delle battiture. Sol vedeva io di tanto in tanto, che qualche Gorgoglio dopo d' essere stato battuto, sollevava il codrione su i piedi di dietro, e per le prime volte non mi accorgendo di ciò, che in tanto succedeva, pensai che si sollevasse come in atto di fare un sforzo, per scuotersi d' addosso la Formicola: ma mentre vò meglio notando, che quello inalzamento del codrione veniva fatto con proprietà, come uno sforzo da sgravare il ventre più tosto, che da scuoter la Formicola, agguzzo attentamente la vista, ed ecco veggio una gocciolina di limpido giulebbo spuntar dall' ano del sollevato Gorgoglio, e la Formicola, che avidamente l'aspetta con bocca aperta, in un baleno ingojarsela, e poi tirar avanti, a procacciarsene qualche altra stilla da altro Gorgoglio arrendevole, che stesse in procinto di sgravarsene.

193. Ecco il vero motivo interessante, che alletta le Formicole, a gire in cerca de' Gorgogli, ed impegnale a rispettarli, per trarne il guadagno

di quelle goccioline, saporitissime al lor palato: debbon essere realmente dolci, perchè ancor le mosche, vi concorrono, e più generi di moschini, che tirano al dolce come le Formicole. Una simile osservazione, poco diversa da questa, fu ancor fatta dal Reaumur, il qual notò, che i Gorgogli mandano tal dolce liquore da due tubi, o spinuzze, che risaltano sul lor codrione; e ne prova in più maniere la dolcezza, fin col saggio della propria lingua, massime in quell'acqua, che trovasi nelle vesciche degli Olmi, de' Pioppi, ed in altre foglie d'alberi, ove stanzian chiusi i Gorgogli; e quel loro effluvio si si raccolga da dette vesciche, e faccia si svaporare al fuoco, lascia una deposizione di Zucchero. Basta il fin qui detto, a discolpar le Formicole, a ad incolpare i soli Gorgogli del grave danno, che cagionano alla miglior parte delle piante, ed or se ne cerca, se pur ci si trovi, qualche sufficiente riparo.

494. Per l'esterminio di questa mala razza prescrivon gli Autori varie ricette; ma non so dir, se alcuna riesca della pretesa efficacia: una decozione, che io provai, di Ruta, Assenzio, e Tabacco o poco, o niente li molestava. Il P. Ferrari dice per autorità di Palladio, che si ammazzano con aceto forte, e con sugo di Jusquiamo; ma so da un Fiorista, che l'aceto, spruzzato sopra i Ranuncoli, per far male a' Gorgogli, cagionava molto maggior male alle piante; benchè potrà ben esser, che ad altre sorti di pianta non apporti quel danno, che ne viene a' Ranuncoli. Dice di più il Ferrari, che farannol' istesso effetto il seme di Senapa, e d'Oleandro bolliti insieme, e così farà il Petrolio, o sia olio di sasso, che uccideli colla sua puzza. Clarici vuol, che distuggansi con acqua, nella quale abbian bollito Se-

nape, Cicuta, ed Affenzio, e che potrebbe anco spruzzarsi la pianta colla decozion del Marrubio, come suggerisce Columella: *De Cultu Hort.*

Profuit & plantis laticos infundere: amaron

Marrubii:

495. Il P. d'Ardene per autorità degli Antichi, e per isperienza fattane, giudica più efficace d'ogni altra una forte decozion di Affenzio, Tanesia, Tabasco, Elleboro bianco, Ruta, la piccola Centauria, Porro, Coloquinta &c. citando la *Toolog. de gl' Inset.* T. 2. L. 2. p. 3. c. 5. ed avverte, che non è necessario, adoperar tutte quest' erbe insieme, ma che bastino alcune di esse. Contra questi, ed altri Insetti provava egli di più molto profitevole la cenere della fuligine de' Camini, mescolata con sterco di Colombi polverizzato: di questa polvere ne copriva leggermente la terra al piè della pianta, perchè gl' Insetti non amano, die' egli, la mobilità di questa polvere, nè 'l suo mal sapore, e mal odore: il tabacco, o la fuligine sparsi sopra i Gorgogli, o altri Insetti, li molestano, se non gli uccidono, e li fanno sloggiar da quel luogo, che infestavano, ed io del tabacco ne ho fatto uso con qualche profitto.

496. Ma i più efficaci rimedj son due, ed uno è lo schiacciarli, ed ucciderli colle proprie mani, ed ove non entra la mano senza offesa della pianta, io mi prevalgo di una penna, o di un pennello di pelo duro, o di una seghgia acuta di legno, o canna, che possa penetrar in ogni stretto angolo, ove stan ritirati: Buò anche stendersi una carta, o un pannolino sotto la pianta, e scotendola, cadranno i Gorgogli, e tutt' insieme si ammazzeranno: con tal diligenza può salvarsi la vita alle piante più elette, purchè non cessiamo di tornare ad usarla più volte; perchè sempre ne restano alcuni nascosti, o ne ven-

gono a partorire degli altri le loro alate madri, ed attesa la lor prodigiosa fecondità, ammirata già nel *Tratt. 1. cap. 4. n. 61.* dopo pochi giorni tornano a ripopolarsi. Avea io impegno di tener netta una piccola pianta di Garofani, ed ogni giorno la cercava di punto in punto, ed ogni giorno vi trovava nuovi Gorgogli, che la madre veniva di notte a lasciarvi. Peste simile non ha la campagna, e se non fosse stato Dio medesimo, che ne apprestò il riparo, appena troverebbe l'uomo maniera da rimediarvi.

497. Appunto il secondo rimedio più accertato del primo, lo appresta Dio, a cui però dobbiam noi cooperar colla nostra industria. Guai a noi, e a tutta la campagna, che tutta desolerebbono i Gorgogli coll' immenso lor moltiplico, se Dio, che ci vuol vessati con una mano, non porgesse il suo aiuto coll' altra. Nel citato *cap. 4.* abbiamo rimesso a questo luogo la soluzione di questo dubbio: cioè se i Gorgogli tanto enormemente si moltiplicano, che i discendenti di un solo, non più oltre della terza generazione, in meno di un anno passino 162 mila, e 500 milioni; com'è, che non ne son pienissime tutte le piante della terra, e tutte ammorbate, e tutte morte? Son essi forse di sì corta vita, che i figli non coesistano co' padri loro? No, che vivono insieme per alcuni mesi almeno, per quanto ho potuto notare, e vivono anche nell' Inverno, sebbene non abbia io fatta special osservazione del preciso tempo della lor durata. So, che la lor morte naturale suol succedere circa la fine dell' età de' più anziani, e continua snò all' Inverno per i più giovani. Ora Iddio ha provveduto in più maniere alla distruzione di questi animalletti, non solo colla morte naturale, ma ancora colla violenta, la qual forse ne toglie

glie via un maggior numero, che non quella; e violenta la meritano questi assassini. Per la morte naturale ha destinato una specie d'idropisia, o coagolo: quando son già gravati coll' avido succiar, che fanno, il fugo della pianta, sen' empion tanto la pancia, che par ne voglia scoppiare, e' indigesto, o altro che sia, gli uccide, e molti se ne trovan morti attaccati alla pianta, a guisa di palline nere, piene, e dure, per l'umor, che vi si è coagulato.

498. Per la morte violenta vi sono state destinate le piogge, e due specie di animali, che ne insidiano la vita: le piogge impetuose gli abbattano, e strascin via per terra, come che essi sappiano usar l'industria di starsene riparati nel rovescio delle foglie dalla parte inferiore, e con tal cautela molti campan da morte, ma pur molti ne periscono. Le piogge impetuose sono stimate comunemente dannose alla campagna, e davvero vi cagionan de' gravi danni; ma chi guarda dall' alto, e deve governar tutto il Mondo, le ha ordinate savissimamente di tanto in tanto, per riparo d'altri gravi danni, e per cagionarvi altri emolumenti, che noi non pensiamo. Non è egli un gran bene, che le piogge dirotte lavino di tanto in tanto, e seco menino al Mare le sozzure, che ammorberebbon l'aria, e la terra, e che tra le altre sozzure seco strascinino a perdersi tant' insetti, e le loro semenze, che ci danneggiano, e ci dissiperebbon tutto, se arrivassero a moltiplicarsi tanto, quanto ne son capaci?

499. A questo proposito non voglio omettere un raro caso, avvenuto ne' boschi del Marchesato di Sorbino. Quivi pochi anni addietro moltiplicossi in tanto gran numero una specie di grossi vermini, che potè divorar tutte le foglie, e tutto il verde di que' gran boschi di vasta estensione, lasciandoli affatto in-

gridi, e lo strepito della comune roscatura alzavasi tanto, che faceasi udire ad alcune miglia di lontananza. Ne parlò meco il Sig. Principe del Cassaro, ch'è n'è il Padrone, per saper, se mai potesse darfi riparo a quella total desolazione; che gli costava non leggiere interesse, per allora, e per gli anni avvenire: gli dis'io, che riparo umano non potea darfi altro, che uno solo, ma ch'era peggior del male, cioè di dar fuoco a tutt'i suoi boschi, ed aspettar, che ripullulassero. Altro rimedio poteva sperarsi unicamente da Dio in più maniere, e gli espressai in particolare una inondazione di pioggia larga, e precipitosa, la qual portasse via tutt'insieme le loro uova, ch'eran per ischiudersi nella Primavera; ed appunto avvenne così, con una forte inondazione tutte le semenze ne andarono al mare, ed i boschi ne furono interamente liberati.

500. Ad estermínio de' Gorgogli potrem noi cooperarci; con tenere i vasi esposti alle piogge; e quando manchino le impetuose, imitarle con artificio equivalente, come ho praticato più volte, per salvar la vita alle mie piante più elette. Ho portato i miei vasi sotto un canale d'acqua, che cade con impeto, e piegando il vaso di maniera, che l'acqua scarichi sulla sola pianta, e non sulla terra del vaso, per non iscalzarla, ne ho ottenuto il totale spurgo di quella peste. Versar l'acqua con impeto sulla pianta nell'innaffiarla, fa del pregiudizio alla terra, perchè la calca, e non averca l'utilità, che si pretende; giacchè i Gorgogli rovesciati giù, e non portati via lontani a perire, han buoni occhi, per veder la pianta, e buone gambe, ancorchè lente al moto, per risalirvi; ed in effetto di di a poco, sbarazzati dal mollume dell'acqua, sene risalgono su pian piano una altra volta; seppure non ci vorrem pre-

valere in quel buon punto delle mani, per istropicciarli, ed impastarli colla terra, da cui poscia, come inerti, mal si potran sbarazzare.

SOL. L'impegno, di cercar rimedio alla infestazion de' nocevolissimi Gorgogli, mi pose immediatamente il pensiero, d'indagar la maniera, come o da se, o violentemente morir potessero; e poichè l'induzione quasi universale di tutte le spezie degli animali è tale, che ogni spezie ne ha una, o più altre, che le son contrarie, e le insidiano la vita; perciò mi diedi a cercar, se alcuna spezie se ne trovasse, nimica de' Gorgogli, la qual si potesse applicar da noi alle piante infette, per divorarli. Ma dopo lungo offevar, che tutti gl'insetti, che vi concorrono, li rispettano, a motivo del dolce liquor, che vi assaggiano; in fine mi accargo di una piccolissima moschina, che intorno ad essi raggravaasi, e mi era ella nota, per quel, che di lei avea io letto, e veduto ancor da me stesso ne' Ranuncoli, nelle viti, ed in altre piante. Nelle foglie di queste, benchè sieno delicatissime, avvi frequentemente un vermuccio così sottile, che può abitar comodamente tra pelle, e pelle, e va pacendosi di quella poca polpa interna, che sta chiusa tra le due pellicole; e men' era accorto, come può qualunque, dal veder la foglia rabscata da solchi vermicolari. Il vermicciuolo poi si tramuta in alato, ed esce di là dentro già mosconcello: tal volta però notava io, che il vermuccio impallidiva, s'infermava, e ne moriva; e curioso di saperne la malattia, ne sparai uno morto, e più altri infermi, e con mio stupore ammirai, che anche i vermini patiscono d'altri vermini, e vi trovai dentro un altro vermicciuoluzzo, il qual corrodendo le viscere di quello si sostenta, e dopo il cru-

del vermicidio in moschettina d'altra specie più piccola si trasforma. Or di questa piccolissima io qui parlo, la qual viene a' Gorgogli, non già tirata dal dolce liquore, come le altre, ma viene a ferirli seriamente nella pancia col suo aculeo, come fa co' vermetti de' Ranuncoli, per depositarvi l'uovo, onde poi nasce il figlio. Della nimistà di questa moschina contra i Gorgogli ne fu già prima osservatore il Sig. Goedaert Tom. 2, Esper. 45: ma sebbèn ella ne uccida molti, non è però un mezzo, di cui ci possiam noi prevalere, per fargliene uccidere un intero popolo, come io pretendo, e come alla fine mi riuscì colla seguente osservazione.

502. Più d'una volta avea io veduto sulle piante de' Garofani, ed altrove un animaletto bell'issimo, e capriccioso, e l'avea osservato anche col Microscopio, e vi riesce una delle più belle vedute. E' un verme globosetto, circa una linea, o poco più di lunghezza, armato in bocca di una buona ranaglia; ma il capriccio è nel vestito; sembra proprio un Istrice, coperto di fiocchi di bambagia, erti, come tante spine, e bianchissimi, ordinati a filare da un fianco all'altro, e paralleli per tutto il corpo, che se alcuno con sol leggermente toccarlo, gli scuota di dosso i fiocchi, e lo denuda, fa egli presto rivestirsene con nuova produzione di quella specie di nitro, che manda dal suo corpo. Or mentre io una volta colla suddetta prevenzione l'osservava, mi avveggiò, che occostavasi adagio adagio a' Gorgogli a maniera di traditore, ed afferratone il primo, lo tira a sé, e lo divora, votandolo tutto di dentro, con lasciar la sola spoglia; e così ne osservo più altri della sua razza, ciascuno, che divora il suo, accanto ad altri branchi di Gorgogli.

303. La circospetta cautela, come usa di far la preda, è tutta saviezza del Creatore, che glie la indettò. E' un ghiottone, che non va sazio, se in un giorno non divora un'intera popolazione di cinquanta Gorgogli almeno; e comechè questi sien pigri al moto, pure il timor della morte tra un bulicame sì numeroso ne farebbe scappar non pochi, ed esso per averli tutti a man salva, che fa? avvicinasì pian pianino al primo del branco, stende lungo il collo, e colla tanaglia afferra una gamba del Gorgoglio, lo tira con forza, finchè stacchi dalla pianta il riluttante animale, e sollevando la testa, lo sostiene in alto tanto, che le lunghe gambe del Gorgoglio non arrivano nè a toccar più la pianta ne' i vicini compagni, che sturbari ne andrebbon via, e mentre quello brancola inutilmente colle gambe in aria, questo lo spolpa intero. Quindi fa un altro piccolo passo, e zitto zitto afferra il secondo per la gamba, e similmente lo tratta, e così ad uno ad uno; nè cessa mai dallo scempio, se tutta non consumi una popolazione, e poi sene passa ad altre di mano in mano, finchè ingrassato, e maturo, per la solita metamorfosi ritirasi in un cantoncino della pianta, e doppo giorni trasmutasi in un rotondo piccolo scarafaggio alato, come ho provato tenendo chiuso in scatolino uno di tai vermi già prossimi alla metamorfosi.

304. Un desolator de' Gorgogli più valente di questo appena potrà trovarsi, ma pur ne ho trovato un altro, ch'è un verme più grandicello; ha qualche similitudine col descritto, ma è schifosetto senza il vago ornamento de' fiocchi, e lo giudico di altra specie. Questi, e quegli animalletti arrivano a purgar dal tutto un'intera pianta; troverete talora una pianta, ch'era stata piena di Gorgogli, tutta poi

ricoperta delle loro spoglie, mercè il buon servizio, ch'essi vi han fatto, senza voi saperlo; e però sapiateli conoscere dalla prefata descrizione, rispettateli, e sappiate prevalervene, come io m'ene prevalgo con gran profitto, e so così. Le madri di tai vermi, poicchè fanno che i lor figli vivon de' Gorgogli, quivi sù le medesime piante li vanno a partorire, ove son Gorgogli, e quivi fra quelli io li vado cercando, e trovarli, con industria, senza niente molestarli, sopra una foglia, o pezzolino di carta li piglio, e li trasporto sù i miei Garofani, ed ove mi accorgo, che sulle mie medesime piante ne deposè la madre tanti, che ne avanzino al bisogno; io dà queste ne piglio, e ne trasporto ad altre, che non ne hanno, e così libero le piante più elette dalla peste di quest' Insetti perniziosi.

505: Se questi benefici vermi nascessero in tutti i tempi dell'anno, appena vi sarebbon Gorgogli al Mondo. Ma Iddio, che per suoi rettilissimi fini li vuol conservati, e vuol da una parte la vestazion della campagna, ha data loro quella prodigiosa fecondità, che si è ammirata, ed ha imposto a più altri animali la necessità di rispettarli; ma perchè dall'altra parte non vuol egli rovinata del tutto la campagna, come la rovinerebbero i Gorgogli, ha destinati cotesti vermetti divoratori, i quali per certo gli esterminebbero tutti, se convivesser con quelli per tutto l'anno; e però li fa nascere nell'Estate solamente sino all'Autunno, in qualche numero competente, quanto possano diminuir de' Gorgogli la quantità eccessiva, ma non torli via totalmente: nell'Estate io li veggio, e gli adopero a conservazion de' miei Garofani, che più di ogni altra pianta patisce da' Gorgogli, ed in altri tempi sarà raro, che nascano, nè io mi ricordo d'a-

d' averli mai veduti. - Così resta sciolto il dubbio proposto, che i Gorgogli tra que', che muojon di lor morte naturale, e tra que' che muojon di violenta in molto gran numero, vengono impediti dalla Divina diposizione, a non poterli moltiplicar tanto, quanto ne seguirebbe altrimenti la desolazione della Campagna. Egli è questo l' ordinario stile della Divina Provvidenza, che ci vuol vestiti per suoi giustissimi fini, ma non distrutti.

C A P O XXXIV.

Artifizio per far venire i Fiori fuor di stagione, e conservarli vivi, o ravvisarli già morti.

505. **P**AR, che sin' ora siasi detto abbastanza di tutto l'utile, e l' necessario alla coltura de' fiori, e sol rimane a dir qualche cosa d' artifizio, che l' umano capriccio, non mai contento di ciò, che ci dà buonavamente la Natura, è ito tentando intorno a' fiori, per mutarne le naturali qualità, e migliorarne la condizione. Destinò la Natura a ciascuna specie di fiori la sua stagione, ed acciocchè mai non ci manchi questo ingenuo riccio, li fé succedere gli uni agli altri per tutto il giro dell' anno. Ma le umane voglie, non mai paghe, braman mutati a' fiori i periodi lor destinati, e voglionfi Rose nel cuor dell' Inverno, e Viole Marzie nell' Estate. E ella con giusta saviezza ordinò, che i fiori fra le cose di questo mondo, tutte corruttibili, fossero più labili, da servir di simbolo di corruttibilità, come son simbolo di mondana bellezza, sempre ma-

tabil', e manchevole; noi pure con artificio conciliata vogliamo al mortal fiore l'immortalità, e vogliam prorogata per anni, e lustri una vita, che appena si terrebbe salda per un sol giorno.

507. La stessa Natura sparse ne' fiori tutte le varie sorti di colori, ed i più fini, e più vivaci del Mondo; e se con savia economia non tutti li diede a tutti, ma a chi uno, a chi pochi, a chi molti, pure vorrebonsi dati a ciascuna specie que' colori, che le furon negati, e si pretende, di poter mutare con arte il vermiglio delle Rose col celestio, che non hanno, e 'l purpureo delle Viole col verde, o col vermiglio. Parimente negò ella a molti fiori la soavità dell'odore, che diede largamente a molti altri; e noi cerchiam maniera, da render odorosi quei, che non lo sono. Per soddisfare a' capricciosi, più che per genio, mi accingo in questi ultimi capi a riferirne le maniere, quasi tutte descritte dal P. Ferrari, onde l'hanno prese gli altri, che talora son iti spacciandole, come lor secreti. Il mio genio non è mai stato di andar cozzando colla Natura, per forzarla a dar ciò, che di sua costituzione non suol concedere; perchè di ordinario, o vi si spreca vanamente il tempo, o non è senza gran difficoltà, e fatica, quel poco, e raro, che riesce, e poichè vassi contra Natura, o vi si perde la pianta, o grave danno ella vi patisce.

508. Cominciando dal primo tentativo, di far fiorire le piante fuor di sua stagione; se si vorrà accelerar la fioritura, o ritardarla tanto, che sortisca in una delle contermini stagioni, o eziandio nella sua contraria: v. g. ciò, che fiorisce nell'Estate, anticiparlo nella Primavera, o posticiparlo nell'Autunno, oppur eziandio nell'opposto Inverno; la-

ma-

maniera di ottenerlo in generale è questa. Uopo è di travolgere il governo della pianta in guisa, che nell' Està le si facciam provare le qualità dell' Inverno, che sono il freddo, e l' umidità, e nell' Inverno, quelle dell' Està, che sono il caldo, e la siccità: siccome uopo è stravolgere in tal caso il tempo da piantare, o seminare, con tutto quel, che dimanda la coltura propria di cotale pianta, v. g. ciò, che suol farsi nella Primavera, farassi nell' Autunno, e ciò, che nell' Autunno, farassi nella Primavera.

509. Per applicar questa general' regola più da presso alla pratica, volete voi Rose nell' Autunno, o nell' Inverno, trapiantatele di Primavera, o di Està; ovvero potatele nell' atto, che cominciano a sbucciare le gemme, e pe' Garofani strappatene i germogli, prima che producano i fiori; e con ciò impedirete, che si sprechi, e consumi l' umor già raccolto, e disposto, per la nutrizione delle nuove gemme, e per la produzione de' fiori, ma resterà preparato per altre gemme, e per altri fiori, che torneranno indi appresso a riprodursi. Così se volete Anemoni, e Ranuncoli nell' Està, e nel principio dell' Autunno, piantatene i tuberj, e la radici nella Primavera, quando sarebbe il lor tempo di fiorire. Così seminate gli Amaranti, gli Astri, le Balsamine femine, ed altri fiori estivi, non già nella Primavera, ma nell' Està, o nell' Autunno; e così di tutt' altri fiori s' intenda detto.

510. Quindi alle piante seminate, o piantate di Està, acciocchè vi fioriscano nell' Inverno, andate applicando le qualità dell' Inverno, cioè abbiate un luogo fresco, ed umido, come una stanza sotterranea, ove però l' aria possa ventilare, o almeno abbiate un sito opaco, ed umido, esposto all'

la Tramontana , e niente scoperto dal Sole , e qui tenete i vostri testi , e que' della stanza sotterranea solamente la notte porterete a Cielo scoperto . Che se vorrete con maggior proprietà , e più sicura riuscita , simular l' Inverno , spargete della neve sopra la terra de' vasi , in vece di abbeverarli con aler' acqua , o almeno l' acqua sia sempre fresca di pozzo . Al contrario alle piante , a cui vorrete applicar le qualità dell' Estate , acciocchè dien fiori nell' Inverno , date sito caldo , e solatio , riparato da Tramontana , e da tutt' altri venti freddi , ed esposto al Mezzodi , ed abbiate la pazienza di ritirare i vasi al coperto , quante volte menano venti freddi , e non splende il Sole , ma molto maggiormente la notte bisognerà tenerli in una stanza tiepida , a calor di fuoco moderato , che coincida con i gradi del calor estivo ; siccome l' acqua , da innaffiarli , sia pur tiepidotta , riscaldata al fuoco ; e con tal arte avrete stravolte le stagioni alle vostre piante , e queste , ancorchè estive , daran fiori nell' Inverno , e quelle , benchè ibernali , ve di daran nell' Estate .

511. Per accalorar maggiormente le piante , a farle fiorir nell' Inverno , o che si vogliano in qualunque stagione sollecitare , a rendere il fiore innanzi tempo , giova molto , che la terra sia ben sostanziosa , e che vi si mescoli del concime , con altri caldi , e spiritosi ingredienti , v. g. i vinaccioli , cioè i granelli dell' uva pesta , e la pestatura , e seccia d' ulive senza i noccioli , chiamata Sanfa , ed in particolare il letame caldo del Cavallo , sovente rinnovato , come prescrive il P. Fetrari , o come insegna il P. Regnault *Fisc: T: 3 , Tratt: 4.* per accelerare i fiori , e le frutta , la pollina , o la

colombina, cenere di vigna, e la calce medesima; mescolate con la terra.

§12. Per lo acceleramento potranno anche adoperarsi colle nostre piante certi Segreti d'Agricoltura, di cui i Giornali de' Dotti fan menzione. 9. *Sept.* 1675: 1666: 1684: dallo stesso Regnault rapportati. Mettete a molle nell'Acquavite del seme di lattuga, di cavoli fiori, d'insalata, &c. mescolate nella terra della calce spenta, e morta ridotta in polvere con un pò di colombina: voi in quarant'ott'ore avrete delle Lattughe, di Cavoli, dell'Insalata. Volete voi prontamente del Petrosellino? Infondetene la semenza nell'aceto, e dopo d'averla seminata in buona terra, gittatevi sopra molta cenere di gusci di fave: indi bagnate la terra con dello spirito di vino, e copritela bene con panni lini: in poche ore spunterà il Petrosellino dalla terra. Se trattasi di presto far crescere i Ceci, e le Fave, non si ha a far altro, che metterli per nove giorni nell'olio caldo; indi abbrustolirli, e seminarli: le Fave, ed i Ceci cresceranno in un ora. I medesimi rimedj, applicati alle nostre piante da fiore, dar potranno per avventura i medesimi portenti.

§13. Alle predette industrie potrà aggiugnersi quella, altrove detta, di scavarne un fosso; e mettersi prima uno strato di letame recente, e poi uno strato di terra, e sopra di questa piantare, e seminar la pianta, e potrà di più, scavarli un fosso intorno a quella, ed empierlo dello stesso letame, il qual si anderà rinnovando, perduto che avrà il calore; colla precauzione però, che le radici non arrivino a toccare il letame, per non restarne abbruciate, ma ne ricavano semplicemente il moderato fomento. Questo qui è il pericolo, che colli

T. II.

D d d

ap-

applicazion de' soprascritti accelerativi, caldi, e spiritosi, ne patisca la pianta, e spesso avvien, ch' ella provocata violentemente ad un parto intempestivo, si sconi, e perisca insieme col suo aborto; e però conviene andar cautelato, in adoperar tai mezzi, che han del violento, e sempre usarli con prudente moderazione. Alcune spezie di piante faran più arrendevoli, ed altre più restie, per dar fiori estemporanei; altre regeran più, altre meno al violento governo, ed altre sosterranno questo, e non quell' altro trattamento; ciò, che dipende molto dall' esperienza, e dalla perizia, e prudenza del coltivatore, per sapersi valere or di questo, or di quell' altro mezzo, che parrà più confacevole.

§ 14. Per dir qualche cosa delle spezie particolari, è cosa provata degli Anemoni, che possono averfi per tutto l' anno, con sol piantarne i tuberii ogni mese; purchè in tempo effivo, e caldo si tengano i vasi in luogo fresco. Della Rosa dicessi pure il simile: presso il P. Ferrari, che per averla ogni mese, debba piantarsi ogni mese, purchè sia in clima piacevole, e sia ingrassata con letame, e bene innaffiata. Dicessi ancora, che per avere i Gigli, o altri fiori d' ogni tempo, si pongano i bulbi sotterra a differenti profondità; altri sotto sino a quattro dita, altri sino ad otto, ed altri sino a dodici, i quali perdendo maggior tempo a nascere, verranno i più tardivi. Ma pel' Gigli, Tulipani, Giacinti, ed ogn' altra sorte di Cipolle, o anche di radiche, e tuberii, e molto maggiormente di quelle, che non posson lungamente conservarsi fuor della terra, cred' io, di aver trovata una maniera facile, da poterne ricavar i fiori in ogni tempo, che vorremo, e di averli bellii, e compiuti quasi

re-

repentinamente in pochi giorni, e senza notabile detrimento delle Cipolle; ciò che imparai da un raro accidente, degno da riferirsi.

115 Sin dal mese di Gennajo mi era stata mandata da Malta una grossa Cipolla del Giglio Narcisso Giacobeo *Tab. 33. Fig. 1.*, ma gli accidenti me la fecero capitare in Palermo sulla fine di Luglio, passato già il tempo, da dover fiorire, che qui suol esser circa la metà di Giugno. Chi la mandò, ebbe la savia precauzione, d'intonacarla tutt'intorno di creta, così bene, che indurata la creta, non avesse la Cipolla onde traspirare, e meglio si conservasse, per non corrompersi: in fatti sviluppata, la trovai così buona, ed intera, come se allora fosse stata cavata da terra. Dubbiofo, se dovessi allora piantarla, o aspettar l'Autunno, al rinfrascar della Stagione, la conservai nella Scatola, e dopo due ore tornai a rivederla, per osservar, se desse alcun segno, che mi determinasse a piantarla; ed ecco la truovo germinata, col germe alto un dito, e però subito vado a piantarla, e la pongo un dito sotterra con tutto il germe. Ma questo dopo quattr' ore sino alla sera spuntò di terra, e poi sollevossi un altro dito, e la mattina lo trovai alto circa mezzo palmo, e fino a notte compì l'intero palmo: allora mi avviddi, che quello era il Fiore, il quale ne' Gigli Narcissi nasce sovente prima, o in un colle foglie: il posdomani cresciuto anche più alla sua giusta grandezza, cominciò a spiegarsi, ed a mezzo di fu tutto aperto, bello, e compiuto, cioè fra il termine di soli due giorni, da che fu sviluppata dalla creta la Cipolla. Che un Fior si grande con un gambo sì alto, e grosso si sia formato in sì breve tempo, è un vero miracolo di Natura; e potè succeder perchè da se que-

sto Fiore spunta, e cresce in pochi giorni; ma ora crebbe molto più presto, perchè scorso già il suo tempo da nascere, quando il sugo del Bulbo trovavasi ben cotto, e col calor estivo fermentando, acquistato avea moto, per dar nutrimento, e cacciare su il germoglio; quindi trovandosi ben preparato il sugo, appena levato l'impedimento, che tenealo inceppato, tosto fermentò con maggior violenza, e con maggior celerità diè compiuto il Fiore. Questa medesima sperienza fu da me altrove replicata fortunatamente, giacchè trovandomi a caso fuori del Regno, mi furono inviate Cipolle dello stesso Giglio nel medesimo tempo d' Està, quando dovean fiorire; e da me presentare ad un degnissimo Personaggio con promessa, che di là a tre giorni ne vedrebbe compiuto il Fiore, così appunto avvenne con non piccola sua compiacenza, e stupore, e di quanti altri Fioristi furono ammiratori sì della bellezza del Giglio, come del suo celere vegetare...

§16. Or fate voi il medesimo, intonacate di creta sottile, e densa le Cipolle più grosse di questo Fiore, e le potrete conservare da un anno all'altro senza pericolo, che si corrompano; e poscia in qualunque tempo, che sia, anche d' Inverno; (e purchè col Sole, con acqua tiepida, con fomento di stufa, o di letame recente, diate al bulbo un egual grado di calor estivo) rinoverete il doppio miracolo, di averne Fiori intempestivi, e di ottenerli in due giorni.

§17. Da ciò impariamo altresì la maniera di conservare incorrotte le Cipolle, quando avrem bisogno di tenerle fuor di terra da un anno all' altro, e così tutte le altre radiche, o tuberì, che non sostengano di stare lungamente ad aria aperta. Impariamo per secondo a costringere in pari guisa i bul-

Bulbi, radiche, e tuberì di altra specie, i datti fuor di stagione i lor Fiori: volete v. g. Tulipanti nell' Eftà, nell' Autunno, o nell' Inverno, scitate dentro una buona cresta di creta i bulbi più corpulenti, de' quali si può esser certo, che daranno il Fiore, e teneteli all' asciutto così fino all' anno, e poi quando vi piacerà, piantateli, e lor concitate una temperie fresca prima, e poi spuntato che sarà il germoglio, lor date un grado di tepore, proprio di Primavera, che spero vi fioriranno presto, ed in tempo non suo. Anzi soggiungo, che in tal maniera possa presumersi un' altra rarità più sorprendente, cioè di conservare i Fiori medesimi, almeno certe specie più sode, fino ad altra stagione, come freschi, ed incorrotti, ed acciochè la presunzione non sembri troppo temeraria, premetto i differenti metodi, che rapporta il P. Ferrari, ad ottenere questa difficilissima incorruttibilità.

518. Dic' Egli L. 4. G. 4. I Gigli s' averanno poco meno, che perpetui, se prima, che s' aprano cogliendosi co' gambi loro, metterannosi dentro a vasi di terra nuovi, non invernicali, e poscia ben turati. Perocchè cavandosi dopo qualche tempo all' aria, apriranno graziosamente la bocca. La Rosa coll' arte si fa durare fino ad un anno, eziandio recisa dalla pianta. Il Didimo a tal fine l'immerge tutta nella morchia, sicchè il liquore sopravvazi. Altri prendono dell' Orzo in erba, cogliendolo colle radici, e lo mettono in un vaso di terra non inventriato: sopra quell' erba mettono le bocche delle Rose, e sopra quelle più erba d' Orzo, e così le mantengono. Altri cuoprono la terra ben battuta, e assodata dello stesso Orzo in erba, e sopra gettano vi delle Rose. Altri mettono i bottoni stessi dentro a cannelli di canna verde, non divelsa, avendo spaccato

cato il nodo, e stringono la spaccatura con carta, ma leggermente, che vi possa penetrar l'aria, e volendosi poscia la Rosa, si ricide la canna, e da quella cavata, dee bagnarsi con acqua tiepida, affinchè s'apra. Vi sono anche di quelli, che spiccano dalla pianta i bottoni, e gli legano anche attorno con filo di lino, e intingono la punta del picciuolo nella pece liquefatta; e avendo messi i medesimi bottoni in una canna, e questa turata con cera, o impeciata, la sotterrano in luogo declive, acciocchè non vi si trattenga l'acqua, e penetri nel cannelo, che corromperebbe il bottone. Tu fa in quest'altro modo, per aver lungo tempo le Rose: cogli le mezzo aperte verso la sera, tagliandole con ferro, senza toccarle con mano: la notte tienle al fresco; la mattina mettile in un vaso invernicato, e però men'atto ad inumidirsi, e turatolo bene, sotterralo nella rena asciutta. Potrai anche prendere le Rose già disseccate, e bagnate con acqua rosa, metterle in un vaso di terra, con tenervele per cinque giorni. Gioverà ancora metterle in una pentola nuova, e quella ben coperchiata, sotterrare in luogo scoperto. Si conservano tut' i fiori, e le Rose in particolare, mettendole non ancor aperte, in un vaso fatto di Quercia ben turato, e impeciato, che l'umore non vi penetri, col tuffarlo, e nascondendolo nell'acqua, o di pozzo, o di cisterna, o più tosto corrente, in cui meno si guasta. Se traendogli poscia dal vaso vorrai, che s'aprano, ficcherai il picciolo in un pomo, ovvero gli spruzzerai con aceto, e gli metterai al Sole, finalmente conserverai fresche le Rose in tal modo: Metti vino, e sale quanto basti in una pentola, e poi empila di Rose non aperte; cuoprila, e riponla dentro d'una stanza: quando poscia vorrai, che s'aprano, trattale

tele dalla pentola; ponle al' caldo del Sole, & di qualche fornace, e sembreranno belle, e fresche, come se allor colte fossero, e vehute dall'Orto.

§ 19. Se le descritte maniere sieno per riuscire in pratica, o almeno alcuna di esse, nè il Ferrari lo assicura per prova, fattane da sè, nè io lo posso assicurare. Sò, come dettommi dal Sig. Maresciallo D. Raffaele Regio, ch'egli avendo fatta pruova di una di queste maniere in tre diverse spezie, Rose, Garofani, e non sò, che altro, non ne vidde quel buon effetto, che se ne promette nel Dizionario portile del Coltivatore, di Autor Franzese, ove rapportasi in questi termini: 1. De' Fiori, che si vogliono conservare, scelgonsi i migliori Bottoni, che son prossimi ad aprire. 2. Si tagliano con forbici, lasciando loro un lungo stelo, almeno di tre pollici; 3. Si medichi l'estremità del gambo reciso con cera di spagna. 4. Si lascino appassire i bottoni, e poscia si involtinor dentro la carta ciascuno separatamente, e per fine si conservino dentro scatola. Quando poi si vorrà farli ravvivare, si tagli l'estremità dello stelo, per levarvi la cera, e posti nell'acqua, ove sarà ben mettere un poco di nitro, dopo un giorno si vedran rinvigoriti, come Fiori recenti, col vivo lor colore, ed eziandio coll'odor naturale.

§ 20. Or io stimo, che questa maniera, provata dal Sig. Maresciallo, manca in una condizione la più necessaria, e perciò non sia riuscita; cioè i Bottoni de' Fiori si vogliono meramente involtarli nella carta, e conservarli nella scatola, dove per sicuro penetra l'aria, la qual dōvrebbe esserne totalmente esclusa. Si sà da cento prove, che l'aria col suo moto, colla sua elasticità, e colla sue particelle fermentative, umide, penetrabili, e corrosive al-

tera, e corrompe tutt' i corpi, ed al preservarli dalla corruzione, per mantenerli interi, il principal segreto è quello, di serrarli dentro altro corpo, il qual non permetta all' aria verun accesso; così conserviamo il pesce, o checchesia immerso dentro l' olio, e nella gelatina; e così ha detto sopra il Ferrari, di conservare i Fiori dentro la morchia, e così in tutte quasi le sudette maniere prescrive, di chiudere i Fiori dentro vasi ben serrati, dentro canne sott' acqua, sotto terra, e sempre in guisa tale, che non vi penetri l' aria, cagion primaria della corruzion de' corpi.

§ 21. Ciò premesso, vengo alla pratica della maniera da me proposta. Trattasi di serbare illesa l' interna struttura degli organi de' Fiori; ciò che può ottenersi con far esalar lentamente tutto l' umido contenuto ne' vasi della struttura, senza cagionare in quelli la minima alterazione; acciocchè i vasi medesimi già voti dell' umor primiero, posti nell' acqua, possano un'altra volta, come prima succiar l' umore, rigonfiarsi, e ravvivare i fiori. Or se ciò è possibile ad ottenersi; almeno in alcune spezie, (al che io non impegno la mia parola) par, che siadesse uno de' mezzi più acconci d' intonacare i fiori di creta; e per farlo a dovere, sciolgasi la creta più sottile, e sciolgasi in tant' acqua, che divenga fluida. Con altra porzione di creta più teneante si vesta tutt' intorno lo stelo; e poi tutt' intorno al fiore avvolgasi un cartone, o carta straccia, a foggia d' imbuto stretto, e legato allo stelo dalla parte inferiore, e largo tanto dalla parte superiore, che lasci qualche spazio tra sè, e' l' fiore. Questo cartoccio si vada empando pian piano della creta fluida, e di questa sen' empia tutto anche il fiore, e vi si faccia penetrar dentro in ogni angolo, finchè tut-

de le foglie ne reffino per ogni parte serrate , e col-
pette: quivi si lasci immobile , ed espoſto al Sole ,
ed al vento , fino a tanto , che ſ' induri , e ſ' ac-
cagli perfettamente la creta , e poſcia ſi conſervi in
luogo aſciutto fino a quel tempo , che ſi vorrà . Al-
lora volendone far uſo , ſi metta in molle nell'acqua ,
e ſciolta la creta , ſi lavi , e ripulifca il fiore con
un pennello , e ſi troverà nella ſua medefima natu-
ral forma , qual'era prima , e col ſuo ſteſſo co-
lore , eccetto che alquanto mortificato , da rav-
vivarſi col tenerlo nell' acqua , ſeppur è vero , che l'
morto fiore poſſa mai ravvivarſi ; ciò che io non
oſo negare , almeno per qualche ſpezie particola-
lare , nè oſo affermare , per non averne o propria
ſperienza , o aliena ben conteſtata . Per certi fi-
ori di foglie ſottili , delicate , e numeroſe , come
ſon ne' Ranuncoli , Anemoni doppj , e ſimili
non par bene a propoſito il metodo della creta , ma
potrà uſarſi il ſeguente dell'arena ; ed univerſalmen-
te parlando , queſte pruove ſon da farſi più toſto con
fiori di poche foglie , e di ſoda teſtura , come ſon
Gigli , Tulipani , e ſimili . Ne' tentai una ſola pruo-
va con fior d' Arancio , e di un'altra forte , di cui
non mi ricordo ; ma quello vi ſi corrupe , e que-
ſto vi ſi conſervò mediocrementè .

522. Seppure non otterremo quel primo intento ,
avrem più agevolmente l' altro ora detto , che chiuſo
nella creta qualunque fiore , dopochè ſi farà ella indu-
rita , e diſſeccata al Sole , vi troverem dentro il fiore
di alcune ſpezie almeno , ſecco sì , ma pur nella ſua
ſteſſa forma naturale , reſo già incorrutibile , da poter-
ſi conſervare , per farne uno ſtudio di Botanica .
Queſta ſpezie d' immortalità può darſi a' fiori , ed
alle intere piante in due altre maniere , egualmen-
te , facili , rapportate dal Perrar. L. 4. c. 2.

T. II.

E c c

Dic'

323. Die degli s'intigne il fiore in acqua forte fatta di sali diversi, che chiamano Crisidica, e nel viente così vigoroso, che se gli restasse la morbidezza, del resto potrebbe stimarli allora colto. In altra maniera: Abbiassi dell'arena la più fina, e sottile, lavata bene nell'acqua, per segregarne la parte polverosa, ed asciugata che sarà, sene metta una porzione in vaso di creta, o casserta di legno, che sia più alta del fiori, i di cui stelli cacciati dentro l'arena, sino a toccare il fondo del vaso, si soprametta più arena finchè riempia tutto il vato, ed ogni angolo del fiore, e tutto lo circondi, lo ricuopra, e lo formonti. Quivi sepolti i fiori, faran costretti dal peso dell'arena a restare immobili nella positura medesima, come vi furono collocati, e a parer fiori vegeti, e recenti, non vi mancherà forse altro, che qualche vivacità di colore, dachè il rosso per ordinario, oscurasi, e va al purpureo, ma il giallo suoli mantenersi costante per replicata pruova, che ne ho fatta. Se nel fiore sia qualche parte crassa, e piena, com'è nel Tulipano il Ricettacolo delle semenze, si dovrà questa parte tagliare, ed aprire, per votarla di ciò che contiene, e riempire il voto di arena, tornerete a chiuderla, e ricomporla nel suo sito. A mantenere poscia questi fiori per lunghi anni, fa uopo, tenerli ben coperti sotto campane di vetro, per guardarli dalla polvere, e dall'aria, che li possono scolorare.

324. Prima che io avessi letto nell'Ecclesiastico questo secreto, avea da me pensato, a cercar maniera d'imbalsamare i fiori, e pensai di tenere a molle il gambo del fiore nella vernice bianca di gomma Sandaca, sciolta nello spirito di vino, oppure in quella di gomma Arabica, sciolta nell'acqua, come più conaturale a sicciarsi dalle piante, e ne

feci l'una, e l'altra pruova con speranza, che se arrivasse il fiore a succiar la gomma, indurita poi quella nell'intimo de' suoi meati, ne resterebbe indubitatamente imbalsamato, ed inalterato, tal qual era, per sempre. Ma nelle mie due pruove passava l'acqua pe' meati, passava lo spirito, ma non mai la gomma; e lo spirito in brev'ora vizzo, e floscio rendea il fiore. Ho voluto ciò ricordare, acciocchè se altri vorrà continuarne il tentativo, vada provando con altre sorti di gomme, che sciolgansi nell'acqua v. g. di Cimegio, di Mandorlo &c. che forse una se ne troverà così delicata, che passi pe' meati del fiore; e dovrà farsi pruova con più differenti spezie di fiori; perchè per avventura qualche spezie troverassi, che dia alla gomma libero il passaggio. Quindi pensai da me stesso alla sopra riferita maniera dell'arena, o della cenere, e con la cenere mi è sembrato, che i fiori perdon meno del vivace lor colore; ma se son fiori lanuginosi, a cui attaccasi la cenere, riesce al quanto difficile a distaccarnela.

525. Lascio poche altre cose addotte dal P. Ferrari, che giudico poco utili, come son due operazioni chimiche, per far nascere piant' e fiori improvvisamente, o farli rinascere dalle lor ceneri; ma son operosissime, e Dio sa, se vere. Più tosto vo conchiuder questo capo, con applicar più utilmente alle frutta quanto si è divisato sin' ora de' fiori. Dietro a' fiori vengon le frutta, e però nella maniera medesima, come quelli si fan venire fuor di stagione, possono ancor questi ottenersi in ogni tempo dell'anno. Tutte le maniere suddette sono applicabili alle piante da frutto, massime alle terragnole, ed arbusti, che si coltivavan negli orti, e si fan nascer da seme, da cipolle, tuberì, e radici.

Di più se non tutte, almeno alcune son applicabili pure agli alberi da frutto; ma sembra necessario, che sien gli alberi piantati dentro gran vasi, o casse di terra, fornite di ruote, per facilmente poterli trasportare, e difenderli ora dal caldo, ora dal freddo, e per poter applicar loro più comodamente le qualità delle contrarie stagioni, ibernali nell'Estate, e estive nell'Inverno, come si è prescritto.

§ 26. Così pure gli artifizj prescritti, per conservar vivi i fiori, o ravvivarli già morti, o mantenerli come vivi per lungo tempo, son tutti applicabili alle frutta, anzi più comodamente, e con più sicurezza riuscita, per la maggior sodezza, e durabilità, eh' è nel corpo della frutta; rispetto a' fiori di complession più delicata. Raccontasi dè un valente Giardiniere nella Toscana, che trovò il secreto, di conservar per dieci anni in un gran vaso pieno di terra un ramo di Melo con tre, o quattro Mele fresche, ed intiere. Così nel citato Dizionario del Coltivatore alla parola *Cavoli* scrivesi la maniera di conservar i Cavoli per tutto l'Inverno; cioè si scava un fosso nel giardino a profondità di quattro piedi, in forma di pozzo, e senè cuopre di paglia il fondo; troncansi i Cavoli nell'orto in tempo asciutto, e collocansi nel fosso l'uno presso dell'altro colla testa in giù, e sopra di essi un altro suolo di paglia, e poi un altro strato di cavoli, coperto di altro suolo più alto di paglia, sulla quale per ultimo spargesi un strato di terra a due piedi di altezza, calcandola un poco, e riducendola a forma di cupola; ed i cavoli vi si conserveranno, come recentemente colti dalla sua pianta.

C A P O XXXV.

Propongonsi alcuni artifizj, per dare a' fiori quel colore, o quell' odore, che non han da se.

517. **N** On sembra da dubitare, che vi sia l' arte di mutare a' fiori il natio colore; dacchè in questi tempi si son veduti Garofani di colori affatto stranieri; gialli; verdi, e turchini. De' gialli ne abbiamo avuti qui più razze differenti, ed il colore vi si è mantenuto costante anche ne' figliuoli, che si son piantati; però de' verdi, e di cotesti altri colori posticci ho saputo, che la tintura vada di deperdendo; ed è il pericolo ordinario di tai colori, per arte intrusi, come lo avverte il Ferrari, da cui si son prese le differenti maniere, da colorire i fiori, ch' egli raccolse da più Autori.

518. Prima di riferirle, son da permettersi due avvertenze: una è, che si adoperino piante di fior bianco, quando si evi in quella specie; perchè 'l bianco, come altrove fu notato, più agevolmente ammette qualche colore, che l' arte cerca d' insinuarvi. L'altra avvertenza è, che non si adoperino colori, e droghe, le quali abbiano del corrosivo, e del caustico, come tra gli altri è l'orpimento, e per ordinario i colori tratti da minerali; ma più tosto dovranno sempre usarsi gli estratti dall' erbe, fiori, frutta, legna, animali &c.

519. Due colori soglion più comunemente desiderarsi, e non trovansi ne' fiori, che assai di rado si

nero, e 'l verde: in molte spezie però si desidera il cilestro, o turchino, in altre l'aureo, o 'l giallo, in alcune il rosso, e 'l purpureo. Per lo nero dice il Ferrari, di valecci del frutto scaglioso dell' Ontano, seccato nello stesso albero, e ridotto in polvere sottilissima, oppure dell' inchiostro, frutto di Galluzzo, e Vetruiolo, insieme bolliti. Per lo verde sarà buono il sugo di Ruta pesta, e spremuta col torchio; e 'l corpo arido, che ne resta, carico di molto verde pare a me, che possa pur giovare mescolandolo colla terra. Altro verde si farà delle bacche ben mature del Ramno, o Pruno spinoso, che chiamano anche Spina cervina, le quali spaccate alquanto si fanno bollire in acqua, e con quell' acqua innaffia si la pianta, come si dirà. Per lo cilestro potrà usarsi il fior Campefe, o Campestre, detto pure Fioraliso, Battisegola &c. ed è il Ciano salvaico, che nasce comunemente in gran copia ne' campi da Grano di un vivo color turchino; di questi fiori secchi, e ridotti in polvere ci serviremo a tingere di color cilestro; e per lo turchino scuro sarà buona la tintura dell' Indico. Per l'aureo, e giallo, le suddette bacche, o coccole del Ramno, colte non ben mature, aperte, cotte nell' acqua allo stesso modo, daranno una tinta gialla; v'è sopra tutto il Zafferano, la Gutta-gomma &c. Per lo rosso, e purpureo adopera si la tintura del Verzino bollito con acqua, ed un poco di Alume, colata per terzo, o per quarta, e potrebbe fare un maggiore effetto il Kermes, e Lacca dello stesso Kermes. Viene anche nominato il cinabro ben macinato, ma è minerale, e potrà esser corrosivo, e dannoso alla pianta, o come corpulento non passerà da' meat, per andare a tingere il fiore.

§ 30. I metodi d' applicar tai colori, proposti dal Fer.

Ferrari, son questi. Si temperi nell' aceto letame di Pecora, e quando sarà rammorbidato, vi si aggiunga un pochetto di sale, per correggere la virtù astrigente dell' aceto, e per aprire alla mistura la strada, di penetrar meglio nelle radici. Quindi togliasi una parte delle polveri, o tinte già dette, e si mescoli bene con tre parti del letame, ridotto a consistenza di pasta, e scavando o nel vaso, o in terra una fossata, capace di ricevere una massa competente di tal composta, in mezzo alla stessa massa piantisi il bulbo, tubero, o radice del fiore, che si vuol colorare, e s'innaffi, e coltivi secondo il solito, e de' Garofani, e simili vi si piantano i germogli, le margotte con le barbuccie, i pedalinii nati recentemente da semenza &c. Se nella medesima massa si mescolino più differenti colori, stima il Ferrari col sentimento di Giovan Fabio, autore di questa ricetta, che sien per riuscire i fiori macchiati di più colori.

La seconda maniera, confermata colla esperienza più volte fatta, come attesta il Ferrari, è tale. Si prende terra grassissima, e mettesi a seccare al Sole infino a tanto, che risolvassi in polvere sottilissima: con essa empiesi un vaso, e nel mezzo si pone una pianta, o germoglio di fiore bianco: quindi s'innaffia mattina, e sera con una delle suddette tinte, o con quella del verziro, per dare il color rosso, e con le due cavate dalle bacche del Ramo, per lo verde, o per lo giallo &c. E però dal avvertire, che non piova su quella pianta, nè più vi caggia la rugiada; la onde si riponga il vaso al coperto la sera, ed in tempo piovoso, e si cavi solo in tempo chiaro, e sereno. In confermazione di questa ricetta aggiungo ciò, che riferisce il Rati *Hist. Plant. L. 1. Ca. 2. p. 40.* della sperten-

za facciano dal Laurembergio; autore di buona ma fede. Semina grani di Garofani bianchi nella descritta terra grassa, fatta seccare al Sole, e sottilmente fritolata, e cernuta: per tre settimane innaffioli con acque di differenti colori, cavati da vegetabili, adacquando un vaso di un colore, ed un vaso di un altro, osservando la condizione di ritirare i vasi la sera, ed in tempo piovoso al coperto; e gli riuscirono i Garofani, chi a color di zafferano, chi porporino, chi bianco, chi incarnato &c. Pensando io, che forse non eran necessarie tutte queste condizioni, per evitar la noja di eseguirle, posai a molle nell'acqua del zafferano semenza di Garofano bianco scempio, e ve la tenni per due giorni; la semmai, ed innaffiai continuamente con la medesima acqua per molto tempo, e poi di tanto in tanto, interrottamente sino a sei mesi e più; ed i Garofani fioriti quel medesimo anno, neppur portarono una leggier tintura di giallo; forse perchè non preparai la terra al detto modo, nè sempre guardai le piante dalla pioggia, nè mai dalla rugiada.

532. A far venire i fiori di una medesima pianta di tre colori diversi, due posticci, ed uno naturale, dice il Ferrari, di adacquarla, con due varietà in questo modo: delle due acque tinte una la mattina, l'altra la sera ne gitterai dall'uno, e dall'altro lato della pianta, in maniera, che ogni lato lo stesso giorno in diversi tempi bea l'uno, e l'altro liquore: alterando in tal modo l'innaffiamento, che quello della mattina non sia mai del colore stesso di quello della sera, nè dello stesso lato; verrà la pianta di due colori, ed insieme del terzo, che è il nativo. Intendo, soggiugn' egli, essersi felicemente fatta la prova, e mi giova di crederlo &c.

533. La terza maniera vien proposta da Giambattista.

Battista Porta per quelle piante, che hanno il tronco legnoso, come la Rosa, il Garofano, Gelsomino &c. Fendasi il gambo non lungi dalla radice, e parimente i ramuscelli, e dentro la fenditura mettasì dell'Erugine, cioè Verderame, ovvero dell'Indico, o del Zafferano, o dell'azzurro oltramontano, o di qual sisia altra materia da colorare, ben macinata, legando poscia la fessura all'intorno, e mettendovi pur attorno del letame; ma sarà meglio, che in vece del verderame, il quale è corrosivo, si applichi altro verde di vegetabile. Questa maniera sembra aver un vantaggio sopra le altre, che 'l colore può più facilmente introdursi per gli orecelli, o vescichette del midollo, che sono larghe, e potrà forse diffondersi per tutta la pianta fino a colorare i fiori, senza patire alterazione nel passaggio, la qual' altrimenti patirebbe, applicato eternamente alla radice, di porri più stretti, e quindi a passar dentro il legno ancor più denso. Però a questo vantaggio si oppone, che poca quantità di colore può introdursi nella spaceatura, e non sarà sufficiente, a tignere tutt' i fiori di una pianta di color forte, e vivo, ma sol potrà dargliene qualche leggiera tintura. Perciò consiglierai, a metter buona quantità di colore intorno alla fessura, che forse vi anderà passando coll' alimento; e di più sarà ben aggiugnervi l'innaffiamento con acqua del medesimo colore, acciocchè nè riesca più denso, e carico.

534. Per tignere i fiori, che vengon dal bulbo, come Gigli, Tulipani &c. ci varremo dell'istesso metodo dell' incisione, facendo de' leggieri tagli nella cipolla, ed inserendovi il colore, ridotto in polvere; ma de' Tulipani prescrive si in particolare, che i bulbi loro tengansi due, o tre gior-

ni in aceto, in fino a tanto, che s' inteneriscano, e cavatili, si metteranno ad asciugare un poco: quindi s' intaccheranno senza grave offesa, e ne tagli metteravvisi qual colore, che sarà in grado, stemperato con acqua vite, la qual non sia troppo ardente, e dopo un mese, che saranno acconci in tal guisa, si planteranno. Per consiglio di Fiorentino, citato dall' Imperadore Costantino, potrà tignersi di color vario il Giglio, col metter semplicemente tra le scaglie del bulbo, senza ferirlo, del Cinabro, o d' altro qualsivoglia colore.

539. La quarta maniera di colorare i fiori, è quella dell' innesto d' una pianta sopra d' un' altra di diverso colore: così per aver giallo il Gelsomino, o la Rosa, s' innesta sopra la Ginestra in una delle maniere divise nel trattar degl' innesti, e nominatamente quella di spaccare il ramo della Ginestra, e nella spaccatura inserirvi un ramicello della Rosa, o del Gelsomino dibucciato, senza però staccarlo dalla madre, la qual per ciò debb' esser piantata accanto della Ginestra, da staccarlo poi, quando sarà appigliato. Così pure per aver di due colori i fiori, uno proprio, e l' altro straniero, si stacca da una pianta capace d' innesto, v. g. dalla Rosa incarnata, un occhio, ed un altr' occhio dalla Rosa bianca, e quest' occhi si spartono giusto per lo mezzo, e la metà dell' uno adattasi esattamente all' metà dell' altro, come se fosse uno solo, e facendo tutto il resto alla maniera solita, vuolsi, che questo innesto abbia da appigliare, ed abbia a produrre fiori di due colori. In simil guisa, per le piante, che non son capaci di tal' innesto, v. g. per Garofani, si farà l' equivalente, con spaccare per lo mezzo d' alto in basso due germogli di color differente, ed applicando, e

legando in uno le due metà, vuolsi, che metteran radici, e daran fiori d'ambidue i colori. Pe' Garofani ella è voce molto volgare, che possono pigliar colore con una specie come d'innesto, piantandone i germogli su 'l tronco di altre piante recise vicino alla radice, dicendosi, che ne riescono di color cilestro, piantati sul tronco della Buglosa, o vogliam dire Borraggine, dell' Endivia, della Cicoria, ed anche del fior Campese, piante tutte di fior turchino; e ne riescono rossi, piantati sulla Carota, o sull' Ancusa. Così promette questa bella ricetta, dice il Ferrari, benchè io ho più volte ciò udito, non mai veduto.

§ 36. A dire il mio sentimento, sebbene vi sia l'arte di dar nuovi colori a' fiori, come da principio ho asserito, pur restò in dubbio, qual sia la vera delle recitate maniere: di quest' ultima de' Garofani, ed io, ed altri qui ne abbiám fatta qualche pruova con esito sempre infelice: e dell'altra dell'innesto ho dato a suo luogo il mio parere, che 'l frutto, e 'l fiore viene della specie medesima, di cui è la gemma; questa è l'esperienza ordinaria, e ci vorrebbero delle sperienze autentiche, per provar, che possa almeno il color del fiore cambiar di specie. Ma parlando in generale di tutte queste differenti maniere, ciascuna incontra la medesima difficoltà, che 'l colore da introdursi nella pianta, al passar che fa pe' suoi meatì, non s'alteri, e non si trasformi in tutt'altro di quel, ch'era. I miei Garofani abbeverati per lungo tempo con l'acqua del Zafferano, nutrivansi senza dubbio del color giallo, ma pur esso non arrivava giallo al fiore, e trasformavasi in bianco. Così molte piante di colori differenti dentro una medesima ajuola, benchè nutrite del medesimo alimen-

to, pur ciascuna, giusta la disposizione de' suoi organi, lo riduce al suo colore. Con tutto ciò potrà ben esser, che alcuna specie di pianta non alteri qualche sorte di colore, e gli dia libero il passo, o che qualche sorte di colore non si lasci alterare, o che la maniera di applicarlo non ne permetta l'alterazione; e però dico, che son da tentarsi da chi n'è vago, tutt' i varj metodi secondo le differenti ricette, e son da reiterarsi tentativi sopra diversi generi di piante, finchè sene abbia l'intento.

537. Rimane a parlar dell' altro artificio, di dare a' fiori quell' odor, che non hanno, o di correggerlo, se sia puzzolente; ma l' artificio è quel medesimo, di dar loro il colore, in vece del quale se si applichi alcuna cosa odorifera in ciascuna delle prescritte maniere, nè potrà riuscire odoroso il fiore, anzi ciò sembra di più facile riuscita, che non è il farlo divenir colorato: perchè gli effluvi del corpo odoroso consistono di particelle incomparabilmente più tenui, che non son le particole de' colori, e per esser volatili, e spiritose con tutt' agevolezza s' insinuano, e propagano sino al fiore, senza molto pericolo di venire arrestate, o alterate, fra le angustie degli organi.

538. Oltre a questa regola generale prescrive il Ferrari alcune particolari ricette. Prendi, dice egli, letame di Pecora, e macerandolo nell' aceto, vi potrai mettere del muschio, ridotto in polvere, del ribetto, o dell' ambra, o d' altra cosa, che odori, che quindi i semi, e da semi i germogli, e da questi fiori trarranno il medesimo odore. E qui avverto, che gli odori da adoperarsi, sieno de' più forti, piccanti, e capaci di larga diffusione, come gli accennati; ciò ch' è da

da farsi pure de' colori, che sieno carichi, e densi; acciocchè non abbiano a svanire colla esalazione, e dissipamento.

539. Più efficace vuol esso, che sia quest' altro medicamento, cioè preparare i semi stessi per due, o tre giorni con materie odorifere, o sieno liquide, o sieno in polvere, che così, non avendosi da trattar l'odore d'altronde, incorporato ne' semi molto meglio farà l'effetto. Apportane in conferma l'esperimento, fatta da un perito Fiorista d'otto, ed ingegnoso: questi tolse i semi del Garofano Indiano, o Turchesco, tanto vago alla vista, quanto all'odorato molesto, e per due giorni macerò gli nell'acqua rosa, in cui avea anche stemperato del muschio. Lasciatigli poscia seccare all'ombra, così asciutti li seminò. Il fiore del primo anno, siccome non avea lasciato il fetor natto, così riteneva alcun odore di muschio. I semi di questo fiore di nuovo medicati cogli stessi odori prodursi fero il fiore più soave nel seguente anno; ed i semi di questo un'altra volta acconci nella stessa guisa, fecero il terzo anno fiori soavissimi, sicchè in questi sentivasi l'odore della Rosa insieme, e del muschio.

540. Voglio creder, che nel descritto sperimento non si faria tardato per tre anni, a far divenire del tutto odorosi i Garofani Turcheschi, se oltre all'a macerazion de' semi nell'acqua odorosa, si fosse aggiunto lo adacquarli, per qualche tempo almeno con la medesima acqua odorosa, ciò che vorrei fatto particolarmente nel tempo medesimo della fioritura, quando sarà più agevole, che l'odore recente si comunichi a' fiori più vigorosi; e di più i semi, che si concepiranno in que' fiori, ne verranno anch'essi più fortemente,

im-

impregnati, per produrre un'altra volta, eziandio da se, fiori odoriferi. Il Dizionario del Coltivatore unisce pure insieme le due ricette così della macerazion de' semi, come dell'adacquamento. Nel seminare i grani, dic'egli, si deve stemprare il letame di Montone nell'aceto; vi si mette un poco di muschio, di zibetto, o d'ambra in polvere: quindi si fan macerare i grani, o le radici, tuberì &c. per qualche giorno dentro questo liquore, col quale poscia sene innaffiano le piante nascenti; ed i fiori, che ne verranno, esaleranno un odor sommamente soave, e grato, come lo ha confermato l'esperienza. Per le piante, che vengono da radice, da piantoncini, o margotte, l'operazione, farsi al piede, o alla radice, come si è fatto pe' colori.

541. De' comuni Garofani ortensi ella è dicitura ben autorizzata, che l'odore aromatico fu lor dato artificialmente circa i tempi del P. Ferrari, che così ne scrive = Alcuni de' moderni coltivatori, com'è noto ad ognuno, avendo con un punteruolo forate le radici della Bettonica, chiamata coronaria, e messivi de' Garofani aromatici, le diedero coll'odore il nome insieme de' Garofani; talche quella, perduto l'antico nome, si chiama ora solo col nome di Garofano. Col medesimo artificio potrà ciascuno render questi stessi Garofani tuttavia più odoriferi, forando loro le radici, e mettendovi qualsivoglia sorte di odore. = Tutta la difficoltà, che incontra questo fatto, sta in ciò, che l'odore intruso in quella prima pianta di Garofano sia passato ne' suoi germogli, e si sia propagato fino al dì d'oggi, e poi per sempre in tutte le piante susseguenti; giacchè per ordinario gli odori, o colori intrusi non si propagano a' figli,

nati da quella pianta, a cui furono applicati, nè può mai da se quel poco di odore, o colore renderfi tanto, che basti per molti.

542. Quindi s'egli è vero il presente fatto dell'odore, stabilmente comunicato a' Garofani; e se pur verò è, che 'l color giallo stabile sia stato dato a' medesimi per artificio, poichè questo colore, e quell'odore artificiale si è propagato, e conservato ancor nella progenie, dovrà dirsi, che qualche colore almeno, e qualche odore tenga virtù, e forza di muover, e trasformar sì gli organî della pianta, che indi in poi sien possenti a produr nuove particole di tal altra forma, propria di tal odore, e di tal colore; le quali cavan- do dalla comune massa dell'alimento, hanno poi sempre, onde trarne delle nuove, per parteciparle a' discendenti.

543. Ma a qual fine far insieme contraffar l'Arte colla Natura? Seppe benissimo l'Autor supremo della medesima adornar ciascun fiore di quel nativo colore, onde e da per se rendasi pregevole, e poscia dall'unione di tutti insieme una vaga deliziosa varietà, a contemplarli unitamente, ai nostri occhi risulti; e si facci ammirare. Riflette assai bene a questo proposito l'Autor dello *Spettacolo della Natura*: Riguardati i fiori tuti insieme, formano un assortimento regolarissimo; dove non si ravvisa nulla di rozzo, di sproporzionato, di duro, e questa durezza par che possa consistere nell'esser totalmente opposti, sicchè la lor combinazione riesca all'occhio dura, e spiacevole; anzi risulta da tutti insieme i lor colori una certa armonia, dove l'occhio trova tutto il suo pieno. Considerati poscia spartitamente, non ve ne ha uno, che non si faccia valere per qualche sua grazia particolare, e che non

bia, a parlar giusto, il suo merito personale.

341. L'istesso a proporzione può dirsi intorno all'odore, onde si dee ben conchiudere, che la Natura Maestra accortissima distribui acconciamente a ciascuna fiore il suo bello, nè può giammai l'Arte forzarla, per dir così, a cambiar quel disegno, dal quale risulta la sua compiuta bellezza; e qui siamo lecito così conchiudere colla riflessione dell'Autor sovra citato. *To. III. Dial. primo*: (Noi altri cerchiamo il bello a tentone; e questa materia, che noi modelliamo in mille, e mille maniere, per fabbricar delle case, degli arnesi, e degli abiti, non è plasmata da noi. Non sappiamo neppure quali sieno gl'ingredienti, che la compongono: la troviamo spesso volte contraria a' nostri disegni: ella si distrugge, o per dir meglio si scompone, e si sfaccia tra le nostre mani, ... Ma non è già così delle operazioni d'Iddio. Tutto ciò, ch' Egli fa, porta in fronte una bellezza accertata, e perseverante. Si conosce, ch' Egli ha il predominio sulla Natura, ch' Ei la volta, e rivolta a suo modo. Questa materia sempre obbediente a' suoi cenni s'adatta a prendere tutte le forme ch' Egli desidera, e produce a colpo sicuro tutti gli effetti, ch' Ei vuole.) Passo intanto dalla generale coltura dei fiori alla particolare di ciascuna loro specie.





PARTE QUARTA

DELLA

COLTURA DE' FIORI

*Coltura particolare di ciascun genere
di Fiori nobili.*

AVVERTIMENTO.



ON qui per descrivere il Catalogo di tutt' i generi, e spezie di fiori nobili, e di ciascuno la propria sua coltura per ordine di alfabeto ; ma ho stimato più comodo pe' Fioristi , e Botanici , prevalermi più tosto del nome latino , che dell' italiano ; perchè il latino è stabile presso i Botanici, e noto a tutte le nazioni , e l'italiano non è noto a tutti, ed è vario anche nella medesima Italia , spesso mutando di nome la stessa spezie da una in altra Provincia , o Città . Premetto però un indice italiano de' nomi delle piante col suo corrispondente latino , acciocchè possa un Italiano trovar subito il fior , che cerca , nel latino Catalogo . Vi ho anche posto il nome siciliano, ove sia diverso dall' italiano, e per co-

Tom. II A mo-

modità delle principali lingue di Europa vi ho aggiunto il nome Franzese , Spagnolo , Inglese , e Germano ; tratto dalla citata opera Phyrthanthoza del Weinmanno ; ed ove questi ne lascia il nome d' alcuna lingua , anch' io lo lascio , per non saperlo . Dal medesimo ho copiata la maggior parte delle figure de' fiori , e vi ho aggiunte non poche spezie , o individui , ch' ei tralascia , i quali ho ritratti da' medesimi fiori naturali . Ne tralascio anch' io alcuni di minor conto , e pur altri , e forse molti de' buoni , de' quali non ho potuto averne la notizia , e l'esemplare .

Di ogni genere per ordinario ho delineate solamente le principali spezie , le quali abbiano fra loro qualche notabile diversità , ed a ciascuna di queste riduco le lor consimili non delineate , nominandole , e notandone la sola differenza , che hanno dalle lor principali , o nel colore , o nella grandezza , o in altro considerabile accidente . Nomino tutte le varie spezie , che trovo nel Weinmanno , e poscia , se ne restano , quelle altre , che annovera il Clarici , che tutte abbondantemente raccolse da Botanici . Son parco nelle figure de' fiori men nobili , ma fo il compenso con un maggior numero d' immagini nelle spezie più riguardevoli .

Dopo divise le varie spezie di ciascun genere , ne soggiungo la qualità , e poi la coltura sua propria , cavata , come detto è altra volta , dagli Autori più accreditati , o dalla propria sperienza . Noto espressamente quelle spezie , che son odorose , e lascio di notarlo in quelle , che nol sono ; così noto di alcune spezie , che reggono al gelo ne' climi più rigidi d'el nostro , ne quali costumano di ritirar le piante al coperto , per sottrarle dal freddo dell' Inverno , che le farebbe perire ; ed ove ciò non si troverà notato , intendasi , che quelle piante son di più delicata complessione (e son la massima parte , che non sostengono il rigore di tali climi) ; e però bisognerà qui-
vi

vi ritirare i vasi nelle conserve a cotal uso destinate.

INTORNO ALLE TAVOLE

La Tavol. 1. rappresenta una Villa con a fianco due Giardini, uno di fiori, e l'altro di frutta, e quivi Cloride presidente a' fiori, perciò anche nominata Flora, coronata di fiori, con simil corona nella destra, ed un ramo di frutta nella sinistra, in atto di offerir quella, e questo alle Compagne, che son da un lato, la Botanica in atto di cavar col lambico dall' erbe, e fiori la lor virtù, e dall' altro lato la Fisica, che osserva un fiore col Microscopio, e poscia Pomona, o sia l' Agricoltura, con vanga, e cesta di frutta, che riposa in terra il lasso fianco. Con tal rappresentanza vuolsi alludere al titolo dell' Opera, che promette frutta da' fiori, cioè vantaggio non che sol pe' Fioristi, ma pur pe' Botanici, Fisici, ed Agricoltori, col motto:

Flora cuique suos fructus ex Floribus offert.

La Tav. 2. contiene le figure del Fico, delle varie polveri seminali, e degli stromenti per la coltura de' fiori, come già di tutto si è ragionato, e sol restano quattro altre figure, delle quali si parlerà nella coltura de' Garofani. Così pure della Tav. 3. si è parlato, ove si è trattato del disegno del Giardino. Tutte le seguenti Tavole si son date a' fiori con qualche spezie di pianta, non già degna per lo suo fiore, ma che per se stessa suol tenersi ne' Giardini, perchè bella, o capricciosa. Nella incisione de' Rami, ho avuto per compagno il P. Mario Cammareri, e vuol la gratitudine, che io faccia qui onorevole menzione della sua perizia meccanica, la quale, benchè insigne in ogni genere di cosa, non è però ella, che una mera appendice allè molte altre sue doti, nelle più alte facoltà. I Periti avran motivo da scusarci, quando troveranno in questi nostri lavori cosa da censurare,

se sapran, che ambidue ora per la prima volta abbian quest' arte appresa, ed esercitata.

Di più avvertir deggio, che le figure si sono stampate in due differenti maniere, altre al solito con inchiostro, ed altre a colori naturali, per quanto lo comporta la stampa, la qual non permette quella proprietà, e varietà di colori, che sol può dare il pennello: ma potrà ben raffigurarsi almeno la qualità del colore il più propinquo al natural del fiore. Quindi alcuni libri, secondo le richieste, avran le figure stampate ad inchiostro, ed altri a colori: queste seconde, buone da se stesse, per alcuni altri libri saran colorate a pennello, per chi vorrà i fiori, espressi al vivo nella lor propria forma, e fino color naturale. Di coteste carte colorate avverto, che non rare volte il color del fiore nella figura è differente dal colore descritto nel Catalogo, non già per errore, che sarà raro, ma per elezione in que' fiori, che ammettono nella sua specie più varj colori, come son v. g. i Tulipani; giovando tal volta alla buona comparfa di una carta un concerto di colori differenti dal prescritto, ma non alieno dalla specie del fiore.

Per ultimo avvertimento aggiungo ad istruzion de' Pittori, e Disegnatori (e con ciò mi risparmio l'Appendice, lor promessa nella Introduzione al Tratt. 1.) che volendo valersi di queste imagini per prototipo de' lor disegni, leggano prima nel Catalogo ciò, che dicesi di quella sorte di fiore, che imprendono a copiare, intorno alla sua grandezza, e varietà di colori, o altra simile circostanza, che potrà giovare alla lor pittura: quivi troveran notato, che qualche specie di fiore è molto più grande di quel, che mostra la sua figura, scorciata per ciò, che non capiva comodamente nel rame. Quivi pure leggeran la varietà de' colori, e potran dare alla copia qualunque di que' colori, che lor meglio aggradirà; e quivi potran qualche notizia ricavare della qualità della pian-

pianta, quando abbiano a ritrarla, e così vi potran trovare altri simili agevolamenti. Di più le immagini de' fiori rappresentansi per ordinario nella postura, e situazione delle foglie, la più comune in quella specie, e lor più connaturale; mà non per tanto al Pittore vien limitata la solita libertà di variar, -e dar sito alle foglie forzato, stravolto, e pittoresco; eccetto, che non sien di que' fiori, la di cui forma, e disposizione non suol ammettere variazioni.



CATALOGO

PRIMO ITALIANO

*Di tutt' i generi di Fiori nobili,
compresi nel Catalogo secondo
dal nome Latino.*

A

A Cacia *Acacia* Tav. 4.
Aloe *Aloe* Tav. 4.
Amaranto *Amarantibus* T. 5.
Amarella *Matricaria* T. 39.
Anemone *Anemone* Tavol.
6., e 7.
Apocimo, o sia Fritillaria
crassa. *Apocimum*, seu
Fritillaria crassa. Tav. 8.
Aquilegia, o Aquilina *Aqui-*
legia Tav. 7.
Argemone, o Argemolo.
Anemone Calcedonicum.
Tav. 6.
Armerio *Caryophyllum* T. 14
Asfodelo, Asfodillo *As-*
phodclus Tav. 9.
Asfodelo Giglio. *Lilium*
Asphodelum Tav. 34. e 35.
Astro *Aster* Tav. 9.
Asteroide *Astroides* Tav. 9.

B

B Alaufa, o sia Melogra-
nato dal fior doppio,
Granata Tav. 23.
Balfamina Femina *Balsami-*
na Femina Tav. 10.
Barba di Becco *Tragopogon*
Tav. 59
Battiscula *Cyanus* tav. 18
Becco di Grù. *Geranium*
Tav. 22
Bellide *Bellis* tav. 10.
Blavelco *Cyanus* tav. 18.
Bulbo *Colchicum* tav. 16.

C

C Alendula *Calendula*.
Tav. 11
Caltà palustre *Caltà palustris*
Tav. 11.
Campanella *Campanula* t. 12.
Campanella Priamidale *Vio-*
la

CATALOGO I. PART. IV.

la Pyramidalis - tav. 64.

Cannacoro Canna Indiana

Florida *Cannacorus* tav. 12)

Caprifoglio. *Periclymenum*.
tav. 47

Caracalla, Caracolo, Caracò

Phascotus Indicus ta.47.

Cardamindo *Nasturtium In-*
dicum = tav. 43.

Cardiaca Africana. *Leonu-*
tav. 30.

Cardinalitia *Rapuntium* t. 52

Cartamo *Carthamus* tav. 13.

•Ciano • *Cyanus* . : tav. 18.

Ciclamiño *Cyclamen* tav. 19.

Colchico *Colchicum* tav. 16

Colombina *Aquilegia* tav. 7

Consolida Reale. *Consolida*
Regalis. tav. 17.

Convivolo. *Convolvulus*.
rav. 17.

Corona Imperiale. *Lilium*
Corona Imperial. Tav. 37

Corona del Sole. *Chrysanthemum* tav. 15.

Coronaria Lychnis tav. 28

Coriellone *Corydon* tav. 18

Crifantemo	<i>Chrysanthemum</i>
ray-	15.

Crucif.	Crucif.	17.
Croc.	<i>Crocus</i>	18.

Cucubalo *Cyclamen* ta. 19

D

Datura *Stramonium* t. 57
Digitale *Digitalis* t. 20

Digitale *Digitalis* t. 20

Dittamo bianco *DiStamus*,
seu Fraxinella tav. 19

E

E Licrisio *Gnaphalium*,
seu *Helicrysium* tav. 23

Elleborino *Helleborine* t. 24

Elleboro *Helleborus* tav. 24

Emanto *Hemanthus* ta. 23.

Emorocale Valentina *Narcissus major* t.64

Epatica nobile *Hepatica no-*
bilis t. 23.

Erioforo *Ornithogalum* t. 44

Esperide *Hesperis* t. 25.

F

F Agiuolo Indiano *Pha-*
seolus Indicus t. 47.

Ficoide <i>Ficoides</i>	t. 20.
-------------------------	--------

Fior Campese, o di Frumen-
to *Cyanus* t. 18

Fior Cardinale *Rapuntium*

Fiore Indiano *Flos Indicus*

Fior di morto *Tagetes* t. 58

Fior d'ogni mese , o Fior
rancio *Calendula* t. II.

Fior di notte . *Mirabilis*
Peruviana

Fior di Passione . *Clematis*
Passionis

Fior Perpetuo. *Helicrysum*

Fior

CATALOGO I. PAR. IV.

Fior di Primavera *Primula Veris* t. 48
 Fior Regio *Consolida Regia* tav. 17.
 Fior della Trinità. *Jacea* tav. 27.
 Fior Velluto. *Amaranthus* tav. 5.
 Frassinella. *Dittamus*, seu *Fraxinella* tav. 19.
 Fritillaria *Fritillaria* t. 21
 Fritillaria crassa *Apocymum* tav. 8.

G

G Aggla *Acacia* t. 4
 Garofano *Cariophyllū* tav. 13. e 14
 Garofano Messicano, o Turchesco *Tagetes* tav. 58
 Gelsomino *Jasminum* ta. 27.
 Gelsomino Indiano. *Gelsominum Indicum* t. 21.
 Geranio *Geranium* tav. 22
 Giaggiuolo Giglio, o sia Iride *Iris* ta. 28
 Giacèa *Jacea* ta. 27.
 Giacinto *Hyacinthus* ta. 25, 26, & 64
 Giacinto Stellare. *Ornithogalum* ta. 44.
 Giacobea. *Jacobea* ta. 27.
 Giglio di varie spezie. *Lilium* ta. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,

Giglio azzurro, o celeste. *Iris* tav. 28.
 Giglio delle convalli. *Lilium convallium*. ta. 33.
 Giglio di Susa, o di Persia. *Fritillaria* tav. 21.
 Gimè. *Jasminum* ta. 27.
 Ginefra. *Genista* ta. 21.
 Girasole. *Chrysanthemum* tav. 15.
 Giuliana. *Hesperis* ta. 25.
 Giunchiglia. *Narcissus juncifolius* tav. 41.
 Gladiolo. *Gladiolus*. ta. 23.
 Granadiglia. *Clematis Passifloralis* tav. 16.
 Grana di Papagallo. *Carthamus*. tav. 13.
 Granato. *Granata* ta. 23.
 Guantelli. *Digitalis* ta. 20.

I

J Alappa *Mirabilis Peruana*, tav. 40
 Iride, Irios. *Iris* tav. 28
 Jucca. *Tucca* tav. 65

L

L Eonuro. *Leonurus* t. 29.
 Leucojo, o sia Viola, a ciocca. *Leucojum fruticosum* tav. 29. & 30.
 Leucojo bulboso. *Leucojum*
 Licnide *Lychnis* tav. 38.
 Li-

Ligabosco *Periclymenum* t. 47
 Lilac *Syringa* tav. 57.
 Linaria *Linaria* tav. 37.

M

M Adrefelva *Periclymenum* tav. 47.
 Malva *Malva* tav. 39.
 Malva A. borea *Rosa Sinensis* tav. 53.
 Margaritella *Bellis* tav. 10.
 Martagone Giglio *Lilum Martagon* tav. 34. 35. 36.
 Matricaria *Matricaria* t. 39.
 Melagrano, Melogranato *Granata* tav. 23.
 Meleagride *Fritillaria* t. 21.
 Meniante *Trifolium* tav. 59.
 Maraviglia di Francia *Balsamina femina* tav. 10.
 Maraviglia del Perù *Mirabilis Peruana* tav. 40.
 Mille fiori *Thlaspi* tav. 59.
 Moli *Moly* tav. 40.
 Mugarino *Jasminum* tav. 27.
 Mughetto *Lilium Convallium* tav. 33.
 Muscari *Hyacinthus* tav. 26.
 Muschietto *Cyanus* tav. 18.

N

N Arciffo *Narcissus* tav. 40. 41. 42. & 64.
 Nasturzio Indiano *Nasturtium Indicum* tav. 43.

Noce Metelli *Siramniat.* 57
 Noctu olens *Geranium* t. 22.

O

O Livella *Ptarmica* t. 48.
 Oleandro *Nerium* t. 43.
 Orchide *Orchis* tav. 44.
 Orecchia d' Orso *Auricula Ursti* tav. 9.
 Ornitogalo *Ornithogalum* tav. 44.

P

P Alma Christi *Orchis* t. 44.
 Pancrazio Marino *Narcissus Major* tav. 64.
 Pan porcino *Cyclamen* t. 19.
 Pantofola della Madonna *Helleborine* tav. 24.
 Papavero *Papaver* tav. 46.
 Partenio *Matricaria* t. 39.
 Peonia *Paeonia* tav. 45.
 Perpetuella, Perpetuino *Ptarmica* tav. 48.
 Persico, Pescio *Malus Persica* tav. 39.
 Populagine *Salix palustris* tav. 11.
 Primavera *Primula Veris* tav. 48.
 Ptarmica *Ptarmica* tav. 48.
 Ptarmica Austriaca *Xanthoxylum* tav. 65.
 Pulsatilla *Pulsatilla* tav. 49.

B

Qua-

- Q** Uamoclit *Convolvulus* tav. 17.
- R** Anuncolo *Ranunculus* tav. 49. 50. 51.
- Rapontio *Rapuntium* t. 52.
- Rosa *Rosa* tav. 52.
- Rosa della China *Rosa Sinenfis* tav. 53.
- Rosalauro *Nerium* tav. 43.
- S** Ambuco rofeo *Sambucus rosea* tav. 54.
- Satirione *Orchis* tav. 44.
- Sciamito *Amaranthus* tav. 5.
- Sanicola *Auricula Ursti* t. 9.
- Sassifica *Tragopogon* tav. 59.
- Scabiosa *Scabiosa* tav. 54.
- Sciarappa *Mirabilis Peruviana* tav. 40.
- Scilla *Ornithogalum* t. 44.
- Scolimocefalo *Scolymocephalus* tav. 54. 55.
- Scorzonera *Scorzonera* t. 56.
- Semprevivo *Sedum* tav. 56.
- Serantemo *Xeranthemum* tav. 65.
- Serpentaria *Serpentaria* t. 56.
- Sesamo Orientale *Digitalis* tav. 20.
- Sesamoide *Sesamoides* t. 56.
- Siringa *Syringa* tav. 57.

- Sisirinchio *Sysirinchium* tav. 56.
- Sparto *Genista* tav. 21.
- Spofa del Sole *Caltha palustris* tav. 11.
- Stramonia *Stramonia* t. 57.
- T** Agete *Tagetes* tav. 58.
- Tamarindo *Tamarindus* tav. 59.
- Testicoli di Cane *Orchis* tav. 44.
- Tlaspio, e Tlaspidio *Tlaspi* tav. 59.
- Trachelio Americano *Rapuntium* tav. 52.
- Trifoglio aureo *Hepatica nobilis* tav. 24.
- Tritoglio *Trifolium* tav. 59.
- Tulipano *Tulipa* tav. 60. 61. 62. 63.
- Tulipifera *Tulipifera* t. 63.

- V** Erga d' oro *Virga Aurea* tav. 65.
- Veratro bianco *Helleborus* tav. 24.
- Vilucchio *Convolvulus* t. 17.
- Vincibosco *Periclymenum* 47.
- Viola, o sia Leucojo *Leucojum* tav. 29. & 30.
- Viola Marzia, o Mammola *Viola Martia* tav. 65.
- Viola

Viola Martia di tre colori

Jacca

tav. 27.

Viola Matronale *Hesperis*Viola Piramidale *Viola Py-*

ramidalis

tav. 64.

Umbillico di Venere *Co-*

tyledon

tav. 18.

Z

Zafferano *Crocus* t. 18.

Zafferano salvatico

Carthamus, & *Colchicum*

tav. 13.

CATALOGO II.

*Dal Nome Latino de' suddetti Generi di Fiori nobili
col suo corrispondente Italiano, Siciliano, Franzese,
Spagnuolo, Inglese, e Germano. Varietà delle
spezie di ciascun Genere, e lor Coltura*

Acacia Tab. 4.

I Tal. Gaggia, Acacia. Sicil. Cassia. Franz. Casie, Aca-
cia veritable d' Egypte. Spagn. Acacia. Ingl. Egyp-
tian-thorne. Germ. Ägyptischer Scotendorn.

Fig. 6. Acacia Egiziaca vera, di Fiochetti Gialli, for-
temente, e soavemente odorosi. Un'altra se ne costuma
ne' Giardini, detta Acacia Indica Farnesiana presso Clarici,
e par, che sia la medesima, detta Americana di Robino,
la qual produce i fiori a grappolo, e son Papilionacei,
simili a que' del Faggiuolo, di color biancastro, e rosseg-
giante, ancor essi odorosi.

E' un albero spinoso, le di cui foglie son fatte, co-
me quelle della Mimosa, o sia erba sensitiva, o come
quelle della Triumfetta, ed hanno la medesima proprietà
di queste, che chiudonsi la sera, e riapronsi la mattina.
Tutto l'albero adornasi di tai fioretti rotondi a guisa di
pallotta, e va i fiori somministrando tal volta dal fine
della Primavera per tutta l'Estate fino all'Autunno. Le

B 2

Aca-

Acacie propagansi col seme nel mese di Marzo , il qual si terrà nell'acqua per alcuni giorni ad ammollirsi , e macerarsi , per essere troppo duro , e di più sene stropiccia la punta sopra una pietra , finchè aprasi un poco la scorza , acciocchè non resista molto all'introduzion dell'umore , e all'uscita del germe . Piantansi in terra grassa , ed umida , ed in sito aprico , ove sien guardate dal Sole per la maggior parte del giorno .

Acriviola V. Nasurtium Indicum
Alcea , vel Alcea Sinensis V. Rosa Sinensis
Aloe Tab. 4.

Ital: Aloè . Franz: Alòè , Perroquet. Spagn: Hiervà babosa . Ingl. Zeahous Leek . Germ. Aloè .

Fig. 1. Africano di foglia triangolare , detto volgarmente Iride Vvaria , che fiorisce a spiga , o grappolo , di fiori rossi , e poi aperti si cangiano in gialli , i quali stanno qui espressi molto più piccoli della lor propria grandezza . Ve ne ha di un'altra sorte d'inferior bellezza della medesima spezie con spiga di fioretti a stella , simili alla fig. 2 , di color bianco gialliccio . A questa spezie si può ridurre l'Aloè Tuberoso , detto Jucca gloriosa maggiore con grande spiga di molti fiori , simili a que' della Jucca Tav. 65. e nella grandezza , e nella forma .

2 Umbellifero maggiore , ferrato , cioè di foglie dentate a maniera di sega , con fiori sparsi di bianco , e rosso , ed altro ven'è di fior rosso .

3 Africano umile di foglie vagamente macchiate di bianco , e spiga di fiori rossi , che in punta vanno a finire in verdegajo .

4 Africano ferrato umile con foglie similmente macchiate di bianco , e corimbo , più carico di fiori consimili .

5 Aloe vero minore con fiori a mazzetto di un bel rosso cremisi . Poco differente è l'Aloè Africano con spi-

spine rosse nelle foglie , e fiori a mazzetto , misti di di cremisi , e di giallo , e verde gajo in cima .

Il Rame non ne capiva più , ma poteano aggiungerfene altri *Africani* ancor belli , che fioriscono a spiga lunga , tutta di simili fioretti ornata , e con foglie pur macchiate di bianco , ed orli or bianchi or rossigni , che fan queste piante non men belle de' loro fiori . Degno similmente da ritrarsi è l'*Aloè* vero di costa spinosa col gambo del fiore ramoso , ed i rami carichi di simil sorta di fioretti ; e degno pur è l'*Aloè* Guineese con foglie di verde chiaro , e scuro , ondeggiante , e fior simile al *Giacinto* : come ve ne sono di tal sorta di fiore alcuni altri *Africani* , o *Americani* . I libri de' Fioristi non par , che abbiano sin'ora adottato l'*Aloè* tra fiori nobili , ma realmente lo merita , come ogn'un vede , nelle proposte immagini , ed oggidì è in uso , di averlo ne' più riguardevoli giardini per la varietà de' capricci , e vaghezza sì de' fiori , come delle piante . Son contenti di qualunque coltura , e di terra forte , moderatamente grassa : reggono al caldo , al freddo , ad alla sete , nè amano troppo l'umido : moltiplicansi con levare i rampoli , che gli nascono accanto , ed in tutto sieguon l'indole del nostro *Aloè* Massimo , che chiamiam *Sicil. Zabbara* .

Amarantibus Tab. 5.

Ital. *Amaranto* , Fior velluto , Sciamito . Franz. *Amarante* . Ingl. *Floiver-peutil* . German. *Amaranth* , oder *Tausendschön* .

Fig. 1. *Amaranto* spigato a color d' oro di angusta foglia : simile a questo vi è il bianco , il rosso , l'erbaceo , e di altri colori , e forme poco dissimili .

2 *Coccineo* massimo pannicolato . Sicil. *Giummu di Rigina* . Del qual vi è il giallo , il bianco , e di più varietà di rosso , e varietà di figure , tutte belle , e capricciose .

3 Coduto purpureo . Sicil. Cricchia di Gaddu : a questa spezie possono ridursi i Cristati di varj , e bei colori , e forme , più piccoli , ma che hanno qualche apparenza di cresta di Gallo .

4 Globoso turchino , che dà un poco nel cremisi , onde ha il nome il color detto di Amaranto , della qual spezie vi è il bianco , il rosso , e di qualche altro colore , che partecipa del rosso .

5 Spigato rosso , di foglia larga , e vene ha non guari differente aureo , purpureo , verde &c. e tal'uno anche colle foglie della pianta vagamente purpuree .

6 Tricolorato nelle foglie della pianta , cioè giallo , verde , e rosso : Sicil. Gilusia : detto anche *Bitum maculosum* , *Herba Papagalli* , altro è verde , e rosso , o verde , e giallo , o tutto finamente rosso : non ha fiore di buona apparenza , ma gli fu negato dalla saggia Natura , perchè ne fece la pianta sì gaja , e bella , che l'ornamento del fiore n'era superfluo .

Gli Amaranti son fiori estivi , e contansi fra i più nobili : ammetton la varietà di tutt' i principali colori , eccetto che rara volta ne vengon variegati di più colori , ma pur Clarici ne nomina quattro , il Cristato , variegato di rosso , e giallo : lo spigato giallo , e color di carne ; il variegato di color d'oro , e di fuoco : il Bronzino , e color di carne . Ha di più la dote , d'essere immarcescibile , onde trasse il nome dal greco vocabolo *Amaranthinon* ; e per quel poco di vivacità , che perde già secco , afferma Plinio , che i Romani per uso delle lor festive corone , bagnandolo nell' acqua , lo ravvivavano : *Mirumque , postquam desecere cuncti flores , madefactus aqua reviviscit , & hybernas coronas facit . Hist. L. 21 , c. 8 .* E certo , che coll'acqua sola non si ravviva ; ma forse v'era l'arte , come poterlo ravvivare .

Per quel , che s'appartiene alla lor coltura , riescon bene in terren grasso , e forte e mediocramente solatio

fio : si seminano nel Marzo , e nell' Aprile e poi si trapiantano con ordine : il suo seme facilmente degenera, e piglia de' mali compagni le cattive impressioni : e però ad averlo buono , è necessario , di osservar l'importante regola già prescritta , levando via da tutto il giardino ogni Amarantho di mal gusto , e ciò si faccia preventivamente al fiorir di quelli , che vengon destinati a semenzire , i quali sieno i più eletti . Di più avverte il Clarici , che ad ottener ottimo il seme , hanno a svelarsi tutt' i fiori laterali , lasciando solamente il fior principale del tronco .

Anemone, & Argemone Tab. 6. & 7.

Ital. Anemone ; Anemola . Sicil. Anemulu , e Argemulu , Franz. Anemone . Spag. Hiervaviento , Ingl. Windflower , Germ. Anemone , Röslein .

Fig. 1. Anemone doppio della foglia larga , la qual sta quivi espressa sotto al suo fiore , detto volgarmente Argemone , da altri Garofano Turchesco , e da Botanici Anemone Calcedonico , il qual abbiamo ritratto dal naturale , come tutti gli altri di questa tavola , poichè mancano nel Weinmanno . Quell' unica specie , che ho io veduta , è di color rosso coccineo finissimo , con strisce verdi nelle foglie più basse ; ma il P. Ferrari ne distingue due specie , ed il Clarici sotto nome di Anemone Calcedonico quattro forti ne numera , cioè del fior doppio , Verde , violaceo con linee rosse ; Rosso , e bianco con linee verdi ; Color d' oro variegato di bianco ; il tutto rosso , ed il Prolifero di un fior sopra l' altro , che i Giardinieri chiaman fiore in fiore . Di tutti questi , dice egli , che son fra gli Anemoni di poca stima ; però all' occhio mio pajono egualmente stimabili .

2 Anemone semidoppio della foglia stretta di color bianco , e turchino , mostruoso di due steli , e di due fiori , de' nostri di semenza , quai sono gli altri di questa

Tavo-

Tavola, per dare un saggio de' capricciosi *Anemoni*, che ci son nati dal seme.

- 3 *A* foggia di Ranuncolo, e color di Rosa.
- 4 Di foglia lunga ritorta, ed impuntita, di color rosso con strisce bianche, simile a fiamma.
- 5 Bianco fregiato di rosso.
- 6 Di foglia larga, e color finissimo di Lacca.
- 7 Turchino
- 8 Macchiato di pavonazzo sopra campo bianco.

Anemone Tab. 7.

- Fig. 1** Ortense semplice, listato di giallo, e rosso.
- 2 Semidoppio, misto di bianco, e rosso.
 - 3 Semidoppio di tre colori, bianco, rosso, e turchino.
 - 4 Doppio incarnatino, che dà nel giallo, venutomi da semenza.
 - 5 Doppio, misto di rosso, e bianco, e ceruleo.
 - 6 Doppio, maggiore, misto di rosso, e turchino livido.
 - 7 Doppio, turchino di mantello corto, cioè di foglie corte intorno al fiocco.

L' *Anemone* va con giusto merito tra i fiori di primo rango, non solo per la sua varietà, e mistura di tutt' i principali colori, e per la lor finezza, ma pure per certa grazia, e gentilezza sua particolare, che rendelo signorile: sene trovan anche di color giallo, o gialliccio più tosto, de' quali alcuni ne porta il *Veinmanno*, ma debbon esser rari, nè io gli ho mai veduti: ne viene anche alcuno verde, massime dalla semenza, ma questa rarità proviene da malattia, e dall' umor mal digerito, come ci è succeduto nell' 1762, che fu piovosissimo, e cattivo pe' fiori, e molti *Anemoni* eziandio degli antichi ne riusciron verdi, o mezzo verdi, e mezzo coloriti. Questo bel fiore ha l' imperfezione di non ispegarsi, e far pompa delle sue bellezze, se non lo miri il Sole, standosene all' ombra chiuso, e stretto tanto, che un bell'

bell', e grosso *Anemone* doppio non fa quasi miglier comparsa nelle caraffe di uno scempio.

La coltura, per lo pregio del fiore, n'è stata molto studiata da' Fioristi, sino a renderla stucchevole; e noi lasciando da parte la troppo affettata, prescriviam la più comune, comprovata dal buon riuscimento. A tenor delle regole, date pella coltura generale, non hanno a piantarsi gli *Anemoni* nella medesima terra, ove furon nel precedente anno, ma o gli si muti luogo, o gli si muti la terra, la qual amano leggiera, sciolta, mediocrementè grassa, e che abbia del sabbionoso; dacchè nascono volentieri nella sabbia, come ci viene insegnato da Plinio L. 21. c. 23. *Silvestris prima, altera in cultis nascens, utraque sabulosis*. Quindi alcuni usano con profitto, di mettere in fondo terra macera, grassa, e sottile, e sopra d' essa un dito di terra sabbiosa, nella qual posano i tuberì, o sia le radici, e di simil terra le cuoprono, e poi ultimamente ricuopron tutto con la prima terra grassa, &c. Una tale industria è giovevole per tutte le radici, tuberì, e bulbi, che son più soggetti a corrompersi, come sono i tuberì degli *Anemoni*, i quali stando sepolti nella sabbiosa, e magra, stàn più sicuri dalla corruzione, ed avendo di sopra, e di sotto il grasso, hanno onde attrarre la sostanza dell' alimento. Ella è diligenza da usarsi almeno co' vecchi, o mal fatti, i quali si guasteranno per sicuro in terra pingue, ma v'è speranza, che rimettansi nella magra, e sabbiosa. Per tal sorta di terra intendiam quell' arena sottile, e morbida, che ha qualche porzion di terra, la qual viene deposta dal corso dell' acque ne' viottoli degli orti, ne' solchi de' campi, e circa le rive de' fiumi; poichè questa, benchè magra in apparenza, ella è piena di que' sali, che promovon la vegetazion delle piante, e per la speranza, che sen'è avuta, vien dagli Autori universalmente commendata.

Il giusto tempo da piantarne i tuberi ne' climi temperati, come il nostro, è tutto il mese d' Ottobre; dopo cadute le piogge, ed ho veduto, che i primaticci fogli non riescono meglio de' tardivi, seppur talvolta non tradiscano la stagione: ma ne' climi più freddi, bisogna prevenire, piantandoli nel mese di Settembre, e ne' più caldi nel Novembre. Posson anche piantarsi in ogni tempo dell' anno, purchè nell' Estate guardinsi dal Sole, tenendoli in luogo fresco, e così alcuni fanno Anemoni per tutto l' anno: ma non è d' arrischiare con razze buone, perchè fogli non di poi perire le radici per lo patimento. Sono stato solito di piantar gli Anemoni scempi nella fine d' Agosto, per averne i fiori anche dal principio di Novembre sino a tutta la Primavera; e per ordinario si sono ben conservati.

Godono del sito aprico, esposto al Sole, e ventilato, e appunto dal vento l' Anemone piglia il nome nella greca favella; e come i venti caldi, ed impetuosi assai lo danneggiano, così da' venti freschi, e soavi piglia gran giovamento, cantando il P. Rapini. Hort. l. 1.

Ille tamen sese meliori proferet ortu,

Lenis ubi placidi spiraverit aura Favoni:

Namque & amat Zephyros Anemone, & amatur ab illis.

Piantansi le radici non più di tre dita sotterra, distanti l' una dall' altra circa mezzo palmo le più grosse, e benestanti, e le piccole, e deboli circa quattro dita. L' occhio del tubero si metta sopra, ma seppur contra natura sieno piantati sottosopra, il male non sarà sensibile. non si mettano insieme co' Ranuncoli, perchè son piante che mal si confanno insieme, come altrove fu detto.

Succede tal volta, che la pianta troppo vigorosa sfoga tutto il suo rigoglio in foglie, ed in vece di fiori, produce foglie di sodo, ed alto gambo. Si dà per rimedio, che quella radice nel venturo anno si planti rot-

ta in pezzi, per indebolirla; seppure non fiasi ella da se infiacchita dopo il suo vano sfoggio di tante foglie. Vi si levano le foglie ingiallite, o secche, ma non mai le verdi; vi si zappa due, o tre volte la terra gentilmente col sarchiello; adacquansi moderatamente, acciocchè il soverchio umido non li corrompa; ne' più rigidi climi ritirarsi al coperto i vasi, per ripararli dal gelo, e ne' giorni tiepidi espongonsi al Sole. In tempo della fioritura destinansi per la semenza i migliori fiori, e vassi mettendoli in pratica, quanto si è prescritto nel Cap. 15. Par. 2. per ottenere scelta, e numerosa prole: e qui bisogna ricordarsi della prevenzione, altrove fatta, ch' essendo questa semenza bambagiola, acciocchè il vento non la porti via, o bisogna stare pronto a coglierla, o bisogna tener coperto di velo, o carta il botton della semenza. Questa può seminarli subito, che sia colta, come vuole: il P. Ferrari, per averne il fiore nella Primavera dello stesso anno, purchè sia in luogo fresco, e totalmente a baclo; ed io qualche volta l'ho fatto; ma sarà meglio, (come fu detto Par. 2. Cap. 16. n. 225.) per aver fiori doppi, che si aspetti l'Autunno, che n'è il tempo proprio, quantunque abbia per ordinario ad aspettarsene il fiore nell'anno susseguente. Nel seminarla, per dividerne i grani, l'uno dall'altro, vi si mescola un po' di terra, e colle mani si va stropicciando, finchè sarà ben segregata, e poi largamente sparsa, vi si mette sopra col crivello, o colle mani un sottil velo di terra, che meramente la cuopra, e non l'opprima; si adacqui leggermente, e sempre umida si mantenga con tutto il resto, che si è ordinato nella coltura Generale.

I tuberì hanno a levarsi da terra, quando già sono ingiallite le foglie, non ancor totalmente secche, e senza strappargli le foglie, mettansi larghi in luogo asciutto arioso, e fresco, e passati circa otto giorni, vi si strappino le foglie, e d'una in una si va lor tagliando con col-

tellino tutto il secco, e fracido sino al vivo; anzi alcuni più diligenti, acciocchè al ripiantarli non ripulluli la cancrena, usano con profitto, di medicarne i tagli con della cera, sciolta insieme colla trementina. Quindi lasciansi ad asciugare del tutto in luogo ventilato, ed in luogo ben asciutto si conservano, non che per l'anno prossimo, ma eziandio per due, o tre anni, senza che patiscano detrimento; anzi dicono i periti, che un tal lungo riposo li rinfranca meglio, e producon fiori più corpulenti, e primaticci, come altrove si è riferito. Finalmente il moltiplico della lor prole si ha da quelle linguette, o appendici, che stanno attaccate al tubero principale, dal quale si staccano, per piantarle separatamente: ogni picciolo frammento di queste, se abbia occhio, crescerà in nuova pianta, e se non sia troppo picciolo, darà fiori nello stesso anno quel della foglia stretta, ma il Calcedonico, o sia Argemone non fiorisce, se il tubero non sia grosso. Il tubero dell' Argemone, per riconoscerlo, è di color più oscuro di quello dell' Anemone, ed in vece di linguette ha occhi tondi, e gonfi, ed è di collo bislungo, e sottile; ma nel resto entrambi son simili, e n' è del tutto simile la coltura.

Antholissa V. Gladiolus.

Apocimum, seu Fritillaria Crassa. Tab. 8.

Apocimo. Fritillaria crassa. Franz. Apocin. Inglef. Dogsbane. Germ. Hundes Kochl.

Figur. 1. Maggiore con rughe rosse sopra giallognolo.

2. Minore Mostruoso di simil colore, alquanto più lieto.

3. Minore simile non mostruoso, ma orridetto con rughe porpuree oscure.

Queste specie di Apocimi sono Africane, molto diverse

verse dagli altri. Apocimi; hanno anche non poca diversità dalla Fritillaria, e sol ne tengon qualche vestigio nella pittura del fiore, le foglie del quale sono in quella dipinte mirabilmente a scacchi, o quadrelli, ed in questi sono scaccheggiate di rughe oblunghe a due colori. Così la pianta, come il fiore hanno del bello, e del capriccioso: ho io veduta solamente la terza specie: ma non so, nè truovo ne' miei libri la sua particolar coltura; però parmi, che non possa esser guari diversa da quella de' Fichi d'India, co' quali ha molta similitudine la pianta, eccetto che questa è piccola, e le foglie, del pari carnosse, non son piatte, e larghe, ma più tosto vanno al ritondo; e come quelli non richieggon quasi veruna coltura, ed ogni foglia germina in ogni luogo, così par, che di questa possa presumersi.

Aquilegia Tab. 7.

Aquilegia, Colombina. Franc. Anchole. Ingl. Colombine. Germ. Agley. Scloken-Blumen.

Fig. 8. doppia di color ceruleo, ed ha simile la Turchina purpureggiante, la Rossa, l'Incarnata, la Purpurea nericcia, la Vergata di striscie bianche, e turchine, o bianche, e rosse, la Bianca, e la Cinerea, e così d'altri poco differenti colori.

9 Non Corniculata, di fior eretto, bianca, mista di verdognolo, e ve ne sono altre doppie di varj altri colori, come le sopradette.

10 Stellata, di fior purpureo doppio, e vi ha la Stellata di fior roseo, la Rosseggiante, la Violacea, la Bianca punteggiata di nero, la Variegata, la Cinerizia con punti purpurei.

Il Clarici ne aggiugne due d'altra specie; le quali hanno il fiore come una picciola Rosa, dette Degeneri, perchè se spesso queste da un luogo all'altro si trasportino, pigliano un color verde, che purpureggia. Dal se-

me di quelle prime Corniculate ne nascono anche non Corniculate, e Stellate, ed a vicenda dal seme di queste ancor quelle. Fioriscono il Maggio, e Giugno, e facilmente ne vengono doppie dal seme, e molto varie di colori, e di forme, per lo qual riguardo hanno qualche luogo ne' giardini. Differiscono al secondo anno la fioritura, amano il Sole, e terren grasso, e forte, si seminano nel Settembre assai larghe, perchè son piante, che si sollevano, e dilatano, e nell' altr'anno si trapiantano: dura per molti anni a vivere la stessa pianta, e si può anche prorogar la sua vita con dividerne le radici nel principio della Primavera.

Arbor Jude V. Siliqua rotundifolia.

Armerius V. Caryophyllum.

Asphodelus, vel Asflula Regia. Tab. 9.

Asfodelo, Asfodillo, Asfla Regia. Franz. Asphodele. Spagn. Gamones. German. Asfodilien.

Fig. 1. Giallo maggiore, del qual ven'è altro minore giallo; altro bianco poco più piccolo con foglia d'Iride nella pianta; bianco ramoso maggiore uno, e minore l'altro; gialliccio bianco con linea gialletta in mezzo alla foglia; giallo Italiano con gran fiore; rosso soave con foglie macchiate. V'è di più l'Asfodelo Liliaceo, il qual si troverà delineato fra i Gigli Tav. 35. Fig. 1. e due altri Gigli Asfodeli nella Tav. 34. Fig. 1.

Ogni terreno sta bene a queste piante, purchè sia umido, fresco, e poco scoperto dal Sole. Altri Asfodeli son bulbosi, ed altri tuberosi, e propagansi con la molta prole, che gli nasce accanto, o col seme, per chi avesse la pazienza d'aspettarne la prolissa fioritura. Piantansi nell'Ottobre ad un palmo di distanza, e dopo due anni cavansi, per levargli la prole, e subito si rimettono in terra, per non farli patire. I fiori son pregiati ancora per lo soavissimo odor, ch'esalano.

Asfl

Aster, & Asteroidea Tab. 9.

Astro, ed *Asteroide*. Franz, petite *Espergoulte*. Sp. *Estrellada*. Germ. *Strer-kraute*.

Fig. 2. *Astro* della nuova Inghilterra altissimo, purpureo col cuore giallo.

Altro simile di fior più grande, tutto giallo, e totalmente simile al *Crisantemo Indiano minimo* della fig. 2. Tab. 14. eccetto che quest'*Astro* ha la foglia della pianta stretta, e lunga, come porta la sua specie, e quello larga, e grande, come i *Crisantemi*; altro autunnale turchino purpurascante; altro tutto purpureo di fior più piccolo: Altri gialli, o minori, o eguali; e l'*Attico* di fior turchino con cuore giallo di buona grandezza.

3. Ramoso del Canada, ceruleo, col disco, o cuor gialligno: altro non guari differente della nuova *Flandra*: tutto violaceo dilavato; altri due simili di foglia stretta; altro di fior simile alla *Bellide*, bianco con disco giallo.

4. *Asteroide Americana* nodosa, di fino color turchino con cuore rosso,

Altra più degna vien rapportata dal *Turnefort*, detta *Oriente*, di fior grandissimo, con foglia di *Petasitide*,

Il *Clarici* vi aggiugne gli *Asterischi*; i quali hanno il fior raggiato, e l' disco di più fioretti, compresi in calice stellato, più grande del fiore, e nomina il Giallo annuo, il *Solferino*, il Giallo dal fior minore; il Giallo dal fior basso piccolo; il Giallo supino spinoso; e quello di *Candia* col disco, e la corona gialla, il quale spira fragranza, ch'è fra la *Rosa*, e l'*Incenso*.

Fioriscono sulla fine dell'Estate, e nell'Autunno: son contenti di qualunque terra. Si seminano o nella Primavera, o nell'Autunno, quando il seme compiscono, e per non perderlo, uopo è, star con attenzione a raccorlo:

pro-

propagansi anche colle radici ne' medesimi due tempi ; ma meglio sul principio di Primavera , ed è pur necessario divider le radici per islargarli , particolarmente alcune spezie , che assai le moltiplicano , e largamente serpeggiano , ed avvincigliate alle vicine piante le affogano . Si son meritato il nome d'Astri per la forma delle foglie del fiore , disposte a stella , o anche per la lor bellezza .

Auricula Ursi, vel Sanicula Tab. 9.

Orecchia d'Orso , Sanicula ; Franz. Oreille d'Ours .
Germ. - Ohrlein , oder Bar-Sanickel

Fig. 5. Vergata di purpureo , e bianco

6. Doppia purpurea
7. Stellata , e mista di rosso , e giallo .
8. Di gambo grosso con fior purpureo Farinaceo .
9. Di fior grande, rossa con giro verde all'intorno .

Questo gener di fiori va in molta stima presso i Fioristi per le sue degne prerogative : è un mazzetto di fiorelli gentilissimi. ricrea colla fragranza de' suoi profumi: dura la sua fioritura per tutta la Primavera , e di alcune razze sino alla prossima State, o anche nell' Autunno : ma sopra tutto piace la vivezza , varietà , e mistura d'ogni sorta di colore , nella qual dote , par , che superi ogni altro genere, trovandosene anche di color nero , benchè il nero non veggasi quasi mai ne' fiori ; e a dir vero , il nero delle Orecchie d'Orso non è altro propriamente che un purpureo così denso , e scuro , che sembra nero . Il Weinmann ne apporta più di 70, miniate a colori differenti , ed il Clarici dice , di contarsene più di 300. Hanno pure le sue figure diverse , come le Stellate , le Lacinate &c; e quella , che chiaman Borragginoide di fior picciolo , e si milissimo al fior di Borraggine nel colore , e nella forma . Le più stimate son le doppie , o quelle di fior grande , e di quelle une , come delle altre ne conta Clarici da 6. Specie

zie; ma ora colla pratica, da noi insegnata, se ne potran cavare dalle semenze altre nuove moltissime .

Il lor paese natio è nelle Alpi, e nelle terre nevose settentrionali : ne' climi temperati , come il nostro, appena l'abbiam vedute, che si son perdute; ma credo, che francamente si manterrebbero nelle nostre Città di Montagna, ove regna il freddo; purchè ancora quivi tengansi all'ombra in luogo fresco nell'Estate, e nell'Inverno abbiano poco Sole, seppure il paese non sia da se molto freddo. Richieggon una terra vigorosa, e concimata di sterco bovino, che la mantenga morbida, e grassa, non senza una competente dose di sterco di Cavallo, che la renda soffice, e leggiera, come prescrive nello Spettac. della Natura: ma il Clarici vuol la terra non affatto pingue, ed io vi accudisco per i climi temperati, ove il concime potrebbe lor nuocere coll'inimico calore, e stimerei ottima senz'altro una terra nera, cavata dal bosco. Colla coltura migliorano assai di condizione da quel, ch'eran sù i Monti: moltiplicansi col seme, e co' rampolli, che germogliano giù dal piè, allato allo stelo principale: di là staccandoli, dopo che saranno sfiorite le piante, e piantandoli in terra fino alle foglie, e adacquandoli con frequenza. Che se mai, soggiugne il Sig. Pluche, nello sverre i medesimi polloncelli, non venissero via insieme le barboline, che sono necessarie, per farli nuovamente radicare, si scalza la radice, e le si tagliano addrittura i necessarj fermenti, che non per questo la pianta perisce. Nel far però una cotale operazione, convien guardare con diligenza, di non toccare i bocciuoli, cioè gli occhi del suo pedale, che son le speranze degli anni futuri, Quando poi trapiantasi lo stesso pedale co' suoi polloncelli, si lascia sempre fuor della terra il magliuolo, dove lo stelo s'unisce alla radice, la qual è fata a navicella.

L' altra maniera, di propagar l' Orecchie d' orso per
Tom. II. D via

via di seme, riesce alquanto prolissa, ma deve riuscir più profittevole per la quantità, e qualità delle nuove, e rare razze, che ne verranno. E' prolissa per la tardanza, che suol mettere, a schiudersi questo seme; e ad ajutarlo, tienfi per qualche giorno a macerar nell'acqua, e seminasi, preventivamente nel principio d'Autunno in terra sottile d'erbaggi, ed osservasi tutto quel, che si è prescritto per i semi piccoli, come detto è del seme de' Ranuncoli, seminandolo largo, coprendolo leggermente con un fil di terra, tenendolo sempre all'ombra, e sempre umido, e sol nell'Inverno può darglisi qualche occhio di Sole, per risvegliare il germe ancora dormiente, sebbene poi alla metà di febbrajo gli si levà di nuovo il Sole, per costringerlo a germogliare nel Marzo, o nell'Aprile: che se tutt'ora non sarà nato, non per questo n'è perduta la speranza, si conservi in luogo fresco, e si adacqui sempre la terra, come se vi fosse nato; perchè vi nascerà dopo un anno, e tal volta dopo due, come nel cap. 18. si è detto, ove parlammo del Loglio. Il nome d'Orecchia d'Orso le fu dato per la somiglianza, che ne han le foglie della pianta; e secondo altre sue proprietà ella è detta degli Svizzeri Fior delle rupi, e dagli Austriaci Rosa de' sassi, ma più comunemente col Mattioli vien chiamata Sanicula per la celebrata virtù, che ha, di risanar le piaghe; e dalla virtù di giovare ai nervi, è nominata Atritica Lunare, o Paralitica Alpina. Mostra esser grande tal sua virtù il proverbio, che ne han formato i Franzesi, riferito da Ruelio L. 3. c. 71.

Qui ha du Bugle, e du Sanicle,
Fait aux Chirurgiens la Nicle

Balaustia V. Granata.

Balsa-

Balsamina Femina Tab. 10.

Maraviglia di Francia. Fiorent. Begl'uomini. Franz. Merveille. Ingl. Balsame. Germ. Balsam-kraut. Weiblein.

Fig. 1. Doppia con fiori di color diverso sull'istesso piede, bianchi, rossi, misti di bianco, e rosso, o purpureo, ed incarnati.

2. Semplice purpurea

Non si sa, perchè questa pianta sia stata nominata Balsamina, e perchè femina, a distinzione della Maschile, la qual'è la Momordica, altrimenti detta Caranzia, Viti-cella, Pomo mirabile, Pomo Gerosolimitano; giacchè non han fra loro veruna similitudine, e son realmente di spezie diversa; nè tampoco son dispari di sesso, ma sono entrambe ermafrodite; nemmeno convengono nella virtù balsamica, che tiene la caranzia, per curar le ferite, ond' ebbe ella il nome di Balsamina, nè trovo notato, che l'abbia la femina Balsamina. Con più merito la chiamiam maraviglia noi, ed i Franzesi per la bellezza de' suoi fiori, e per la rarità di produrne di varj colori sulla medesima pianta. I suoi colori però s'aggirano solamente tra il bianco, e il rosso di tutti i varj gradi, fino al purpureo, e paonazzo con qualche tintura di turchino. Fiorisce l'Estate fino all'Autunno; i semi si mettono in terra grassa, e macera nel mese di Marzo; e nati, e cresciuti competentemente, prima che mettan profonde radici si trapiantano, per distribuirli con buon ordine, e larghi per lo giardino. Per averne buon seme, oltre le date istruzioni, si vadano strappando i fiori de' rami laterali; subito che avran fatta la lor comparsa, quando già cominciano ad appassire, e se ne lascino solamente alcuni pochi nel tronco di mezzo, a maturare il seme più vigoroso. Sarà esso maturo, se non sarà più verde, ma quasi nero, e bisogna prevenire a coglierlo, prima che la sua buccia scoppi da se, perche essendo grandemente elastica,

allo scoppiare, getta lontano i grani, e li disperge.

Barbula Hirci V. Tragopogon.
Battifecula V. Cyanus.

Bellis Tab. 10.

Bellide, Margheritina. Franz. Margarites, Pasquettes. Ingl. Dayzie. Germ. Mafzlieben.

Fig. 3. Ortenfe di fior doppio cremefino, e prolifera per altri fioretti, che produce intorno. Altra prolifera doppia, bianca, detta massima, globosa, e vien descritta da Boerhaave, alla quale, come riferisce Clarici, con maravigliosa fecondità nasce un nuovo gambetto florifero da ciascuna fogliuzzza del calice del primo fiore; nè con minor fecondità le fogliuzze de' fiori, così nati, hanno altri gambetti floriferi, di bellezza certamente straordinaria a vederli. Una terza prolifera, variegata soavemente di rosso, e di verde, doppia, vien nominata dallo stesso Clarici, ed altre simili non proliferose rosse, o bianche.

4. Fistulosa rara, doppia, da noi delineata sopra il fior naturale, formato di piccoli tubi in vece di foglioline, di soavissimo colore incarnatino.

5. Pratenfe maggiore, bianca con disco giallo semplice.

6. Maggiore bianca, fistulosa con ampio disco giallo rossigno, semplice.

7. Spinosa Cretica gialla, che sembra doppia.

8. Leucantema con foglie di Tanaceto nella pianta, di color cinericio, e disco gialligno, semplice.

9. Silvestre minore di gambo corto, che dal bianco va all' incarnato, semplice: Così altre due silvestri di gambo alto con disco verde, una incarnata, e l'altra variegata d' incarnato, e giallo, belline, benchè silvestri.

10. Cerulea globularia doppia.

Pes

Per antonomasia furon dette Bellidi da' Latini, dalla lor bellezza, come Plinio notò Hist. L. 21. c. 81. *Bellis a bello, seu pulchro florum colore denominata*: e per certa lor propria, e singolar gentilezza furon poi anche nominate Margarite, e da qualchuno fiori di Primavera, perchè fioriscono nell' Aprile, e Maggio, e continuano per buona parte dell' Estate talora fino all' Autunno. Vivon bene in ogni sito, e son contente di qualsivia terra d' Ortaglia: si Propagan co' semi, e colle radici, dividendole ad ogni tre anni, e mutando loro la terra nel mese di Marzo, o preventivamente nell' Ottobre. Come piante piccole di copioso fogliame, e di un buon verde, tempestato di sì vaghi fioretti, disposte a cordone tutt'intorno all'ajette, ovvero miste a vicenda con piante di più riguardevole levatura, fanno al giardino uno de' più gai ornamenti.

Bigonia V. Gelseminum.

Blaveolus V. Cyanus.

Calceolus Mariae V. Helleborine.

Calendula, vel Caliba Tab. II.

Calendula Fior d'ogni mese, Fior rancio. Franz. Solfie, Soulsie, Soulcy. Ingl. Marigold. Germ. Ringel-Blum.

Fig. 1. La massima, o maggiore di fior aureo doppio.
2. Maggiore, di fior giallo doppio, le quali due hanno le confimili a color di mele, ed hanno anche le sue semidoppie, e scempie. Altra doppia con le foglie rivoltate viene aggiunta da Clarici.

3. Di fior semidoppio pallido, e macchiato d'aureo nell'estremità; e vi ha la doppia maggiore, variegata di giallo, e pallido.

4 Prolifera, di più fiori semplici gialli, ed altra Prolifera

liferà , secondo Clarici , con fiori maggiori e color , che al mele si accosta ; lasciandone altre semplici men degne .

Provergon dal seme , seminato in Settembre , ed Ottobre : cresciute alquanto si traspiantano , e mettonsi a suo luogo a due , o tre unite insieme ; come vuol Clarici , tagliando loro le foglie più della metà , ed in tal forma riescon per lo più doppie , o almeno con fiore di straordinaria grandezza . Ma io non do credito a tal segreto , nè per la doppiezza , come altrove ho dimostrato , nè per la grandezza del fiore , parendomi , che due , tre piedi insieme , debbano furar l'uno all' altro il sostentamento , e più smunti produrre i fiori ; seppur non sieno , come certe piante , che aman l' ombra , la qual si fanno elleno scambievolmente , e così stan meglio unite in società . Non temono il rigido freddo , nè tampoco il caldo , ed ogni terreno . e qualunque sito lor si confà . Il lor fiorire comincia nell' Aprile , e continua fino all' Inverno , nel qual , massime se sia rigido , fan qualche pausa ; e però son chiamate Calendule , perchè fioriscono per ogni Calenda , cioè quasi per ogni mese dell' anno . Leva qualche pregio alla bellezza di questo fiore , l' esser troppo comune , e l' odor poco grato , ch' esala .

Caltha Palustris , vel Populago Tab. 11.

Ital. Caltà Palustre , Sposa del Sole , e Populagine .
 Franz. Magnerite , Germ. Schmaltz - Blumen .

Fig. 5. Di fior giallo pieno ,

6. Semplice dello stesso colore , nè si sa , che abbiano altra varietà di spezie .

Nasce frequentemente in Inghilterra , e nelle vicinanze di Salisburgo in campi paludosi ; e però deesi tenere nel luogo più fresco , ed umido del giardino , ove stia
 tem-

sempre con acqua al piede; ed ove abbia da piantarsi ne' vasi per necessità, non bisogna forarli al fondo, acciòchè mantengan l'acqua, e la terra vi stia intrisa, come ne' pantani. Nel soprametter nuov' acqua, si scoli prima quella, che soprabbonda, e si cambj colla recente, acciòchè non si corrompa la terra, la qual debb' essere grassissima. Propagasi col seme delle semplici, e con la prole, che nasce accanto alla radice, la qual cavasi ogni tre anni, e nell' Autunno si ripianta. Fiorisce nella Primavera, e delle volte ancora nell' Autunno.

Campanula Tab. 12.

Campanella. Franz. Campanule; Gantelée, Gands Notre Dame, Clochette. Ingl. Belflower, Rampions. Germ. Fraven-Spiegel.

- Fig. 1. Eretta di fior turchino.
 2. Ortense cerulea di fior grande.
 3. Maggiore lattescente, detta piramidale del medesimo colore, che dà nel violaceo.

Di tutte tre vi son le bianche: Consimile alla prima è l'Ortense dal fior lungo ceruleo, detta Viola Mariana; ed altra di questo nome di foglia, e fior lungo cinericio. Vene ha Purpurea, variegata di bianco, e violetta, variegata a raggi degli stessi due colori; quelle delle Isole Canarie di un bel color di fuoco con radice tuberosa; quattro Silvestri con le foglie di Persico, due doppie, Bianca, e Cerulea, ed altre minori di minor pregio.

Sogliono fiorire sulla fine di Primavera in Maggio, e Giugno, e le Silvestri continuano sino ad Agosto. Moltiplicansi col seme, sparso ben largo in Terra d'ortaglia nel principio dell' Autunno, e con le radici, le quali serpeggiando, molto si dilatano, e per tenerle ad ordine nel primo sito, ad ogni tre anni cavanli da ter-

ra nell'Ottobre, spartonsi, per piantarle altrove, e purgandole dal guasto, rinovasi loro la terra: le si dia il sito più tosto aprico, e s'innaffiano in abbondanza.

Cannacorus, vel Canna Indica. Tab. 12.

Cannacoro, Canna Indiana florida. Sicil. Fruttighiu, Franz. Basilier, Canne d'Indie. Spagn. Cuentas. Germ. Indianisches, Blumen-Rohr.

Fig. 4. Picchiettata di rosso sopra campo giallo, ed altra più bella di tutte, addotta da Clarici, a color d'oro, e di fiamma, macchiata di punti neri: le son campagne la Rossa comune, la Rossa di finissimo scarlato, la Pallida di foglia stretta, e la Incarnata splendente di foglia larghissima nella pianta.

5: Massima, di rosso fiammeggiante.

Ama sito palustre, cioè fresco, ed umido, e terra grassa, e sostanziosa, come le Canne, e n'è simile la coltura, e similmente propagasi colla divisione delle radici, da farsi in ogni biennio, ripiantandole in altro sito. Vien ella pure dal suo frutto, feminato in Febrajo, e Marzo, del qual'è uso, farne Corone, da recitar le preci, e dal frutto noi la diciam Fruttiglio.

Caprifolium V. Periclymenum

Caracalla V. Phaseolus Indicus

Cardamindum V. Nasturtium Indicum

Carthamus, sive Cnicus sativus, Crocus sativus, vel Saracenicus. Tab. 13.

Zafferano salvatico, o Saracinesco, Grana di Papagallo. Sic. Usfaru. Franc. Carthame, Saffran-bâtard, Grain de Peroquet, Spagn. Alazor, Azafran, Borde. o Romin, Smiente Papagago. Ingl. Bastard Saffron, Mock Saffroc.

Fig.

Fig. 1. Di fino color rosso, che trabocca nel giallo, con foglia larga nella pianta; ed altro ven' ha di foglia stretta, in nulla però differente nel fiore.

Chiamansi Grana di Papagallo, perchè del suo seme mangiano i Papagalli, e dicesi Zafferano salvatico ec. per essere come un succedaneo del Zafferano, intorno a tinger giallo, ed a condire i cibi. Da questo utile fiore cavasi ancora il Rossetto di Spagna, quel, che va messo in piccoli piattini, e serve molto a i Tintori, e Pittori per miniature. Inquanto alla coltura potrà darglisi quella medesima, che si dirà del Zafferano.

Caryophyllum Tab. 13. et 14.

Garofano, Gherofano, Grofano, Garofolo. Franz. Girophle, Oeillet. Spagn. Aleli Sanamanda. Ingl. Gilly Flovver. Germ. Gevurtz - Nagelein.

Fig. 2. Garofano Ortense maggiore doppio con frangia larga di finissimo cremisi intorno ad ogni sua foglia sopra campo bianco di latte.

3. Orlato, e tratteggiato d' incarnato sul medesimo campo bianco.

4. Frangiato, e screziato di punti, e lineette di color pavonazzo sopra bianco.

5. Merlato tutt' intorno di punti, e di tratti sottili con vaga simmetria. In queste quattro figure abbiám delineati quattro de' nostri Garofani, per dare un saggio di que' molti, e belli, che cavarò abbiám dalle semenze coll' applicazion delle polveri seminali, come nel cap. 14. Part. 2. si è lungamente discorso: vero è però, che manca l' arte in delinearli, e la vivacità de' colori, per esprimerne al vivo la rara lor bellezza.

Caryophyllum Tab. 14.

Fig. 1. Ortense maggiore Prolifero con Garofano
nella 1^a p. II. E nel

nel mezzo, flagellato di purpureo, e bianco, venutoci ancora dalle semenze,

2. Garofano a Rosa incarnato con le foglie ritondate, senza i soliti merli all'intorno, stimato per la rarità.

3. Giallo; e ven'è altro giallognolo inegualmente sparso di rosse linee; siccome altro giallo con merletto incarnato gentilissimo, l'avevam qui, e l'abbiam perduto; ed un altro di simil campo giallolino, rigato di rosso.

4. Di fondo bianco, e merletto incarnatino nella maggior parte delle sue foglie, con alcune foglie del tutto incarnatine, alcune altre del tutto bianche, ed altre per metà bianche merlate, e per metà incarnatine, detto per ciò da me Garofano Pazzo, uno de' più rari, e gentili, venutomi da semenza, che mi morì subito compiuti i fiori, senza lasciar eredi.

5. Ortense minore incarnatino, striato di bianco.

6. Ortense semplice minore,

7. Inglese di fior purpureo con merletto bianco, e puntato per tutto il giro della foglia.

8. Inglese doppio incarnatino;

9. Cinese rosso scuro con gli estremi a calor di Rosa: simili ai Cinesi, ma poco più piccoli, e di color scuro incarnato, sono i Garofanini salvatici, che troviam qui ne' luoghi alpestri intorno a Palermo, ed altrove: nell'Autunno adornansi di molti fiori a mazzetto, quasi come il Barbato della Fig. 12.

10. Cinese semidoppo rosso scarico.

11. Cinese doppio incarnatino con gli estremi bianchi.

12. Ortense Barbato, rosso con merletto bianco da' Botanici pure chiamato Armerio; Sicil. *Garofalu a mazzettu*.

13. Plumario doppio bianco con le foglie del fiore sottili, o minutamente tagliuzzate come la piuma.

14. Arbu-

14. Arbuscolo di Garofani rossi, non guari dissomiglianti al Barbato.

Abbiam qui comprese tutte le varie spezie di Garofani, e solo abbiain lasciato di enumerare i Silvestri; ma pure v'ha chi gli adopera ne' giardini, e stanno bene ne' viali, a metterli in profilo, e adornano doppiamente col bel verde delle foglie, folte, sottili, e lunghe, come Gramigna, e colla pompa de' fioretti, che pure hanno il suo bello.

Il Plumario, detto Piumetta, è buono a tenerli, per aver tutte le varietà; ma pure non parmi gran cosa bello: il Mandirola loda per lo migliore tra i semplici Plumarij quello a coda di Pavone, e fra i doppi l'incarnatino.

Il Barbato, detto anche *Oculus Christi*, & *Armerius* è propriamente di genere diverso, ma molto vicino, e congenere ai Garofani, e la coltura n'è la medesima: ma bisogna riseminarlo ogn'anno, perchè fiorisce nel secondo, seppure non si semini assai primaticcio, e ne muore la pianta dopo che ha dato il fiore. Ammette la diversità de' colori, che ammettono i Garofani ortensi, ma forse non tanto copiosa, come quelli; v'è lo scempio, e 'l doppio, e l'uno, e l'altro ammirar si fa per la copia de' fioruzzi, i quali presentansi gentilissimamente, come legati a bell'ordine in un mazzetto; ma molto più ammirasi il minuto rabesco, che vi formano i suoi varj colori, a punti, a linee, a merletti, con tal studiato, e sottile artificio distribuiti, che apertamente vi si vede la maestrevole mano del Sapientissimo Creatore.

Dell' Inglese, e del Cinese non è meno stupendo, e gentile il lavoro de' punti, delle linee, e de' merletti. Il Cinese dura più d'un anno, e però dopo la fioritura nell'Autunno, o principio dell'Inverno gli si troncano i rami sin vicino a terra, per farlo tutto da piè ripullulare,

e così darà gran copia di fiori in tutta l'Estate. Il seme di questi due, e del Barbato posson anche seminar-
si due volte all'anno, cioè nell'Autunno, e nella Primavera, o eziandio subito raccolto il seme purchè tengansi in luogo fresco, e lontano dal Sole.

Non son pochi que', che al Garofano dieno il primato sopra ogn' altro fiore, se si consideri tutto il complesso delle sue doti: è soavemente odoroso, senza nuocere al capo, che anzi lo conforta; come aromatico; è tutto bello, e ben disposto in ogni sua parte; è ricco di molte spezie; ha gran variazione di colori, e varj scherzi, e capricci, con tutto che i suoi colori, non sian comunemente più di due, il bianco, e 'l rosso, ma pur questi variano per tutt' i gradi fino al rosso violetto, e nericante. Dicesi, che vi sia il turchino, siccome anche il verde, ma v'è certamente il giallo. E' vario pure il Garofano per tutt' i gradi della grandezza fino ad uguagliar la gran mole delle Peonie; ed è pregiabile ancora per la sua durabilità sì nel fiore, come nella pianta, la qual mantiensì per più anni, e 'l fiore per più giorni, se vi si muti l'acqua ogni dì, e vi si vada recidendo l'estremità dello stelo per non corrompersi. Il solo male, che ha questa nobile pianta, è, che troppo gran cura esige, come ora dirò nella coltura, nella quale, per servir di norma alla coltura d'altri fiori, non lascerò cosa da dire, che giovar possa, e vi aggiungerò qualche cosa profittevole, nuovamente cavata dalle mie assidue osservazioni, e sperienze.

Cominciando dalla semenza, (l'uso della quale bramo introdotto, per l'acquisto copioso, che vi si fa di bell', e nuove razze, tal' ora non mai vedute;) vi rimando al Cap. 14. Par. 2., dove ho descritta minutamente tutta la maniera, da farla generar ottima; e qui solamente torno ad inculcar l'avvertenza data, di tener coperto lo scempio dalla prima ora, che non gli si levi
mai

mai il velo, se non sia già matura la semenza, perchè altrimenti ben poca, o niente ne raccorrete. Due sorti d'Insetti infestano questi fiori, e particolarmente la lor semenza, e n'è così universale la infestazione, che appena v'è Garofano, il qual non assalgano, con dargli totale il guasto: son prima le nominate formiche, le quali vanno al mele, che in abbondanza rende il Garofano, e succhiato il mele, rodono i pedicelli delle foglie, che di mele son unte, e poscia passano a roder la boccuola de' semi, e per ultimo i semi stessi divorano.

L'altra sorte più ancor nocevole son certe pessime Farfallette di quattro ale, simili a quelle, ma poco più grandi, le quali son madri delle Tignuole, che rodono le lane: così le une, come le altre, vanno in giro la notte, per fare più accertato lo smacco, e quindi è, che non di rado all'entrar, che fanno nelle nostre camere, abbarbagliate dal lume, vanno incontro alla fiamma, e pagan la pena del grave danno che vengon a farci, restandovi incenerite. Coteste nostre vanno in giro di notte per tutt' i giardini; e per tutte le case, e balconi, ove son Garofani: non esagero, giran per tutto, per la premura, che spigneli, (son compatibili), a trovar buon ricapito ai loro figli, mentre son pressate a partorire. Se la pianta non è ancor fiorita, vanno a partorir le uova nel tenero cuor de' pollocencelli, ed in ciascuno depongono il suo uovo. Quindi nasce un piccolo vermuccio, il qual pascefi delle foglie del germoglio, e va sempre a scender giù rodendo, finchè arrivi al fondo del cuore, d'onde nascer dovrebbe il fiore, e lo divora in guisa tale, che alcuna volta d'una intera pianta non si può avere un sol Garofano.

Se poi la trovan fiorita, ne stan più contente le pregne madri; perchè il ricovero de' figli è più sicuro nel concavo del fiore, ed è più dolce col lecco del mele il nutrimento. Appena mai v'è Garofano, in cui non lascia-

no un uovo almeno: e nato il vermicciuolo, prima poco visibile per la piccolezza, sostentasi fra le cime delle foglie con danno poco sensibile; ma crescendo di mole da un giorno all'altro, sen cala giù al fondo, e ascondesi, quand'esso saria più visibile, e più sensibile il danno, Questa sua ritirata che sia con malizia, quanta ne può capire in un verme, lo mostra esso con quel, che fa, prima d'andar giù: dacchè così ne' fiori, come ne' suddetti germogli, colla sua bava, simile a quella de' Ragni, lega fra se a fili raddoppiati le cime delle foglie, e così lusingasi il ladroncello di starsene al coperto dalle sorprese di chicchesia, e va poi giù a dare il guasto rovinoso ai fondamenti. Quivi per primo pasto rode i pedicelli delle più piccole foglioline interne, lasciandole nel suo sito; tanto che voi non potrete accorgervi dell' inimico, che lavora dentro alla mina, se non dopo giorni, quando qualche fogliolina può vedersi appassita, ed allora esso ne ha troncate delle altre, che pur tuttavia si mostran vegete; ma voi non prevenuto da questo certo segnale delle foglioline languide, e vizzate, non baderete, a saper l'origine di un danno fin allora poco sensibile; però sarà finalmente sensibilissimo, quando buona parte delle foglie avrà troncate; ma pur allora, se cercherete il verme nel fondo del fiore, non ve lo troverete, nè vedrete altro, che i segnali d' esservi stato. Dopo il troncamento di molte foglie, come s'ei sapesse, che può esser già scoperto, con più fina malizia, ascondesi, e per un piccolo buco, che apresi rodendo, rintanasi nella bocciuola del Ricettacolo; e quivi a man salva divora tutt' i semi, finchè la bocciuola ne sia vota; ed esso, allora bene ingrassato, e già maturo per far la solita Metamorfosi, di verme trasmutasi in volatil Farfalla, e quindi poi sen esce a volar per aria, per rifar quel medesimo, che fatto avea la sua madre perniziosa.

Tutto

Tutto questo ho io curiosamente osservato, per saper meglio trovar rimedio alla lor poco men che inevitabile infestazione. Così de' vermi nascosti ne' germogli, come per quelli annidati ne' Garofani, basti certo il contrasegno, che già vi stia dentro il ladro, dalla dalla sua bava, e dal vedervi legate con quella le foglie: andate spesso rivedendo le piante con occhio attento, ed ove vi accorgerete del dato indizio, distrigate le foglie, e cercando in fondo, ve lo troverete: se l'ucciderete a tempo, salverete la vita a' Garofani, ma se tarderete, ne' fiori avrete, ne' semenze. Il velo poi ben legato è il miglior rimedio, che previene il male: ma badate bene, che la Farfalla non vi prevenga, come più fiate mi è succeduto, d'aver sotto al velo trovato il verme; dacchè ella, più diligente di me, appena spuntate fuori del bocciuolo le prime foglie, vi avea deposto già l'uovo, ed io son rimasto burlato: e però si sta più sicuro, quando s'applichi 'l velo o prima, o immediatamente, che va il fiore a sbocciare.

Dato questo importante riparo avrete la pazienza d'aspettar lungamente, finchè sia compiuto il seme; e sarà compiuto, allor quando la bocciuola del tutto seccherà, e spaccheràssi da se dall'orifizio superiore; ed in tal tempo se vi trovate aver levato il velo, (del qual non v'è troppo bisogno, dopoche siano secche le foglie,) preverrete le Formiche, acciocchè non sieno più deligenti di voi, a raccor per se le semenze. Saran esse riuscite buone, se saran nere; perchè le bianche, come che pajan granite, non soglion tutte nascere, come ho provato.

Per averne fiori nella ventura està, e non aspettarli secondo il solito dopo un altr'anno, potrete seminar la semenza ne' primi giorni di Settembre, o ancor prima, se la stagione vi parrà un poco rinfrescata: anzi vuole il P. Ferrari, che si semini immediatamente,
dopo

dopo che si è raccolta : però tenete i vasi in luogo fresco , ove non li scopra il Sole , finchè sia tutta nata , ed alquanto cresciuta , ad allora espor la potrete ad un poco di Sole , che non sia troppo ardente . Col seminar però più tardivo , scorsa la metà di Ottobre , benchè non s'abbiano fiori in quell'anno , si sta più sicuro , di non perdervi tanta quantità di semenza , quanta spesso avvien , che sene perda , e si ha una maggior sicuranza , che i germi doppi non degenerino a scempi , e che le piante , fortificate , prima di dar il fiore , per due anni , riescano più vigorose , e di più lunga vita . Sopra di che rileggasi il già detto C. 16. n. 225 . Sia seminata larga , in terra sottile , ben crivellata , morbida , e più tosto magra , che pingue : non mettetela sopra di essa altro , che un velo leggiero di terra , tanto sol , che la cuopra , e levi di vista alle Formiche ; altrimenti non avrà forza il tenerissimo germe , di sollevar sopra di se il peso della terra , e se questa non sia soffice , la radicetta non potrà profundarsi , ed appena nato il germoglio vi perirà , come ho imparato , e lo avverto ad altri , a costo mio : quindi tenetela sempre umida , ma non bagnata ed osservate quanto a suo luogo in generale per tutte le semenze piccole si è prescritto .

Un solo avvertimento è qui da soggiugnere , tanto importante , quant'è la conservazione delle semenze , o la lor perdita totale . Dava ogn'anno le mie semenze a seminare ad altri , mentre nell'Autunno non potev'io badarci : nascevano prosperamente quasi tutti i grani , ma pure al crescere sene morivano , ed appena ne restava la terza parte , senza che quegli siasi accorto mai della cagion del male . Quindi per indagarla , voll'io seminare , ed allevare le semenze , ed ecco mi cominciarono a morire l'una dopo l'altra , ancorchè già grandicelle ; ed io tentando in più maniere , come preservarle , all'ultimo

timo pensai, di provare a tenerle asciutte, e sitibonde, al contrario di quel, che suolsi praticare colle piccole piante; che tengonsi più tosto umide, prima che profondino le radici; e mene suggeriva il pensiero l'indole ben nota de' Garofani, che son troppo corruttibili, e l' troppo umido li suol corrompere. Che sia stato accertato il rimedio, lo provò l'evento, e d'allora in poi cessò del tutto la mortalità; e così poscia ne seguenti anni, con adacquarele parcamente, e sol quando fosse molto arida la superficie, appena mai n'è morto alcuno.

Quando saran cresciuti circa quattro dita, li potrete trapiantare, cavandoli diligentemente con tutta la tenera radice. Non piantate più d'un piede in un vaso, seppure il vaso non sia molto capace; perchè quel, che ora è piccolino, farà nell'Estate niente men grande de' veterani.

Dalla propagazion de' Garofani per via del seme, la qual è la più doviziosa, vo a trattar delle altre maniere di propagarli, che son anche molto utili, anzi necessarie, per conservar, e moltiplicare quelle buone razze, che si son guadagnate dalle semenze. Sia prima la più comune maniera, ch'è, di strappar dal tronco pedagnuoli, e germogli, e piantarli in buona terra.

1. La terra non sia troppo grassa, che può corromperli, e 'l tempo proprio da piantarli è nel Febrajo, e principio di Marzo. per quel, che ho veduto coll'esperienza, ma pure posson piantarsi dal mese di Novembre per tutto l'Inverno 2. I Polloncelli più bassi, staccati dal tonco, sono i più facili ad appigliare; ma que' della cima, che son teneri, e non hanno alcuna parte legnosa, non v'è speranza, che s'appiglino; siccome con difficoltà metton le radiche le braccia grosse, e i polloni troppo duri, e legnosi: ma v'è il rimedio, di troncare a questi il legno, lasciandone un pochino solamen-

te vicino al tenero, dacchè senza un tantino di parte legnosa nessun germoglio suol metter radice. 3. Nello strappar de' polloncelli, facciasi di modo, che portin seco dal tronco qualche appendice di legno, ma non sia lo squarcio così smoderato, che ne patisca la madre. 4. Alcuni usano, prima di piantarli, di tenerli alquanto al Sole, per farli un poco inflacchire, e li metton poi nell'acqua fresca, per ravvivarli; non è sberienza, che ho provata, e parmi cosa cruda contro Natura, quella estenuazione col calore del Sole, che s'aggiugne ad un membro reciso sopra il patimento del taglio; seppure la continuata pruova del buon effetto non mostri, che 'l languido germoglio ripigli con maggior lena spirito, e vita. 5. La punta legnosa del rampollo da piantarsi, se sia grossa, devesi spaccare con un taglio, e se più grossa con due tagli a croce, meglio co' denti, che con ferro per lo timore, che 'l ferro non comunichi qualche sua mala qualità; e 'l taglio dee toccare, o ancor spartire il nodo, perchè dal nodo debbono germogliar le novelle radici: ed acciocchè resti aperta la spaccatura, vi si può cacciar dentro una scheggia di pietra, o d'altro, che non corrompasi. E qui è fondata la volgare usanza d'inferirvi dentro un grano d'orzo, attribuendo all'orzo, non so qual arcana virtù, di far appigliare i figliolini; ma la sua virtù non ci par, che sia altra, che 'l tener aperta la feritura; ciò, che giova per due motivi, sì perchè 'l umore insinuasi più abbondantemente per tutta la lunghezza della fessura; e si ancora perchè le nuove radici, come n'è paruto a me nell'osservarle, nascono immediatamente dalla parte legnosa del nodo; e però spaccata questa, hanno le radici un maggior campo, e tutto libero, onde spuntare. 6. Levansi dal figliolino tutte le foglie basse, più toste, guardandosi di non fare squarci nello strapparle, e lasciansi le sole tenere intorno al cuore, mozzandone an-

cor le cime; perciocchè il pedagnolo, tutt' ora senza radiche, assai farà, a sostener quel poco, che gli si lascia. 7. Si piantano a fondo, quanto più si potrà, ma non tanto, che le foglie tenere restin sotterra, perchè corromponsi facilmente, e ne ammorbano il tallo. 8. Hanno a tenersi all' ombra, e poco al Sole in tempi freddi, e debbon tenersi più tosto umidi, ma non sinoderatamente, e può cominciarfi a dar loro più liberamente il Sole, allor quando dien segno d' essersi abbarbicati, ciò che apparirà dal veder crescere il cuor di mezzo. 9. Dopo alcuni mesi, quando saremo certi, che han messe le barbe, gioverà molto, il trapiantarli, e metterli al largo in terra più sostanziosa. 10. Finalmente, se alcuno de' piantoncelli si vedrà disposto a produr qualche fiore nell' Età, se ne mortifichi l' orgoglio, troncandone il tallo, per impedirnelo; perchè l' intempestiva produzione lo indebolisce, e per un fiore si corre rischio, di perder tutta la pianta, o almeno quella maggior copia di fiori, che sarà per dare nel vegnente anno. E' avvertenza del P. Ferrari, che nel piantare i rampolli, pongansi rasente i lati del vaso: sarà forse utile a farlo, ma ne' ragioni apporta egli, ne' sperienza del vantaggio, che ricavasi, a non piantarli ancora nel mezzo.

Questa è tutta l' istruzione intorno alla propagazione per via di germogli. Ma non voglio lasciar di dire, ch' ella benchè la più praticata, sia pure la più stentata; massime rispetto alla detta propagazione per via del seme; sì perchè ad averne i fiori, bisogna aspettare il secondo, e qualche volta il terzo anno; e sì perchè la maggior parte, massime in certe specie non s' appigliano, e muojono: così conferma il Sig. Clarici, ove afferma, parlando del piantare i rampolli: „ Ciò però riuscirà bene in que' Garofoli, che sogliono fiorir quasi „ ogni mese, ed in alcun altro, ma non già in tutti „ quelli, che li nostri Giardinieri chiaman di Fiandra,

, li quali generalmente parlando, non ho veduto propriamente pagarsi, che col lor seme, e con le Margotte.

Tentai altra nuova maniera, s'ella riuscisse più sicura, per far mettere le radici ai Polloncelli: ella è fondata sulla speranza, e sul insegnamento del Sig. Lion, già riferito nel C. 16 n. 330; cioè provai, di far metter radici a' rami, e polloncelli de' Garofani, tenendoli nell' acqua infusi; due de' quali ne posi in acqua nel mese d' Aprile, ed altri poscia in Maggio, e nell' Està, per provar, se ancora nel caldo estivo, ed in tutti i tempi potesse ottenersi l' istesso intento. Dopo un mese, o là in circa, a piè d' uno de' due polloncelli comparvero le punte di due radicette, le quali ben presto crebbero, ed avendolo allora piantato in terra, riuscì un ottimo piede di Garofano. Il secondo polloncello mantenne verde per lungo tempo, ma non arrivò mai a produr radice, e così fu degli altri, a' quali sopravvenne il caldo dell' Està, ed io annojato della lunga dimora, vedendo, che già qualchuno se ne corrompeva, li lasciai perire. Avrei voluto rinovare altra volta l' esperienza nell' Inverno, come stagione più propizia, ma la noja, di dover mutare quasi ogni giorno l' acqua, e le molte altre faccende, me lo impedirono; però sembra certo, che nell' Inverno riesca ciò meglio, e forse ancora più proficuo del piantarli in terra.

La terza maniera di moltiplicare i Garofani è nuova, ed è quella dell' innesto, la qual io do per vera, comechè sia posta in dubbio nello Spett. della Natura Tom. 3, Dial. 3, dove citasi un Autore Inglese, ma pur si fa dire alla Contessa: Temo però fortemente, ch' ella non sia una bella idea, per non dirla una chimera, da non potermi riuscire.

L' ho tentata io con felice riuscimento. Scelsi, a far l' innesto, il tempo, che parvemi più opportuno, cioè il Mese di Marzo, quando le gemme de' Garofani van
sbuc-

succiando, e la pianta è più vigorosa, per tollerare il taglio, e l'umore è più sano, e copioso, per cicatrizzar la ferita. Sopra una pianta vigorosa di Garofani scempi feci differenti innesti, i quali ho espressi nella Tavola 2. fig. 17. acciocchè veduti nella lor giusta forma, meglio sene concepisca l'idea, per eseguirli: cioè nel braccio inferiore si rappresenta il taglio della scorza, e accanto vi sta un pezzetto di scorza in forma di scudo colla sua gemma, da inserirsi nel taglio: il braccio medio rappresenta l'innesto già fatto colla sua legatura; ed il braccio superiore rappresenta l'innesto a pendulo. Le troncai tutt' i rami, ed i tagli del cortice, che richiedon molta cautela, se non tutti, almeno alcuni riusciron felici, e vi aggiunsi l'applicazione dell'impiaastro per saldarli. Quasi tutti gl' innesti si mantenner vegeti per più giorni, ed altri per più settimane, fin tanto che uno a scudo cominciò a dar segno di vegetare, di giorno in giorno andò crescendo molto sensibilmente il suo germoglio, ed arrivò a crescer alto più di due dita, siccome alcuni ancora degli altri già cominciavano a sviluppar le gemme: tantochè potei giudicar con certezza, che una metà de' miei innesti erano ben riusciti. In tanto io non ancor praticodell' indole troppo delicata de' Garofani, andava sempre strappando dal tronco tutti que' germogli, che pullulavano, sulla falsa idea, che bisognava tor via i figli proprj, per costringer la madre a nutrir meglio i stranieri; ma una sì fatta crudeltà mi fè perder la madre con tutt' i figli, ed in pochi giorni se ne morì. Ella è durezza sempre fatale pe' Garofani (ciò che servirà, avvertir qui per istruzione) il levar tutto dal tronco, e non lasciargli qualche braccio, o polloncello, a cui mandar possa l'alimento: almeno nel caso dell'innesto, quando può giovar molto il total troncamento de' rami, lascinsi crescer per qualche tempo alcuni de' nuovi germogli, che spunteranno. Sicchè or per conchiudere, gl' innesti de' Garofani son veri, e riuscibili, bea-

benchè richieggano mano perita, e attenta: Chi ne acquistasse coll' ufo la perizia, e facilità, potrebbe avere in un anno tante centinaja di piante tutte nobili, e doppie, quante centinaja, o ancor migliaja di piedi, nascono dalle semenze, con solo farne gl'innesti sopra que' piedi, che riusciranno scempi, o di mal gusto.

La quarta maniera di moltiplicare i Garofani è quella delle Margotte: posson farsi in due modi, quali stanno espressi nelle due figure 15, e 16 della Tav. 2. Il tempo proprio di farle è nell'Ettà dopo terminata la fioritura: perchè allora la pianta, sgravata de' fiori, ed ajutata dal caldo, trovasi meglio disposta, a lavorar sotterra per la germinazion delle radici: sicchè dal mese di Luglio fino a tutto Settembre, mentre dura il caldo, può ben margottarsi: ma io ho provato, che può anche farsi in ogni altra stagione. Per le Margotte son buoni solamente i rami giovani di un sol anno; e di questi, se sien bassi, e possano facilmente piegarfi, sene fan Margotte sotterra, ed è il primo modo più usato, come nella fig. 15; o se i rami sien alti, e restj alla piegatura, sene fan Margotte sopra terra, giusta la fig. 16, la qual maniera è più universale per tutt'i rami alti, e bassi, potendo farsi di un sol cesto tante nuove piante, quanti sono i suoi rami, senza neppur perdere il pedal materno.

L'operazione è questa; si fa un taglio nella parte del ramo legnoso, ne' troppo lontano, ne' troppo vicino alla parte tenera, e verde, e si fa ivi, ove possa il ramo comodamente piegarfi, quando sia Margotta sotterra; ed allora farsi il taglio dalla parte di sotto, che guarda la terra: debb'essere un mezzo taglio, quanto il ramo possa prendere alimento sufficiente della madre, a cui resta attaccato. Alcuni fanno il taglio parallelo, all'Orizzonte; ma è più conveniente, che tagli si il ramo obliquamente, acciocchè il taglio, dal qual germogliano le radici, abbia una maggior estensione, onde possano quelle

quelle in maggior numero pullulare; e perchè spuntano più connaturalmente dal nodo, cominciasi il taglio nell' internodio, e va a terminare nel nodo, che pure spaccafi suo alla metà: ed acciocchè il taglio non chiudasi, per tenerlo aperto, vi s'inserisce una sceggiauola di pietra, o altro, che non abbia tosto a corrompersi, come mostra la fig. 15. Ciò fatto; ripuliscasi tutta quella parte, che dee restar coperta di terra, levandole le foglie, che vi si guasterébbono, e sgravasi la Margotta delle foglie, e de' germogli inutili, lasciandole solamente, que' poltroncelli che saran buoni a strapparli poi a suo tempo, per piantarli; e le si mozza la cima, acciocchè, detratti gli allievi superflui, possa meglio quella sostentarsi, ed applicar l'umore alla germinazion delle barbe. Quindi piegasi bellamente il ramo nella fossetta, scavata accanto al pedale, e con forcella di legno, o canna, conficcata nella terra, si fa star ferma; e poi cuopresi di terra in modo tale, che la base del pedagnolo ne resti scoperta, come vuole il Sig. Pluche, sebbene a me questa condizione non paja necessaria.

La medesima Margotta ora descritta, si fa pure in in alto sopra terra, o eziandio in aria per tutt' i rami ancor più alti: per far ciò, abbiate un tubo di latta, o meglio di terra per ogni grasta, che volete margottare, alto più o meno, secondo richiede l' altezza del luogo, ove s' hanno a fare i tagli, ma non men basso di tre, o quattro dita, e tanto in circa, o più largo sia il suo diametro, cioè quanto sia capace da potervi entrar dentro tutto il cesto della pianta. Può servire ottimamente di tubo la Zucca lunga già secca, cioè quella, che gli Ortolani conservano, per far semenza, (e di questa io mi son servito) tagliata in pezzi, come vedesi delineata nella fig. 17. Quindi fate il taglio in tutte le braccia, che sien capaci di margottarsi con tutto il resto, come sopra si è detto, e stringendo fra se i
rami

rami , inferiteli tutti dentro il tubo , il qual posato sopra la terra del vaso , riempicisi di terra grassa ; e così farà una piccola gratta sopra d'un'altra . Alcuni rompono e levan via il cuore della pianta , che resta nel mezzo affinchè le margotte abbiano esse tutto il nutrimento ; ma non è ciò necessario ; e lasciandolo intero , non solo riescono egualmente ottime le Margotte , ma levate poi quelle , resta bell'e buona , come intera , senza perdersi la pianta madre ; ciò , che ancora giova per l'ultima maniera , che son per dire , ch'è la più degna di tutte , per propagare i Garofani . Possono anche farsi delle Margotte altre in sulla cima dentro un imbuto di latta , come propone il Sig. Pluche , o dentro un tubo de' soprannominati col fondo bucato , e sostenuto in alto da una forcella di legno a triangolo , piantata in terra , come io più volte ho fatto .

Passati già due mesi , o qualche cosa di più , si scaverà la terra intorno alle Margotte , per veder , se abbiano già prodotte le nuove barboline ; e quelle , che le avranno , si troncheranno vicino alle medesime barboline , ed ogn'una nel suo vaso si planterà , facendole veder poco Sole per i primi tempi , finchè sarà meglio abbarbicata , troncandone la cima , e sgravandola , per quanto si potrà di foglie , e germogli , acciocchè i molti allievi non la infievoliscano . Il braccio monco , che ne resterà , disotterrato , e rimesso all'aria , ben presto manderà fuori dalle gemme nuovi germogli , e servirà , o per ristorar la perdita del troncato braccio con nuove braccia , o per farne un secondo , ed altre tanto multiplico , come di ò . Quelle Margotte poi , che non avranno ancora messe le barboline , torneranno a coprirsi di terra , si terranno esposte al Sole , e ben adacquate per un altro mese , e si troveran radicate . V'è ancora un'altra maniera , per far abbarbicare i rami de' Garofani , senza farvi taglio , con solamente piegarli , e coprirli di terra ,

terra, come fanfi le propaggini delle viti, ed il tempo da eseguirlo, è nel mese di Luglio, ma tardano assai più, e sol nella vegnente Primavera sogliono aver messe le radici.

La quinta, ed ultima maniera è la più facile, la più sicura, e però la più praticata da me, molto più che ammette insieme tutte le altre maniere, per far in un sol anno da un sol piede il multiplico or di dieci, or di venti, e più piedi di Garofani, che tutti dien fiori in quel medesimo anno. Ella è questa: nel mese di Novembre cavate da terra destramente, come si è insegnato, il cesto intero con tutte le radiche, e scossane la terra, sbranatelo di braccio in braccio, tirando violentemente con le mani, quando vi riuscisse di poterlo far così, senza rompere il braccio; o più tosto tagliate con un coltello di lama sottile il braccio con seco una striscia di tronco, la qual porti seco aderente qualche porzion della radice; così fate appresso col secondo, col terzo, e con tutti gli altri, per quanto ve lo permetterà la grossezza del tronco, e la quantità delle radiche. Di un cesto di buona grandezza tagliando con rigorosa economia, ne ho fatt'io undici parti, ogni una con la sua barba; però si sta più sicuro a tagliar più tosto grasse, che magre le porzioni, acciocchè nessuna sene perda. Piantatela in maniera che la piaga del taglio resti coperta sotterra; sgravatela di foglie, e di germogli; mozzatene la cima; guardatela dal caldo Sole per alcune settimane, e sol dategliene qualche ora, che le gioverà, finchè poi siate sicuro, che non possa nuocerle il calore, anzi l'ajuterà, per farla meglio radicare. Con ciò solamente avrete nell'Estate prossima piante grandi poco men, che la madre, e vi fioriranno; nè v'è pericolo, che alcuna vene fallisca, se non se quando la madre fosse infermiccia, o la division delle parti fosse stata troppo avara, e sottile. Che se il tronco di mezzo resti aggravato di rami, bisogna sgravarnelo, e per

Tom. II. G suo

fuò ajuto io mi studio, nel fare i tagli, di lasciar per lo tronco qualche banda, piccola almeno, sana, ed intera con la sua scorza: sebbene ancora senza restargli niente di scorza, ho provato, che mantienfi, e vive. Non è nuova questa maniera, ma o si fa da pochi, o è da pochi praticata; forse perchè non avendone sperienza, temono, che abbiano a perder la madre, in vece di moltiplicarla.

Ma forse arriverà nuovo il metodo, che io pratico e qui propongo, per far di una sola pianta di Garofani tutto quel moltiplico, che n'è possibile. Combino io così tutte insieme le sudette maniere. 1. Da' fiori cavo il più ricco moltiplico, che viene dalle semenze. 2. Dopochè poi sia sfiorita la pianta, nel mese di Luglio do mano alle Margotte, altre sotterra, altre in aria, quante vene posson capire per tutt' i rami, lasciando il solo tronco di mezzo con qualche ramo più alto. 3. Radicate già le Margotte, e separate dalla lor Madre ne' mesi di Settembre, Ottobre, e Novembre, dissotterro le monche braccia delle Margotte troncate, e l'espungo all' aria, come ho avvertito poc' anzi; quindi aspetto, che sien nati dalle lor gemme i novelli germogli, e nel mese di Dicembre, quando saran certamente nati, anzi cresciuti, come se già la pianta fosse intera, qual era, prima di farsi le Margotte, passo all' altra, più di tutte sicura, e proficua esecuzione dello sbranamento, e fò altre tanto di moltiplico del già fatto colle Margotte, e con ciò io vengo a cavar da un istesso fondo la terza copiosa raccolta. 4. Nel separar dalla madre, e piantar le Margotte, siccome nello sbranamento, hanno a levarsi i polloncelli, che l'aggraverrebbero, come si è prescritto, ed è già tempo allora da poterli piantare, per fargli metter le radici; e così viene ad averfi pure quest' altro moltiplico, ed haffi tal, quale pressò a poco, come sarebbesi avuto dalla stessa pianta, se fosse rimasta intat-

intatta. 5. Finalmente sul principio di Primavera può farsi l'ultimo moltiplico coll' uso degl' innesti, co' quali guastignar si potrebbe tutto quel , che conterebbesi , come perduto, cioè tutti que' piedi di Garofani , che vengono dalle semenze o scempi, o mal coloriti, come sopra si è detto.

Conchiudo con due soggiunte; ed in primo luogo dico, che la descritta moltiplicazione non è privatamente applicabile a' soli Garofani, ma può ella praticarsi del pari con più altre piante, così fiorenti, come fruttificanti. Soggiungo in oltre per mia giustificazione, che potea parer jattanza, quando da principio ho detto, che coll' uso de' semi, giusta la norma insegnata, ed ora coll' uso del presente metodo, in due, tre anni possa riempirsi un gran giardino de' più bei fiori del Mondo; ma pure ora potrà conoscersi, che non è stata inconsideratamente avanzata, e niente temeraria l' esibizione. Fate voi stesso il conto: di un cesto di Garofani sodo, e ramoruto sene fan talora dieci Margotte, ma sieno cinque, ed altre tanti piedi sene ottengono collo sbranamento, che son dieci; e dieci, e più polloncelli, cavati dalla stessa pianta, ed appigliati, possono ancor mettersi a conto, e son venti, a' quali se aggiungansi ottanta, o più piedi, che vengono sù dalla semenza, generata da questo medesimo cesto in ragion di padre, o di madre, ne verrà in un anno da un sol cesto la numerosa prosapia di cento, e più figli. I miei Garofani da principio non arrivavano a dieci piedi, e dopo un anno, per non aver luogo, ove tenerli, ne trasportai in villa da 400. piedi, oltre 200, che ne trattenni in Città: ma pur io non curai di far tutta la moltiplicazione in tutte le maniere ora descritte, per non aver luogo comodo, ove piantarli.

Passando dalla propagazione alla coltura, la terra pe' Garofani debb' esser fertile, sciolta, e mezzanamen-

te grassa, qual suol esser quella d' Ortaglia ; ma s' ella farà selvatica, nuova, e riposata, ed avrà insieme le dette qualità, farà l'ottima, che può darsi. Ma per ottima che sia, il Garofano la sfrutta-si, che bisognerà rinnovarla ogn'anno, e se non tutta almeno in parte. Per rinnovarla tutta rileggete l'istruzione data, ove si è trattato del trapiantare: e per rinnovarla in parte, scalzasi tutto intorno il pedale fino a certa profondità, e ricambiasi la terra levata con altra, che abbia del grasso; e se collo scavare qualche cosa patiscan le barbe superiori, non importa troppo, presto si rinoveranno coll' ajuto del sostanzioso nutrimento. Tener più di due anni un piede di Garofani nell' istesso vaso, o nel medesimo terreno, è l' istesso, che volerlo certamente morto; e al contrario giova lor tanto il trapiantarli, che alcuni hanno scritto, che il frequente trapiantamento li fa mutar di scempi a doppj; ciò che non è altro in verità, se non la grossezza, che acquistano i fiori col rinnovamento della terra. Non mai s' invecchiano i Garofani, per chi ogn' anno muta lor la terra, e li margotta, e li sbrana; e senza di questo sen muojon dopo due, o tre anni. E qui avverto, come cosa molto importante, che nel piantare, o trapiantare i Garofani, s' abbia cura di non metterli troppo bassi sotterra, ma il più alto, che si potrà, soltanto che non resti scoperta all' aria la radice; perchè così da una parte avrassi il comodo, da potervi aggiungere terra grassa di sopra, per ajutar la pianta prima della sua fioritura; e dall' altra, se il tenero del tronco tocca la terra, o ne resta sepolto, v' è pericolo, che si corrompa; ciò, che succede molto più facilmente co' polloncelli, che piantiamo, per appigliarsi, quando sia corto il pedino legnoso, e 'l cuor tenero tocchi la terra, o ne resti mezzo sepolto.

Il P. Ferrari, e con lui il Sig. Clarici dicono, che i Garofani facciano meglio in vasi, che nel terreno;
per-

perchè quivi, soggiugne il primo, i fiori, o pel troppo alimento crepano, o come per tedio del luogo marciscono. Ma io provo, che in terra vengono assai più vigorose le piante, e più numerosi, e grossi i fiori, che ne' vasi: che se in terra marciscono più prestamente, v'è il suo rimedio; si trapiantino dopo due anni, e non marciranno per tedio del luogo: e perchè li snerva, ed è ancor causa della lor immatura morte il molto numero de fiori, che portano; v'è il rimedio, di sgravarneli, con spiccar tutt' i bottoncini laterali, lasciando pochi fiori, ed i principali, i quali riusciràn poi di mole straordinaria.

La cura per conservar queste gentili piante, debb' essere studiosa, ed incessante: amano stare in sito aperto, e ventilato, e godono assai del Sole, ma pure i gran calori, che fan ribollire la terra, le son contrarj, e per guardarnele sarà ben fatto, di ritirare i vasi nell' Està più calda in luoghi, ove non sieno battuti dal Sole per tutto il giorno, ed in tai luoghi stan bene piantati in terra. Piglian aria, e respiro con levar loro d' attorno tutto il seccume, e le foglie, o germogli vizzi, e guasti. Se alcuna parte ne sia fracida, vengasi presto al taglio fino al vivo, acciocchè il male non tiri avanti. Deono adacquarsi competentemente nel tempo, che fioriscono, ma non mai soverchiamente, ed in tutto il resto dell'anno lasciateli spesso languir di sete, eziandio nell' Està più calda, specialmente dopo la fioritura fino all' Ottobre: quello è il tempo, quando ne muojon molti, e repentinamente, senza dar segno sensibile della lor malattia. Non ho io altro, a che attribuirne la cagione, se non se al ribollir, che allora fa col caldo, e coll' umido la terra troppo bagnata, e così la sentono i pratici giardinieri, così me lo conferma la ragione, e molto più la sperienza, che ne ho. I Garofani domestici son venuti da selvatici, che nascono ne' monti, su per la balze del-
le

le aride rupi; nè par, che si alimentino d' altro umido nel caldo estivo, che quasi sol di quello dell' aria, che attraggono la notte; sicchè vuol ragione, che noi imparando dalla Natura, ci accomodiamo alla lor febria indole secchereccia. Dall' altra parte ne ho certa sperienza replicata per due anni in Palermo, ove son grandi i calori estivi, e per due anni in Viterbo. Ho lasciati alcuni piedi di Garofani, altri piantati in terra aridissima, e cotti dal Sole, ed altri in un vaso con poca terra, che però avea qualche piccola comunicazione col terreno, onde forse succiar potea un poco d'umido; e gli ho lasciati per tutta l' Està, ed Autunno senz' adacquarli, che qualche rara volta, quando pareanmi non che appassiti, ma poco men che morti. All' istesso tempo, innaffiava a fazio altri miei Garofani, e questi corrompeansi, e morivano, e quelli, che parean morti, colle prime piogge o con versarvi un poco d' acqua, bell', e vegeti rinvenivano, senza mai perdersene alcuno. Per la stessa ragione di evitare il ribollimento della terra, è regola generale de' giardinieri, di non adacquare i Garofani, e così tutte le altre piante, mentre la terra è calda, ma o la sera tardi, o ben mattino.

Vengo a' rimedj delle lor malattie, e per la morte repentina, di cui s'è parlato, è da soggiugnere che sene ha il segno qualche giorno avanti: se vi accorgete di qualche braccio della pianta, vizzo, e languente, n'è desso l'indizio: e per dar riparo, scavate la terra al piede del tronco, e tosto troverete infracidato l'istesso tronco; tagliate il fracido fino al vivo, e medicata la piaga, lasciatelo così all'aria scoperto, acciocchè si asciughi l'umido, che lo corrompe, ed in tal maniera può sperarsi, che viva.

Di un altra malattia fa menzione il Sig. Clarici, della quale io non ho sperienza. Quando, dic'egli, al fine d'Ottobre venisser piogge sovrabbondanti, convèrà portare

tare i vasi de' Garofani al coperto; perchè notabilmente resterebbero danneggiati con certe macchie or nere, or rosseggianti, ed or grigie, che chiamansi Carbone, ch'è la peste delli Garofoli; e il modo di preservarneli, oltre il tenerli al coperto in luogo arioso, e guardati dall'acqua del cielo &c, è lo sparger lor sopra del tabacco in polvere, il quale in ogni tempo ha la virtù di preservarli da molti mali. Ma quando pur venisse loro la cancrena del Carbone converrà nettare, e raschiar le foglie al possibile con un coltellino, o con l'ugna, e recider quelle, che saranno più infette, per fermare il male, che non si comunichi al gambo, ed al Cuore. Per avventura faran certe piccole aposteme, che apronsi nelle foglie, e risolvonsi in polvere nera, similissima alla rubigine, in cui risolvonsi le spighe del grano, tocche da infetta nebbia; ma un tal morbo, almeno nel nostro clima, non par, che apporti al tronco verun notabile nocumento.

Il maggior male viene a' Garofani dagli animali, che l'infestano, e bisogna saper l'arte di guardarneli. Si è già data la istruzione, per impedire il grave guasto, che vi cagionano i vermi delle Farfalle; ed altrove si sono dati i rimedj per le Ruche, Sorci, Formiche &c, e particolarmente pe' Gorgogli, tanto nocivi a queste piante, che son abili a far morire tutt'i nuovi germogli, e con essi ancora il tronco. Qui solamente rimane a parlar d'una specie di piccolissimi Insetti, che vivon sopra i Garofani, come in proprio lor domicilio non senza gravissimo nocumento. Nessuno de' coltivatori suole accorgersi di loro, non solo per la picciolezza, la qual pure a nudo occhio può bene scoprirsi, da chi ne sia prevenuto, ma perchè ancora vivon nascosti nel cuor de teneri rampolli fra le intime foglioline, Quivi nutrisconsi del più tenero; coi lor morfi, e punture, (comechè piccolissime sien le ferite, ma pur fatte al cuore, ed in molto numero reiterare

terate,) lo fan languire prima, e tinto vedesi di pallido mortal colore, e poi ne muore. Di tutti que' nuovi germogli, e son molti, de' quali troviam vizzo, e poi morto il cuore, sono essi i micidiali, e ne uccidono assai più, che non ne uccidono i nocevevolissimi Gorgogli.

Non sapeva io la cagione di sì frequente, e mortal malattia; e però mi son fatto ad indagarla in un polloncello, di cui già cominciava il cuore a impallidirsi, ed apertolo bel bello di foglia in foglia, attentamente cercando coll' occhio, vi trovai dentro appiattati cotesti piccoli animali, altri neri, ed altri rossi di bel colore, ma tutti, come pajono ancor col microscopio, della medesima forma, e figura, sottili assai, ma lunghi intorno ad una linea, forniti di ale, che si tengon raccolte sotto la coperta della spoglia, dura, e resistente allo stropicciarli. Non aspettai più, a giudicarli rei di sì grave danno, dacchè vedeanfi all' istesso tempo le cicatrici delle morsicature: siccome poi l' induzione costante, di veder languire il cuor de' polloncelli, e sempre che languisca, trovarveli annidati, rese mi più che certa la lor reità; e però rivolsi i miei pensieri a cercarvi qualche opportuno rimedio, però sin' ora appena vene ho trovato alcuno.

E cosa tediosa andarli cercando, e ucciderli, ma pur io ló fo con alcuni piedi di Garofani, che ne hanno il merito: ed ho provato parimente giovevole lo spargervi tra le foglie del cuore il tabacco in polvere, e qualche cosa giova pure la cenere, o che noce loro come il tabacco, o che l'imbarazza a muoversi, e snidano di là; ma pure, per aver da vivere, sene vanno a tormentare altro germoglio; e questo è quanto appartiene a' lor malori.

Per ottenere i Garofani di grossezza straordinaria, bisogna, che concorrano insieme a farveli, l' arte, e la Natura; debbono essere di lor natura doppi, e fra doppi sieno de' più grandi; a' quali poi l' arte della coltura può

può conciliare una maggior grandezza : cioè sia giovane , e vigorosa la pianta , stia in buona terra , ed in vaso competentemente grande , si zappi frequentemente , tengasi sempre pulita , e sgravata di tutti gli allievi superflui , e le si lascino solamente due , o tre braccia principali , da' quali son da levarsi tutt' i fiori laterali , subitochè spuntano , e ne restino solamente i principali , uno per braccio , e riusciran molto grossi . Questa qui è la maniera ordinaria , lasciando da parte certe altre cure difficili , e noiose , le quali posson anche riuscir nocive alla pianta ; e come nocivo vien rigettato da Clarici l' uso di dare a' Garofani acque mescolate con letame , seppur ciò non facciasi con discreta moderazione ; ma permettet' egli l' acqua di lavature di carne , e cose simili , la qual , come volgarmente decantata , ho voluto io provare , e non ne ho veduto quel sensibile vantaggio , che se ne promette .

Concorre pur l' arte , e la Natura , per aver Garofani in tempi straordinarj ; cioè vi son quelli , che di lor natura dopo la comune fioritura tornano a fiorire per tutto l' anno ; e che sieno di tal razza , ne hanno il contrassegno ; dacchè soglion crescere lunghi , alti , e sottili i loro rami , come i tralci della vite . Il Clarici ne annovera sette varie sorti tutte belle , e più altre pensa , che ve ne sieno . Può anche l' arte ajutarli , per avere i Garofani d' ogni razza fuor del suo tempo : ne suggerisce una maniera lo Spett. della Natura Tom. 3. Dial. 3. „ Il mezzo più facile , dice , onde farli fiorire quasi tutto l' anno , è margottarne ora uno , ed ora un altro per tutto il decorso de tre mesi di Estate . A misura del tempo , in cui si faranno magottati , fioriranno qual prima , e qual poi , parte a primavera , parte di estate , e parte finalmente di autunno . Quelli però , i di cui polloncelli si farà avuta la diligenza di cimare , appena principati a spuntare , son capaci di darvi de' fiori , eziandio

Tom. II. H nel

nel cuore del verno . Con quest'ultima, par , che coincida la maniera dettata dal P. Ferrari, Per averne , dice, ancora di verno, si troncano i germogli di State , quando mettono le bocce ; che in tal guisa sfogano poscia fuor di stagione . A questo può aggiungerfi l'industria di tenere i vasi in luogo fresco , e ombroso quando i fiori voglionfi ritardare ; ed in luogo caldo , quando si vogliano accelerare ; ciò che può farsi tenendo i vasi esposti al Sole , ed insieme sepolti sino alla metà , sopra un mucchio di concime , il di cui fomento , quando sia ben regolato a grado di calore estivo , potrà sollecitare la pianta , sino a dar fiori nel più rigido del Verno .

Dopo aver detto de' Garofani forse troppo abbondantemente , lascio alcune bagattelle meno importanti , e facili a sapersi , ed in vece di quelle più util cosa sarà , ch' io foggiunga , fuor del mio costume , la mirabil virtù medicinale , che tengono i fiori de' Garofani ; poichè la lor decozione cura molto agevolmente le maligne febbri, come attestalo dopo innumerabili sperienze Simon Pauli *Quad. Botan. pag. 242* , riferito da Clarici . *Innumeros, Deo benedicente, sola decoctione florum Caryophyllorum vindicavi a febris malignis, & hoc omnibus medicinarum studiosis jurato veluti affirmo. Vel potenter sudores movent, vel urinas pellunt citra magnos naturæ motus, simulque corroborant, sitimque sedant.*

Caryophyllus Mexicanus V. Tagetes.

Chrysanthemum , seu Flos Solis Tab. 15.

Corona del Sole , Girasole . Franc. Soleil . Ingl. Corn Marigold . Germ. Goldblume .

Fig. 1. Indiano , o Peruano Massimo di fior doppiò giallo ; ve ne sòno altri Massimi , e ramosi , ed annui , e perenni , ma non molto differenti dal primo .

2. In-

2. Indiano minimo giallo, bulboso, o più tosto tuberoso, i di cui bulbi, simili agli occhi, o cannocchi della canna, son molto buoni a mangiarsi, cotti con olio, detti in Sicilia Patache, ed in Viterbo Tartufi bianchi, per l'apparenza, che hanno, di Tartufi.

3. Con foglie di Matricaria, giallo doppio.

4. Altro simile bianco doppio con il centro giallo.

5. Simile scempio, bianco nella circonferenza, e poi gialletto col disco di mezzo giallo.

6. Otense simile, pallido doppio.

7. Di foglia larga, e fior scempio sulfureo.

8. Con foglie di Tanaceto minore, e fior giallo scempio.

Così altri consimili, e d' inferior condizione: il proprio lor colore è giallo, e però dal color d' oro hanno il nome di Crisantemi; ma in qualche spezie ha luogo il bianco, o il cinericio; per lo più sono piante annue, e propagansi col solo seme, da seminarli nella Primavera; ma i perenni, che durano più d' un anno, propagansi ancora colla division delle radici, o de bulbi, que, che son bulbosi, la qual divisione fassi ancora nella Primavera. I venuti dal seme traspiantansi, per collocarli con ordine, a far spalliera, e larghi circa tre piedi uno dall' altro, perchè son piante, che han bisogno di molto nutrimento, attesa la lor grandezza. Qualunque terra, ed ogni esposizione è lor grata, purchè abbondino d'acqua. Fioriscono l' Estd, e compiono il seme nell' Autunno, dal qual vengono i doppi, e semidoppi, se al semenzire, sieno tutti strappati di terra i scempi, come ne ho fatta pruova, riferita P. 2, c. 16. n. 228.

Clematis Passionalis, vel Granadilla Tab. 16.

Granadiglia, Fior della Passione. Franc. Fleur de la Passion. Germ. Sian-Grün.

H 2

Fig.

Fig. 1. Trifogliata nella pianta, di fior pallido ne suoi filamenti, e color bianco verdeggiante nelle foglie del calice,

2. Pentafilla con foglie strette nella pianta, colorata di cerchi bianchi, e turchini interpolatamente, e con le foglie del calice bianchiccie di sopra, e di sotto verdi: ven'è altra confimile di fior più piccolo.

3. Passiflora di foglie dentellate nella pianta, e di color paonazzo il fiore ne' filamenti, con foglie verdi, ed acuninate nel calice.

4. Passiflora di colore incarnato assai gentile, ed altra più piccola detta Vessicaria, di foglia Ederacea, e fior bianco, e calice guarnito di filamenti verdi.

Ve ne sono d'altra forma, più piccole, e di minor comparsa, cioè una di fior campanulato bianco, detta da Franzesi *Herbe aux Geneux*; altra Pannonica di fior purpureo, con orlo bianco intorno alle sue foglie, e larghe foglie nella pianta, siccome altra purpurea doppia, ma non par troppo bella. Il Clarici ne raccoglie più altre, e le descrive per riguardevoli. Fioriscono per tutta l'Estate fino all'Autunno: i fiori sono di grato odore, e belli ancora di vista, ma il più, che si ammira in essi, è la composizione delle parti, nelle quali veggonsi espressi molto propriamente gl'istromenti principali della Passion del Redentore, onde poi han meritato il nome: per la forma del suo frutto a miniera di Granato, Granadiglia fu nominato dagli Spagnuoli nell'America, onde a noi è venuto. Serve ne' giardini a formar spalliere, e padiglioni, perche assai dilatasi, e va in alto, ed ha sempre bisogno d'appoggio, a cui potersi avviticchiare. Ama terra grassa, e forte, e gode del sito umido insieme, e folivo. Propagasi col seme, ma più ordinariamente colla separazion delle radici, che moltiplica in abbondanza.

*Cnicus Sativus V. Carthamus**Colchicum Tab. 16.*

Colchico, Zafferano Salvatico, Bulbo. Franz. Colchique, ou Mort au Chien. Ingl. Des Violattes, Montbelg, Meadoves Saffran, Wild Saffron. Germ. Zeitlofen.

Fig. 5. Doppio purpurascente, simile al quale vi è il bianco, ed il listato di bianco, e purpureo.

6. Giallo semplice maggiore.

7. Colchico comune purpureo: v'è il simile con foglie alternativamente una bianca, e l'altra rosseggiante: altro simile Cinese con foglie distinte a scacchi bianchi, e purpurei, come la Fritillaria: altro è tutto bianco, detto Ermpdattilo, ed altro iberno simile, purpureo.

Il Clarici ne conta dieci doppi di belli, e varj colori, e più altri semplici strani, e variegati, e di que' dipinti a scacchi ne adduce tre differenti, ed uno d'essi doppio. Alcuni de' Colchici fioriscono nella Primavera, ed alcuni nell'Autunno: a questi aggrega egli i Colchico-Narcissi, i quali hanno il bulbo di Narcisso, ma di Colchico son le qualità del fiore, che producono nell'Autunno: uno è nominato Narcisso Persiano a color di mele, di poco buon odore; altro vien detto Narcisso Autunnale maggiore di color totalmente giallo; altro Autunnale minore di grato odore: il quarto è chiamato Narcisso di Trabisonida dal fior giallo, ed il quinto simile bianco. Vuol'esser questo gener di piante in sito apri- co, ed in buona terra, e macera: e benchè sia molta la varietà de' Colchici, pur potrebbe averfi maggiore, se fosse in uso di propagarli col seme, ma l'uso è di propagarli col moltiplico, che fan de' Bulbi. Que', che fioriscono nella Primavera, piantansi nel Settembre, e lasciansi per tre anni nel medesimo posto; ed allora o mutasi loro il sito, o la terra, e se ne cava il moltiplico della

della nuova prole, per subito ripiantarlo: gli Autunnali cavanfi, e ripiantanfi nel mese di Luglio.

Consolida Regia Tab. 17.

Consolida Reale, Fior Regio, Sperone di Cavalieri, Speronella. Sicil. Palumedda. Franz. Pied d'Aloilette. Germ. Ritter = Sporn.

Fig. 1. Turchina doppia.

2. Doppia mostruosa per la grossezza del gambo di color porpureo.

Vene son semplici, e doppie di molti, e grati colori, i quali aggiranfi tra il rosso, bianco, e turchino quasi di ogni diverso grado. vi manca il giallo per quel, che so io; non vi manca talora il verde, ne' son rare le screzziate, o puntate di due, o tre differenti tinte: Tra i fiori estivi sono assai gentili, e di grande ornamento a' giardini, allevansi meglio in terreno, che in vasi: nascono spontaneamente da' semi caduti, e possono seminarfi nell' Autunno, oppure sul principio della Primavera, e per averli doppi, si levino gli scempi tutti, secondo la data universale istruzione. Ricercan terreno d'erbaggi, sito aprico, e convenevole irrigamento.

Convolvulus Tab. 17.

Convolvolo, Vilucchio. Franz. Liveret, Lirefon, Campanette. Spagn. Vedra Campana, Ingl. Binveed. Germ. Windo, Oder Wegevvinde.

Fig. 3. Cilestro, distinto con fasce rosse, del qual vene ha di molti più piccoli, e più grandi, altri turchini, altri rossi, altri bianchi, ed altri mischj di tutt' i tre colori, ed elegantissimi.

4. Peregrino di fior vermiglio. e foglia divisa, ed impuntita, e la foglia della pianta ederacea.

5. Pca-

5. Pennato Americano, detto Quamoclitto, e volgarmente Gelfomino vermiglio, di fioretti più piccoli del precedente, ma dell' istessa forma, e colore, colle foglie della pianta simiglievoli alla penna.

Clarici ne adduce quindici, di que', che forniti son di viticci, ed inarpicano, e vanno in alto; e sei altri, che non han la facoltà di aggrapparfi, ma o son suffrutici, o per sostenerfi, han bisogno di star legati a qualche appoggio; e sono il Convolvolo Argenteo, umbellato, eretto; il non eretto, ma giacente; quell' altro detto Campanella esotica dell' Aldini, di color ceruleo, variegato per entro a strisce bianche, ed al di fuori bianco, e nel fondo gialletto; il Ceruleo, e bianco; il Ceruleo schietto; il Bianco. Fra que' della prima sorte son da notarsi, come più degni, il sempre Verdeggiante delle Isole Canarie, col fior bianco, che purpureggia; il quale ha il vantaggio sopra gli altri Convolvoli, di tener sempre verdi le spalliere, i gabinetti di verdura, le volte de' viali, ed i festoni, pe' quali sono in grand'uso i Convolvoli; l'Americano doppio, bianco di neve; il Giallo doppio, ed il Bellissimo di color d'Argento con le foglie leggermente incise. Que' della seconda sorte servono ancora per festoni, tiratitra i gran vasi di Agrumi, o tra una pianta, e l'altra, appoggiati a funicelle, o a cerchi di legno, e posson seminarfene in un istesso vaso di più colori per farvi più bella comparsa, e possono anche lasciarsi cader pendenti dall' alto de' vasi con qualche buon garbo, che vi aggiunga la mano del Giardiniere.

Fioriscono l'Estate per tutto quasi l'Autunno; il fiore apresi la notte, e per la sua delicatezza non reggendo al forte calor del Sole, non arriva a vivere un intero giorno, se pure non sia fresco, e nuvoloso, però i morti fiori con altri nuovi ricambiansi ogni dì continuamente: resistono alquanto più al Sole i Convolvoli della seconda sorte, e però son chiamati Diurni da' Giardinieri

nieri. Si seminano nella Primavera in quel luogo medesimo, ove avranno da stare; perchè patiscono a trapiantarli; e quando sia vopo farlo, è da usarsi diligenza, per non maltrattarli. Non han bisogno di gran coltura, ma per crescere a smisurata altezza, basta lor che sieno in terra buona, e profonda, e che sieno a larga mano adacquati.

Del Quamocrito è da notare, che bisogna, come gli altri Convolvoli, seminarlo ogni anno nel mese di Maggio, o Giugno; ma perchè il seme è assai difficile a germinare, come altrrove abbiain detto, si tiene in molle nell'acqua, e 'l vaso dell'acqua esposto al Sole, infino a tanto che i semi divengan gonfi ed allora; piantansi in terra grassa, due dita sotto, ed uno, o due per vaso, e 'l vaso innaffiasi quotidianamente a sazietà sull' ora del mezzo dì, e stia di continuo esposto al Sole: in questa maniera verran fuora presto nel termine di otto giorni, come ne rapporta sperienza sorda il P. Ferrari: che se ajutati non sieno da umor copioso, che li maceri, e da molto Sole, che li fomenti, sene resteran sotterra uno, due, e tre anni senza poter germogliare.

Cotyledon, vel Umbilicus Veneris Tab. 18.

Cottledone, Umbilico di Venere. Franz. Escuelles, Nombriil de Venus. Spagn. Capadella, Scudetes. Ingl. Penyor, Navelvort, Germ. Nabelkraut.

Fig. 1. Africano di foglia rotonda, concava, larga, ed orlata di girello rosso, ed i fiori di color rosso giallino, quasi Giglietti capovolti all'ingiu'. Di fiori totalmente uguali è l'altro Africano con le foglie della pianta depresse in basso, carnute, più strette delle precedenti, e lunghe, le quali nascon dal tronco in croce, l'una opposta all'altra,

2. Affricano frutescente con fiori di color coccineo a maz-

mazzetti: altro Africano, che cresce a maniera di frutice con foglie larghe, piane, di figura ovale, bianche più tosto, che verdi di colore, cinte d'orlo purpureo: non so qual fiore abbia, ma lo credo più tosto simile al primo, che a questo; perchè la pianta è più simile a quella, che a questa: fene lasciano altre sorti di minor pregio.

Propagansi col seme, il quale caduto ne' vasi, da se spontaneamente germoglia, e di più con rompere, e separare i tuberi, ovvero con piantarne i rami, ed i rampolli nel mese d'Aprile, e Maggio. Nascono volentieri in suolo arenoso, ingrassato con concime macero di due anni, ed in sito aperto, e ventilato, e lor basta una moderata umettazione.

Crocas. Tab. 18.

Croco, Zafferano, Zaffarano. Franz. Saffran. Spagn. Azafran, Azafraon. Ingl. Saffron, Crocus. Germ. Saffran.

Fig. 3. Dimestico Ibernale di fior giallo, e larga foglia.

4. Dimestico maggiore Autunnale di color purpureo, o sia paonazzo, striato di cinericio. V'è anche il minore di fior poco più piccolo, giallo, notato esternamente di strie purpuree; v'è il bianco, e il bianco striato di ceruleo, e il misto con qualche tintura di ceruleo; lo striato di purpureo; il tutto purpureo; e l'giallo esternamente striato di purpureo.

Il Croco altro è sativo, di color ceruleo con le foglie della pianta lunghe strette, come Gramigna, ed altro silvestre: del sativo, che fiorisce l'Autunno, si raccolgon gli stami per uso solito del Zafferano, lasciando anche intero il fiore, e deon raccorsi, quando il lor colore, ch'è di fuoco, sia già perfetto, e di mattina,

quando non sia caduta rugiada, o la sera al tramontar del Sole, non già mai quando sia caduta pioggia: feccati gli stami per tre giorni all'ombra sopra carta, o tela netta, gli si recidon gli apici bianchi, forse, perchè saran dannosi. Il Silvestre serve per delizia de' giardini, ed altro fiorisce nella Primavera, altro nell'Autunno; vene son doppi, è vene son scempi, bianchi, rossi, gialli, turchini, e misti d'ogni varietà di colori, giusta il Catalogo, che ne tesse il Sig. Clarici. Per averne delle nuove razze, bisogna prevalersi delle semenze, da seminarli nel principio dell'Autunno; ma l'impazienza di non aspettar lungamente il fiore, ha fatto comune l'uso di moltiplicarli colla numerosa prole de' tuberì, che producono, i quali cavanli da terra ad ogni tre anni, e fattili asciugare per cinque, sei giorni, subito ripiantansi, con rinnovar loro la terra, la qual esigon grassissima, e sostanziosa, e netta d'erbe, e di pietre, le quali riescon loro assai nocive, ma giova lor molto il sito aperto, e solatio.

Crocus fatuus, vel Saracenicus V. Carthamus
Cyanus, vulgò Battifecula, vel Bla-
veola. Tab. 18.

Ciano, Blaveolo, Muschietto, Fior Campefe, Fior di frumento. Sicil. Ambretta. Franz. Blevet, Bluet, Aubi-foin. Blaveole. Ingl. Blevv botte, or cornflorvet. Germ. Korn-Blumen.

Fig. 5. Ciano delle biade, Ceruleo, e simili vene sono purpurei, con orlo bianco, incarnati, e misti d'incarnato, e bianco, e bianchi vagamente orlati di purpureo, o di turchino.

7. Giallo Turchesco odoroso.

8. Ciano maggiore di foglia larga nella pianta, di fior turchino, v'è pure il bianco, entrambi assai grandi. e belli.

Le

Le spezie annoverate dal Clarici, divise in Orientali, ed Ortenfi, sono il Maggiore odorato, ceruleo; Magg. odorato incarnato: Magg. odorato giallo: dipoi il fistuloso giallo, il grande Citrino con foglia angusta, e canuta nella pianta, il grandissimo Citrino con foglia leggermente lanuginosa, il Fistuloso bianco, il Fistuloso purpureo, il Ceruleo con gran fiore, e foglie verdi, dentellate, ed il Siriaco giallo. Gli Ortenfi di non minor bellezza sono il Ceruleo, il Purpureo, il Bianco, e nel cuore purpureo, il Semplice atro purpureo, ed il Perenne con fiori incarnati, odorati, e le foglie pallidamente verdi. A questi aggrega egli le Giacée, le quali son del genere de' Ciani, e son similissimi a' Ciani, men belli, e men grandi: coltivasi ne' giardini la Giacèa di Ragusi, bella più per le foglie della pianta, che per lo fiore; poichè son di molle lanugine a color d'Argento ricoperte, e sulla stessa pianta son di quattro varie fogge, altre intiere, altre diversamente frastagliate: la Giacèa di Candia laciniata con lanugine Argentea, e fiori a color d'oro: la Montana lanuginosa di fiori gialli, e la Montana di poca lanugine, e fior purpureo. La Giacèa così nominata da Gio: Bacchino famoso Botanico, molto dissimile a queste, e simile alla Viola Mammola, detta per ciò Viola di tre colori; sarà da noi riportata alla parola *Jacca*.

Tutt' i Ciani propagansi colla semente, la qual può seminarfi nell'Autunno, ma meglio nel principio di Primavera, per non aver da contrastare col freddo del verno, che ne' climi rigidi esige di doverfi trasportare i vasi al coperto: nel raccorla matura si stia con attenzione, che le Formiche non ci prevengano, con furarla. Se sia possibile, non si traspianti, perchè ho provato, che la non traspiantata riesce sensibilmente più vigorosa, o almeno procurarsi di trasportarla con tutta la terra, in cui stia radicata: qualunque

terra d'ortaglia, ed ogni fito è favorevole: alcuna delle loro spezie fiorisce per tutta l' Eftà, come le altre, e continua per fino all'Autunno. Tal è pur la coltura della Giaccèa, la qual anche può propagarfi nel Marzo, e nell' autunno con staccarne, e piantarne i germogli, che nascono a lato della pianta.

Cyclamen, Panis Porcinus Tab. 19.

Ciclamine, Pane Porcino. Cucubalo. Franz, Pain de Porceau, Saint. Clavelle. Spagn. Pan de Puerco. Inglef. Sovvbread. Germ. Schvvein = Brod.

Fig. 1. Incarnato; e poichè altro non ne truovo delineato, il qual abbia notabile diversità, eccetto che nel colore, basterà questo solo, per riconoscerne, il genere: però le sue varie spezie son molte, numerandone trentaquattro il Clarici, le quali pigliano la lor differenza dal colore diverso, dal diverso tempo, quando fioriscono, dalla forma, e da altri accidenti notabilmente diversi: cioè vi sono i bianchi, i rossi, i purpurei, i cerulei, i gialli, ed i misti di due colori eziandio bianco, e verde: vi sono i doppi, ed i scempi, gli odorosi, e odoratissimi, ed i privi di odore: fioriscono poi altri nell' Inverno, altri e nell' Inverno, e nella Primavera, altri nell' Eftà, altri nell' Autunno, e qualche spezie in tutto l' anno: altri di fior più grande, ed altri forse di fior più piccolo del qui espresso. Questi fioretti hanno del gentile, e del capriccio nella situazion, e forma delle sue parti, e si rendono ancora stimabili per la tanta lor diversità, specialmente i doppi, i grandi, e gli odorosi.

Sarà meglio tenerli in terreno, che in vasi, e quasi sempre all' ombra gli Autunnali, ed in terra grassa, ed umida, innaffiandoli frequentemente; ma quei di Primavera amano il Sole. Propaganfi con tagliare, dopo ca-
dute

dute le foglie, il tubero in parti, ogn'una delle quali abbia il suo occhio, o con troncar le protuberanze del tubero, che sono i suoi occhi: se ne medica il taglio con cera, e trementina, dopo che n'è farà asciugato l'umor, che n'escce; ed allora si ripiantano, con mettere intorno al tubero un poco di terra magra, acciocchè la grassa non alteri la piaga, e la corrompa; nè si adacquano, se prima non germoglino, bastando loro quel poco d'umido, che nella terra suol conservarsi. Propagansi di più colla semenza, seminata nell' Autunno per gli Autunnali, e per gli altri nella Primavera; adacquasi frequentemente, e tienesi al Sole, per aiutarla a produrre il tubero, e ad ingrossarlo, il qual però non si manifesta mai con alcun germoglio sulla superficie della terra, se non sia pervenuto a certa grossezza; nè si leva mai di terra, se non passati tre anni, dopo i quali, piantato in nuova terra, darà il fiore, e nell' anno quinto produrrà la semenza.

Datura V. Stramonia.

Dittamus, seu Fraxinella Tab. 19.

Dittamo bianco, Frassinella, Frascinella. Franz. Dittanne: Spagn. Ditamo, Ditano Real. Ingl. Dittami, Germ. Diptam.

Fig. 2. Di fior purpureo, ed ha il simile bianco.

3. Cretico vero con fiorelli incarnati, e tinta incarnata nel tronco, e nell' estremità delle foglie.

La Frassinella è propriamente la Figura 2 detta pure da alcuni Dittamo bianco, e la figura 3 è il vero Dittamo, e non Frassinella, della quale Clarici ne dà quattro spezie, la bianca porporina variegata, la maggiore doppia purpurea, la minore purpurea Belgica, e la bianca. Riferisce di più, ch' ella spira da se effluvio così potente, che toccando altro fiore, perde quello il proprio

prio buon odore, come che fragrantissimo, e gli resta impresso l'acuto, ed ingrato odor della Frassinella, nè così agevolmente ripiglia quello, il buon odor primiero, se staccato sia dalla sua pianta. Fiorisce nell'Estate, e matura il seme in Ottobre, ed allor si semina, e poi traspiantasi nella Primavera in qualunque terra d'Ortaglia, ed in qualunque sito: cresce alta la pianta, e moltiplicasi ancora colle radici, staccate, e piantate nella Primavera.

Digitalis Tab. 20.

Digitale, Guantelli, Aralda. Franz. Doigitier. Digitale, Gentelée, Gantilier, Gants nôtre Dame. Ingl. Foxgloves. Germ. Finger hut.

Fig. 1. Maggiore, carico di molti fiori rossi: simili vene sono due bianchi, uno de'quali è macchiato di giallognolo, e l'altro è di foglia aspra nella pianta: vi è altresì il gialliccio, e l'purpureo; ma ben carichi di fiori.

2. Incarnatino di piccoli fioretti con tintura di bianco.

3. Di foglie anguste nella pianta, orlate di giallo, e fiori ferruginei, e nella interna cavità incarnati, di mezzana grandezza.

Clarici ne numera più altre specie, diverse per qualche accidente vario nel fiore, o nelle foglie della pianta, le quali nelle specie della fig. 1. son simili a quelle dell'Ortiea, ed in altre specie son molto differenti; siccome alcune fioriscono a grappolo, cinto per ogni banda di fiori, ed altre portano i fiori da un sol lato pendenti. Tre forti, dette Orientali, son tre specie di Sesami, connumerate da' Botanici fra le specie delle Digitali. La foglia capricciosa del fiore, e la varietà delle specie, e de' colori rende molto stimabili queste piante,

le

le quali crescono alte ora due piedi, ed ora due cubiti: fioriscono il Giugno, e'l Luglio, e n' è maturo il seme in Ottobre, per via del qual solamente propagansi, seminato nell' Autunno, e può anche seminarfi nella Primavera: duran soli due anni, o tre al più, e donano il fiore nel secondo anno, massime se non fu seminato il seme subito che fu raccolto; e però sarà bene seminarne ogn' anno, o lasciarli nascere spontaneamente dal seme caduto in terra: tollerano facilmente i rigori del freddo, ed amano il sito umido, ed opaco, eccettuari gli Orientali, che lo richiedon aprico, ed il terreno arenoso, ma ben letamato.

Eriophorum V. Ornithogalum
Ficoides Tab. 20.

Ficoide. Franz. Ficoide Africane. Germ. Ficoides Africanische.

Fig. 4. Africana di fior purpureo, e tintura di giallo, simile al Crisantemo, la di cui pianta di foglie sottili, e gambo rosseggiante, striscia per terra: un'altra poco dissimile vene ha giallognola.

5. Di fior simile, con foglia triangolare, lunga e crassa: vi è ancor la terza di simil foglia, che sarà esposta al numero 7, e vi è la quarta più nobile delle tre nominate di foglie triangolari, ma più lunghe, ottuse in punta, e lucenti, e fa più grande il fiore del color medesimo, il quale splende come oro al Sole.

6. Di fior grande bellissimo in forma di fiamma, rosso coccineo con cerchio giallo nel mezzo, e dalla parte posteriore a color d'oro, e splendido a lume di Sole.

7. Di foglie triangolari, come sopra, vagamente orlate di fino cremisi, siccome il tronco ne ha pure qualche tintura, di cui però non viene espresso il fiore, ma lo

lo crediamo simile alle dette spezie del num. 5.

8. Peregrina massima, giacente in terra, di fior piccolo giallo sbiancato, e di foglie ampie, dilavate di rosso sul verde, e tutta la pianta mirabilmente tempestata di goccioline cristalline, come tanti Berilli, figurate a punta di diamante, detta perciò erba Cristallina.

Non trovo le Ficoidi annoverate fra i fiori nobili appò gli altri Fioristi, ma pur meritano degno luogo, non solamente per lo fiore, ma egualmente ancora per la vaghezza della pianta. Il fiore della figura 6 ci vien descritto presso Weinmanno, com'elegantissimo, e se ha pari nella bellezza de' colori, che qui son finissimi, e nella disposizion delle parti, ch'è gratissima, par, che debba vincere tutti coll'aggiunta del suo splendore, come d'oro purissimo: così pure riluce il fior grande della quarta spezie delle triangolari, e riluce ancora tutta la pianta, come se fosse di vernice coperta. La maniera di poi stravagante, come son figurate coteste piante, e le perle, ed i diamanti, o il lustro, che ne adornano quasi tutte le varie spezie, le rendono per se stesse non sol degne, ma pur ammirabili. Niuno mai vede la Peregrina, che non l'ammira, come una gioja vegetabile, per tutto ricca di Berilli, che si scambiano co' veri, e naturali: ella è per certo uno de più bei scherzi della Natura, co' quali mostra ella a noi seriamente la bellezza, e saviezza del Potentissimo Creatore.

Tutte le Ficoidi ci son venute dal Capo di buona Speranza, le di cui spiagge ne son feraci; e però aman suolo arenoso, leggiero, e secco: propagansi facilmente col seme, o anche co' ramicelli staccati, e piantati in terra fertile. Alcune spezie sono ancor buone per lo frutto, che si mangia, ed è dolce, come i fichi d' India: reggono al freddo moderato, ma ne' climi Boreali, bisogna ritirarle al coperto nell' Inverno.

Flos Cardinalis V. Rapuntium.

Flos Solis V. Chrysanthemum.

Flos Indicus Tab. 53.

Fig. 4. Fiore Indiano, da altri detto Iride, o Gladiolo Indiano per la somiglianza, che ha con quelle piante: vien descritto dal P. Ferrari, portato allora da Parigi in Roma, di color violaceo scuro, peloso come il velluto con ricci, o crespe d'intorno, tinte quasi di fuligine, e nel mezzo risalta uno stilo, diviso a macchie bianche, e paonazze, che porta sù una chioma di fila sottilissime, giallette in cima, che gli concilia gentilezza. Fiorisce nella Primavera, spira odor poco grato, come di mele cotto, e vive per un sol giorno. Piantasi il suo tubero nell'Autunno in qualunque terra da erbaggi, e propagasi co' tubercoli, che produce dall'estremità di un filetto, o barbicella, tal volta lunga a qualche distanza dal tubero.

Flos Trinitatis V. Jacca.

Fraxinella V. Dictamnus.

Fritillaria, vel Meleagris. Tab. 21.

Fritillaria. Giglio variegato, Meleagride, Giglio di
Susa, o di Persia. Franz. Fritillarie. Germ. Kivits =
Blum.

Fig. 1. Rossa scaccheggiata di bianco detta Isabella.

2. Isabella doppia scaccheggiata di purpureo, e giallo.

3. Isabella semplice scaccheggiata d'incarnato, e giallo.

4. Primaticcia di più fiori sullo stesso gambo, scacchegiata di purpureo, ed incarnatino.

Ecco qui nelle Fritillarie un altro mirabile scherzo
Tom. II. K della

Tom. II.

K

della

della mano maestra del Divino *Artesice*; un'occhiata, che si dia sulle foglie di questo fiore, al vederle così esattamente tassellate a scacchi di varj, e bei colori, vi si vede la mano di Dio, e vi si ammira. Questo nobile genere va in pregio ancora per la gran varietà delle spezie, e ricchezza, e finezza de' suoi colori, ne altro gli manca, che il solo odore. Altre sono *Autunnali*, ed altre fioriscono nella Primavera, altre doppie, ed altre scempie, altre di un sol fiore per stelo, ed altre di più fiori, altre di foglia larga nella pianta, ed altre di foglia stretta, simile al giunco, dette perciò *Junifolia*, altre scaccheggiate di un sol colore co' soli segni de' quadrelli, altre di due colori differenti, ed altre non scaccheggiate. De' colori par, che non vi manchi altro, che il solo turchino, e vi è anche frequentemente il verde a scacchi o bianchi, o gialli, o rossi, e vi è il color di castagna oscuro, che va poco meno al nero; e dalla varietà di questi, e simili accidenti ne raccoglie *Clarici* presso a quaranta spezie differenti, e cinquanta il *Weinmanno*. Fu detto *Fritillaria* da *Fritillus*, che significa secondo alcuni lo Scacchiere, ma più giustamente significa il cannello, in cui s'agitano i dadi, prima di gettarli sul tavoliere; e fu detta *Meleagride*, perchè colorita a scacchi come le Galline *Affricane*, *Meleagridi* chiamate.

A questa pianta, che nasce spontaneamente su i monti, ed in paesi freddi, dee si dar sito fresco, ed opaco, e ne' tempi caldi dee tenerli bene innaffiata, e piantasi in terra grassa, e sostanziosa: E' da avvertire, che nel cogliere il fiore, se non lasci una buona parte dello stelo sulla pianta, ne patisce grave danno il bulbo, il qual non tengasi fuor di terra, nel trapiantarli; perchè attesa la sua delicatezza, presto divien grinzoso, e si secca: gli si rinnova la terra, o il sito nell'Autunno, ed allora si separa dalla madre la nuova prole delle radici bul-

bulbose. Matura il seme nell' Bstà, ma è difficile a maturarlo, il qual si semina nell' Autunno circa un dito sotterra, ed è contumace a nascere, come detto abbiamo, parlando del Loglio, perocchè tarda per tre, o quattro anni a germogliare, dopo i quali bisognerà pure aspettare, che si vada perfezionando il bulbo, finchè possa dar fiore nell' anno ottavo, o nel nono; e di più dopo sì lunga aspettativa, dice il P. Ferrari, e dietro a lui gli altri Fioristi, che questa sorte di fiori, nati da seme, non muta colore; ciò ch'è io non posso darmi a credere; perchè tanta varietà di spezie non è potuta venire, se non dalle semenze, e son certo, che se alcuno abbia la pazienza di prepararne il seme, secondo il nostro metodo coll' applicazione delle polveri seminali di varie spezie, e colori, e di seminarlo ogn'anno, ne ricaverà di poi ogn'anno molte altre spezie nuove, belle, e peregrine. E' da tenersi sempre umida la terra, ov'è seminato, della quale, ogn' anno sene levi la superficie, e sen aggiunga un mezzo dito della nuova, e ben grassa, e nato, che sarà, sene debbono trapiantare i bulbi nel sesto anno. Però io penso, che potrà farsi nascere prestissimo, quando si adopera la medesima industria, che si è prescritta per la semenza del Convolvolo pennato Americano, detto Quamoclitto, la qual è medesimamente così restia, e pur si fa nascere in otto giorni: che se questa fosse ancor più contumace, a vincer la sua durezza, tenerci di macerarla più lungamente in acqua di calce, o di nitro, o d' altro, che suol accelerare la germinazione, come, si è divisato P. 3. C. 18.

Della Fritillaria crassa si è già parlato sotto il titolo *Apocynum*,

*Gelsemium Indicum, seu Bignonia
Americana Tab. 21.*

Gelsomino Indiano Massimo . Franz . Jasmin de Virginie . Germ. Kupffer-Platte .

Fig. 5. Di color rosso misto di gialliccio , e strisce gialle ; unico , per quel , che so , nella sua spezie . Degli altri gelsomini si parlerà alla parola *Jasminum* .

Oltre del terren grasso , e ben macero , richiede il posto solatio , e libero , per distendervi le radici : dacchè distendesi largamente , e va in alto fin sopra gli alberi ; ma perchè è di gambo sottile , arrendevole come vinco , tien bisogno di appoggio ; al qual si aggrappa , in simil maniera come l'Edera . Fiorisce nell' Està , nè teme i rigori del freddo , ed ama , dalla Primavera insino alla fine della State di essere irrigato . Moltiplicasi col seme o nell' Autunno , o nella Primavera , ed in questa può anche propagarsi per ramo ; cioè , secondo l'istruzione del P. Ferrari , prima che gli occhi , o gemme si gonfino , togliesi un ramicello con tre occhi , fendesi col coltello da capo , e sotterrasi fino al second'occhio , talchè il terzo non si ricuopra . In tal guisa s'appiglia , e cresce ajutato massimamente dall' acqua , e dal Sole : ovvero come dice il Volcamero , Fl. Nor. 227 , si strappano i polloni con qualche appendice di radica , e piantansi in buon terreno .

Genista, seu Spartium Tab. 21.

Ginefra , o Sparto . Franz. Genest. Spag. Scobus , Yerva tora . Ingl. Broom . German. Linst.

Fig. 6. Ginefra di Spagna di fior doppio giallo , della quale vi è la scempia dello stesso colore , per la vivezza del quale viene ancora stimata , ed entrambe per lo grato odore . Altre due spezie di Ginefra Spagnuola ammettonsi ne' giardini , una delle quali cresce eziand-

eziandio ad altezza d'albero, e veste i suoi ramicelli, o verghelle di piccoli fioretti candidi, e sol rosseggianti nella base, di forma simile a' Gelsomini, e son ordinati in lunghe linee per le verghelle, come tante gentilissime Margarite: l'altra non è arbusto alto, ma è nana, odorosissima, detta per ciò dal Turnesfort *Genista pumila odoratissima*.

Fioriscono nella Primavera, e servono a formar spalliere ne' contorni del giardino, eccettuata la sola nana, la qual sta bene ne' vasi, e nelle parti medie del giardino, ove possa goderfi la fragranza dell'odor, ch'efala; e stando ne' vasi può ritirarsi al coperto nell'Inverno gelato, del quale però non temon le altre spezie. Può darsi loro terreno d'Ortaglia, o Salvatico, che sia buono, e mezzanamente letamato. Passon moltiplicarsi per via di propagini, e piantaggione di polloncelli, massimamente di que' intrappati colle barbe; oppure col seme nell'Autunno, ma per esser duro, e difficile a nascere, tienfi a macerar nell'acqua, esposta al Sole, finchè paja ben gonfio, e prossimò a germogliare.

Geranium, Noctu-olens Tab. 22.

Geranio, Noctuolens, Becco di Grù. Franz: Bec de Cicogne, Bec de Grue, Spagn. Pico di Cigauna. Ingl. Storckes bill. Germ. Storch-senabel.

Fig. 1 Africano con foglia d'Anemone di color rosso nericante, che odora la notte: altro simile rosso infiammato con foglia d'Anemone più larga; altro incarnationo di foglia più stretta.

2. Africano; che cresce ad albero, di fior splendente, rosso vermiglio con foglia grande, non guari dissimile a quella della Malva maggiore; ma non leggo, che abbia odore, e par che sia il medesimo, così descritto dal Clarici,, Ell' è pianta veramente rara, arborea,
con

son le foglie d'Alchimilla, coperta d'una densa e bianca lanugine, con li fiori d'un elegante, e luido color di Grana; Altro pure siborea con i fiori a color di Alacca rigata, e fogli di Aetosa, e d'ello stesso sapore di quella.

3 Africano, frutice di fior colorito a fasce gialle, e rosse, con foglie splendenti, e macchiate.

4. Africano, di fior bianco, macchiato di violente oscuro, che odora la notte, di radice tuberosa, e foglia di Rapa-naga. Altro tuberoso simile di fior cinericio, macchiato di violetto; altro nano di fior bianchiccio con l'aggiunta di alcune fogliuzze gialliccie, e foglie anguste nella pianta.

6. *Ludiano Trifto*, che odora la notte, di fioretti dipinti di rosso; ed orlati di bianco con foglia di *Pastinaca*, simile nella forma de' fioretti è il bianco con foglie di *Malva* rotonde, crasse, morbide, e odorosissime; nè guari diverso è il *Noctuolens* incarnato, e macchiato di rosso, carico con foglie di *Aquilegia*.

6. Africano di fior porpureo biancheggiante, con foglie di Malva, frangiate di bianco: altro simile nel fiore, ma con foglie di Malva, fregiate con circolo rosso nel mezzo: altro di fior purpureo, e foglie di Malva odorose: altro, le di cui foglie odorano di Melissa; ed un altro, le di cui foglie son pur di Malva, ma rugose, di un verde pallido, e di gambo peloso.

7. *Africano Etiopico di fiore incarnato, e sfrilato di*
purpureo, le di cui foglie son ampie, e ritondate: e spi-
ra odor soavissimo anche di giorno, con le foglie della
pianta siniglievoli a quelle della Mirride. Simili a que-
sto sono i fiori de' Geranj detti Butracoidi, i quali son
molti, e di varj colori, ed altri di loro, oltrechè son
belli all' occhio, son anche grati all' odorato, come i
due riferiti da Clarici, dicendo „ Il Romano, assai bello
per la vaghezza delle foglie, e del fiore, essendo quelle
di co-

di colore fra giallo, e verde, divise or in cinque, or in sette parti, ma non fino al centro, ed in ciascuna incisione hanno una macchia atropurpurea, e li fiori sono or due, or tre uniti, di un bellissimo color di porpora, variegati di rosso: essendo non men bello il terzo Batraceide Odorato, i di cui fiori escon da un calice globoso striato, composti di cinque foglie di color misto di Viola, e di Porpora, di grato odor di muschio, e così pure le foglie, che pajon di Orecchia d' Orso, non hanno ingrato l'odore. „

Le spezie de' Geranj son moltissime, e molto fra loro diverse, ma soglion convenire nella forma del Ricettacol de' semi, il qual, cadute le foglie del fiore, cresce lungo, ed acuto, e molto simile a becco di Grue, come significa il nome impostogli di Geranio. Il solo *Noctuplens* è di nove spezie, che chiamansi ancora Geranj Tristi, forse perchè alcuni d' essi son di color bruno, e mesto. La ragion fisica, per cui odoran la notte, e non di giorno, sarà forse, perchè l' esalazione di questi fiori, essendo tenue, e volatile, col calor del giorno attenuasi tanto, che non può far sensibile al nostro odorato la sua impressione; ma poi col freddo della notte, condensato alquanto più, può eccitar più forte la sensazione.

Fioriscono per tutta l' Estd, e qualche spezie, come l' Arborea fig. 2. sino all'Autunno, e soglion mantener le foglie ancor nell'Inverno. I tuberj delle spezie tuberose servon di cibo saporito agl' Indiani, ed Africani. Cavanfi di terra, e dividonfi dopo tre anni, per moltiplicarli, mettendo un sol tuberò per vaso, o non più di due, e la terra sia sottile, e grassa macera: conservansi bene l' Inverno, col tenerli un poco umidi, ma non bagnati. Propagansi parimente col seme, seminato nella Primavera, coperto appena di un leggier velo di terra, con tutto il resto, che si è prescritto per le sementi piccole. Gli Arborei, o i Fru-

tici

ticei possono propagarsi altresì con istrappar piantoncini con la radice, o anche ramoscelli senza di quella, piantandoli in luogo ombrato, finchè si appiglino.

Gladiolus, & *Gladiolo affinis*,
seu Antholiffa. Tab. 23.

Gladiolo. Sicil. Spatulidda. Franz. Glayeul. Ingl. Cornor Ivvord Flag. Germ. Schvverdtel.

Fig. 1. Africano purpureo: vi è il bianco con altri simili purpurei poco differenti.

2. Antoliffa, confimile al Gladiolo, unica nella sua specie, di color rosso, che tira all'aureo.

Il Gladiolo qui delineato è il medesimo, che il nostro Campestre, il qual fiorisce fra le biade, ne' io ci vedo diversità; però Clarici ne raccoglie altre specie affai più belle delle Compestri, venute da paesi stranieri, e che meritano l'onor della coltura, ne' signorili Giardini; e sono il Gladiolo Etiopico, il quale ha un solo bulbo, non d'ordine duplicato, come gli altri, ma piano, ed il fior è d'un amenissimo incarnato. Di non minor bellezza è quello di radice tuberosa, il fior del quale, in forma di densissima spica, è rosso gentile. Un altro di color atro purpureo maggior di tutti, venuto da Costantinopoli. A questi aggiugne due bianchi rarissimi, quello a color di carne, il violetto purpureo, il rosso purpureo, medesimamente grande con i fiori pendenti da una sola banda: il minore con i fiori incarnati da un solo canto, e quello di Candia d'un rosso scintillante di rara bellezza, col quale, dice l'Autore, si tira d'arco a modo di freccia.

Questi tutti fioriscono di Maggio, e Giugno sino quasi a tutto Luglio; convien loro il sito solatio, e terra leggiera, ed arenosa: piantansi nell'Autunno, e lasciansi per tre anni, dopo i quali nel Luglio cavanfi da
 terra

terra , per levàr loro la prole &c: oltre la moltiplicazion , che fanno de' bulbettini , propagansi col seme, messo a terra, subito che raccogliessi, ed in capo a quattro anni darà i suoi fiori . Notasi di questo seme , che rarissime volte produce alcuna varietà da quel, ch' era la Madre; ma se uno ne abbia delle varie spezie, ed applichi industriosamente, come si è insegnato, le polveri femminali d'una spezie all'altra, farà più facile, che dal seme ne vengano nuove composizioni, e varietà.

Gnaphalium, seu Helicbrysum Tab. 23.

Elicriso, Fior perpetuo . Franz. Immortelle .

Fig. 3. Giallo in paglia, splendente . Il Clarici raccoglie dodici spezie di Elicrisi, tutti degni di coltura, cioè l'Orientale bellissimo, e per la foglia della pianta, e per lo dorato color del fiore, il Solterino di spagna con fiori, e squame grandi, l'odoratissimo della foglia larga peloso, l'Etiopico arboreo quasi umbellato, odoratissimo, l'Etiopico con le squame de' fiori oltre modo splendenti, e sette altri Africani a color d'oro, o d'argento, belli, e splendenti.

Questo gener di fiori ha il raro privilegio d'essere immarcescibile, e conservarsi inalterato per più anni: propagasi col seme nel mese d' Ottobre, e i pedagnuoli trapiantansi poi nell' Aprile in terra sabbiosa, e piena insieme di sostanza. Possono anche sotterrarsi i ramicelli, e radicati si moltiplicheranno: è lor favorevole il prospecto meridionale, e foglion essere tolleranti della sete, ma non per ciò si ha loro a negare l'umido competente, e sol bisogna cautelarli dal gelo in paesi rigidi.

*Granadilla V. Clematis Passionalis.**Granata flore pleno, seu Balauſtia Tab. 23.*

Melogranato dal fior doppio, Balauſto, Balauſtro.
 Franz. Granadier. Ingl. Granat--tree. Germ. Gefüllte,
 Granat Blume.

Fig. 3. Doppio minore dell' iſteſſo finiſſimo color
 roſſo de' fiori ſcempi del fruttifero Melogranato. V' è
 il maggiore, e l' abbiamo belliffimo, a grandezza di
 una Roſa di cento foglie; e vi è l' altro maggiore va-
 riegato di due colori, ma quali ſieno tai colori non di-
 chiara il Clarici.

Il Balauſto non è pianta diverſa dal Melogranato,
 il qual, nato qualche volta dal ſeme, potè riuſcire acci-
 dentalmente di fior doppio; ed eſſendo doppio, non
 produce frutto, per eſſer privo di Ricettacolo, e forſe
 ancora di ſtami, e d' Apici. Ama la coltura medeſima
 de' Melogranati, cioè ſito umido inſieme, ed aprico, e
 terra graſſa, e ſoſtanzioſa, e ſi conſà bene con letame
 di Porci, col quale lo difendon l' Inverno ne' paefi ge-
 lati, ſcavando la terra intorno al pedale, ed in ſua ve-
 ce ricoprendolo di ſterco porcino. Fioriſcono dal Mag-
 gio fino ad Agoſto. Moltiplicanſi d' inneſto, e di rami,
 ſtaccati con qualche porzione di legno della madre, o
 da' germogli, che gli naſcono accanto, o che vengon
 ſù da qualche radice ſcoperta, i quali devono ſpiccarſi
 con qualche parte della ſteſſa radice, e faranno abili a
 produr fiori in quell' anno medeſimo.

Helicryſum V. Gnaphalium.

Hæmanthus, ſeu Narciffus Iudicus Serpentarius
Tab. 23.

Emanto, Narciffo Indiano ſcagliſo, o Serpentario.
 Fig.

Fig. 4. Di finissimo color vermiglio son le sei crasse foglie, che formano, come un calice di questo raro fiore, simile a quello del Melograno, il qual contiene poi dentro il concavo seno molti piccioli fiori, uno de' quali sta qui separatamente delineato nella sua giusta grandezza, e son più di trenta, come scrive Boerhaave, ed altri; ma Fabio Colonna li fa ascendere a più di cento, e forse tanti ne produrrà nel suo nativo suolo, che è il Capo di Buona Speranza, onde poscia è venuto, e si è sparso nell'Europa; dove, come dice il Ferrari, che l'ebbe in Roma, malagevolmente, e di rado fiorisce, e come riferisce il Commelino, nella Germania per riscaldarlo, e farlo germogliare, fa d'uopo, di tenere il vaso, ov'è piantato il bulbo, sopra un mucchio di sterco di Cavallo: con tutto ciò nè l'altezza del gambo sua propria acquista, nè del colore la vivacità, nè del fiore la giusta mole, la qual debb'essere molto maggiore della qui espressa, per poter comprendere più di trenta, o più di cento di cotesti fioretti. Il medesimo fiore rappresentasi pure aperto, e rivolto al riguardante, e con esso il gran bulbo squamoso, che ugguaglia la mole di due pugni, le sue due foglie, che si allungano a due palmi, e si allargano a mezzo palmo, e son grosse quanto quelle della Squilla: queste nascono, dopo ch'è caduto il fiore, accanto allo stelo, alto anch'esso un piede e mezzo, e di color bianchiccio, ma sparso di macchie sanguigne a spoglia di serpe, onde ha il nome di Narcisso Serpentario.

Spunta il fiore da terra nel Settembre, ed Ottobre, grosso quanto una Noce, e va crescendo nello spazio di tre settimane, finchè sia compiuto, e poi va maturando il seme, col quale può moltiplicarsi, ove lo compia in paesi caldi, o temperati, come il nostro; e può anche moltiplicarsi nella medesima guisa, che praticasi con i Gigli Martagoni, e con altri bulbi: cioè spiccansi dal

bulbo le scaglie, delle quali piantate se ne formano tanti nuovi bulbetti, e dopo pochi anni già cresciute daranno il fiore. Piantansi codesti bulbi in terra magra, ed arenosa, perchè la grassa, insinuandosi fra le loro scaglie, facilmente potrebbe guastarli: va posto il bulbo sotterra solamente tre dita, e dee tenersi in luogo apri- co: quando nella Primavera perdute avrà le foglie, non gli si dia più acqua, per fare asciugare la terra, e se sia in vaso, si ritiri in luogo, ove non possa esser bagnato dalla pioggia, ma pur lo scopra il Sole; e se piantato sia in terreno, cuoprasi con un mucchio di terra asciutta, per difenderlo dal penetrarvi la pioggia insieme, ed il calore eccessivo dell' Està, che ugualmente gli nucono. Al Settembre, quando è prossimo a germogliare, tornasi a mettere il vaso allo scoperto, ovvero, se nel terreno, gli si leva di sopra il mucchio della terra; e se hanno a togliersi le scaglie suddette, per piantarle, allora, o poco tempo prima cavasi fuori il bulbo, si rinovi la terra, o gli si cambi sito, e senza tenerlo troppo esposto all'aria, si ripianti; perchè, come avverte premurosamente il P. Ferrari, tutt'i Narcissi Indiani, stando fuor di terra, restano notabilmente offesi. Quindi nel suddetto tempo s'innaffi per una volta abbondantemente, per provocar- lo a germogliare, e poscia mantengasi umido sì, che il soverchio non lo corrompa. Con la descritta coltura, ed industria, conchiude l'istesso Autore, Tranquillo Romauli, praticissimo di tal mestiere, ne ha tratto il fiore ogn'anno.

Helleborine, seu Calceolus Mariæ Tab. 24.

Elleborino, Pantoffola della Madonna. Franz. Elleborine, Sabot, ou Soulier de' nostre Dame. Ingl. Neese Woort Sanicle, Ladres Skipper. Germ. Helleborin,, Kraut; Unser Frauen,, Schuch.

Fig.

Fig. 1. di color purpureo, o ferrugigno, detto Pantoffola della Madonna, perchè due delle sei foglie, di cui costa, son concave, ed una sopra dell'altra commesse insieme, vi formano una come gentil pianella, per la qual rarità viene stimato questo fiore sopra tutti gl'altri Elleborini: nasce ne' boschi, e nelle incolte campagne, e fiorisce nella fine di Primavera, ed io mi ricordo d'averlo veduto, ed ammirato nelle Campagne della mia Patria. Il Turnesfort ne apporta tre altre spezie, cioè di fior maggiore rotondo, e doppio, un altro del Canada, e l' terzo di color giallo.

2 Di fior incarnato, e vene sono altri simili di fior rosso, e di fior bianco, nè pajon cosa troppo stimabile. La coltura ella è la medesima dell'Elleboro,

Helleborus albus, seu Veratrum album Tab. 24.

Elleboro, o Veratro bianco. Franz. Helleboire blanc, Veratre blanc, Spagn. Jerva de balleite, verde gambre blanco. Ingl. Hellebor. Germ. Weiße Nieszwurtz; oder Wende Wurtz.

Fig. 3 Di color rosso scuro, e dicesi Elleboro bianco, sol per la bianchezza della radice, a distinzione dell' altro genere, detto Elleboro nero, che l'ha nera. Un'altra spezie del bianco fiorisce pure a spiga con fiori simili, ma più grandi di color verdiccio. Del nero sene ammette ne' giardini l'Ortense, il qual fiorisce nel mese di Gennajo, col fiore prima bianco, poi purpureo, e poi finalmente verde; quello di fior roseo, e di fior giallo, detto Aconito unifoglio, , tuberoso; e di fior bianco maggiore, ma non sono gran cosa belli.

4. Elleboro Ranunculoide, globoso maggiore di color giallo, ed è fiore veramente bello: del quale vi è il minore, che sembra come lo scempio di quello, detto Aconito Jemale.

Ogni

Ogni qualità di terreno è buono per queste cattive piante, le quali hanno del venefico: coltivansi, e propagansi, come i Ranuncoli colla prole delle radici, e colle semenze; fioriscono altri nell' Inverno, altri nell' Eftà, altri nell' Autunno.

Hemerocalis Valentina V. Narcissus
Hepatica Nobilis Tab. 24.

Epatica nobile, Trifoglio aureo, Erba della Trinità; Franz. Hepatique. Ingl. Liverwort. Germ. Hertz = Kraut.

Fig. 5. Cerulea doppia, e vi è la scempia.

6. Detta aurea di fior rosso scempio, e vi è la doppia.

7. Incarnata, ed ha la sua doppia.

8. Purpurea doppia, e vi è la doppia cerulea, e bianca.

Cotesti fiori sono assai gentili, e soavemente odorosi; e però la pianta meritosi il titolo di Nobile; e per la figura delle sue foglie diceasi Erba della Trinità, o Trifoglio, ed Aureo per la sua grande utilità, massime contra i mali del fegato, onde fu detta Epatica. Propagasi col seme, e colle radici; gode del sito ombroso, ne' teme punto il freddo; fiorisce nel Febrajo, e Marzo, come le viole Mammole, colle quali ha comune la coltura.

Hesperis, seu Viola Matronalis Tab. 25.

Esperide, Viola Matronale, Giuliana. Franz. Giroflée des Dames. Juliane de nuit, Violier. Ingl. Dames Violets. Germ. Nacht-Weilen.

Fig. 1. Ortense di fior bianco doppio odoratissimo, ed ha per compagna un'altra, detta erbacea di fior simili-

simile, ma che dalla parte esterna delle foglie tiene verdognolo il colore.

2 Montana di fior scempio, verde pallido, svenato di rosso scuro, odoratissimo di notte, detto perciò No-Quolens,

3 Di fior purpureo scempio, e la simile di fior bianco, alle quali aggiugne Clarici quella di fior verde, la cerulea Siriaca, la Peregrina di fior variegato, purpureo, e ceruleo; la purpurea di Portogallo; le tre Africane, cioè Cerulea pelosa, Cerulea maggiore, e minore con foglie di Coronopo.

4 Di fior purpureo doppio, e Clarici aggiugne la variegata.

Son fiori lodatissimi, particolarmente per la soave fragranza, ma son rari i doppi, ed in pochi giardini si trovano; però potranno farsene molti, e di nuove, e belle spezie, se osservinsi le istruzioni, per far venire i doppi, e semidoppi dalle semenze, specialmente quella particolare istruzione, che si è data per lo seme del Leucojo, o sia Viola arborea, a cui son molto congeneri coteste piante. Si semina il seme di Settembre, ed Ottobre, per averne alcuni pochi fiori almeno nel Maggio, Giugno, e Luglio, o più oltre nell' Està, quando soglion fiorire, e può anche seminarli nel mese di Marzo. Poscia nel secondo anno fioriscono più copiosamente, ed allora soglion morire, quindi fa d'uopo seminarle per ogn' anno. Le doppie, che non han semenza, posson farsi perenni, se dopo la lor fioritura si tagliano i rami più giovani, e medicando con cera la ferita, si piantino in terra grassa, e forte, alquanto incurvati, come detto è del piantar di ramo, lasciando fuori della terra due, o tre occhi, e tenendoli in luogo fresco, ed ombrato, e bene innaffiati, finchè mettano le radici. Penso io, che più facilmente si appiglino, con far le margotte, come ne' Garofani, ma non trovo una tal maniera insegnata da

da altri: propagansi ancor più facilmente per via de' germogli, staccati dalla madre con quel più di radici, che sia possibile, oppure, come penso, collo sbranamento della stessa madre nella guisa medesima, che si è detto de' Garofani, purchè la pianta sia adulta, e robusta. Amaro sìto caldo meridionale, e non troppo umido, benchè dicasi, che al tempo del fiorire, e dopo di quello non de' badi dar loro più di due, o tre ore di Sole: non temono il gelo, ma pur ne' paesi rigidi consultano di metterle al coperto, le danneggian però molto le Ruche, se non si badi ad ucciderle.

Hyacinthus Tab. 25, 26, & 64.

Giacinto. Franz. Hyacinthe. Spagn. Mayos flores. Ingl: Grape flower, Harebell. Germ. Hiacinth.

Fig. 5. Tuberoso, doppio, bianco.

6. Il medesimo scempio, entrambi odorosissimi.

Tab. 26.

Fig. 1. Ispanico di fior ceruleo, e vi è il compagno bianco.

2 Massimo doppio, bianco con tintura d'incarnato.

3 Orientale turchino doppio.

4 Incarnato doppio.

5 Stellato del Perù Ceruleo.

6 Spicato, stellato incarnatino con stelo, e foglie d'Orchide.

7 Orientale scempio, purpureo.

8 Moscato, o sia Muscari, Muschio Greco, Botrioide maggiore, odoratissimo, di color giallo, e ven' è altro di color terreo. Ma nel Fiorilegio di Emanuele Svertertio trovasi anche il bianco, l'incarnato, il ceruleo, il purpureo.

9 Botrioide minore, incarnato odoroso, ed altro è tur-

è turchino, altro bianco, che poi maturo tira al grigio, altro pardiglio, o sia nericcio.

Tab. 64.

Fig. 1. Giacinto Peruano di color Cilestro

2. Peruano incarnato, tratto da *Svveertio*, il quale, come si vede, ha qualche diversità negli stami, e tuba dal nostro della fig. 1, ritratto dallo stesso fiore originale; ma è cosa patente che le immagini di questo Autore non abbiano tutta l'esattezza. Un altro più piccolo tra ceruleo, e latteo vien chiamato Bizantino: son fiori ben composti, e di bell'apparenza: e poichè si erano trasandati, si sono aggiunti fuor d'ordine in questa Tavola.

Quanto sia nobile il gener de' Giacinti, sì per la fragranza, come per la varietà delle specie, e rara lor bellezza, è superfluo il dirlo, mentre si sa, e vede da ognuno. I soli Tuberosi non hanno alcuna varietà, ma gli Orientali, i Belgici, ed i Nostrani ammetton, tutte le varietà, che posson farsi da questi tre colori, bianco, rosso, e turchino; trovasi eziandio il Giacinto verde, e sol vi manca il giallo, ma pure alcuno ne ho veduto con qualche tintura di gialliccio. Abbiám qui lasciato di delineare il Giacinto Calamistrato, il di cui fiore turchino ha la forma di un ramicello di Cipresso, e due Africani di fior piccolo con foglia d'Orcadi, e qualche altro, che pure son capricciosetti, ma non son cosa da farlene gran conto.

I Tuberosi fioriscono per tutta l'Età, ed ancor nell'Autunno, quando i tuberi sien piantati in diversi tempi, o si comincino ad innaffiare la prima volta altri prima, ed altri dopo, per averne fiori primaticci, e tardivi. Amano egualmente il calor del Sole, e l'refrigerio dall'acqua, della quale debbon tenerli suzj. e

la terrad'Ortaggio debb'esser grassa, e sostanziosa. Moltiplicansi colla semenza, e da quella ne son venuti i doppi, stimati qual cosa rara, e degnissima; e propagansi colla division de' tuberì, la qual può farsi nel Marzo, o anche nell' Inverno; e sebbene possan levarsi di terra, e conservarsi in luogo asciutto, sarà però meglio tenerli sempre sotterra.

Tutti gli altri Giacinti fioriscono nella Primavera, o anche nell' Inverno ne' climi temperati. I Fioristi dietro il P. Ferrari assegnano a' Giacinti il sito apertissimo, e solatio; ma ne' paesi temperati, o caldi, come il Palermitano, il solatio sollecita la pianta, e la fa presto fiorire, appena nata, prima che il bulbo abbia fortificate le sue radici, e così non può somministrar al fiore gran sostanza, per venir grande, e gagliardo; v'è di più, che 'l fiore riesca di gambo corto, e sproporzionato, come avvenir suole ad ogni altro gener di piante, quando si tengano troppo esposte al Sole: quindi sarà cosa più proficua, che in tali paesi stieno in sito mezzanamente aprico, ove non godan del Sole più, che d'una mezza giornata. Ma del Giacinto verde, del Peruano, e di qualche altro avverte il Ferrari, che stien più tosto a bacio, che all'aprico. Meglio riescon in terra vergine, e salvatica, quando sia buona, sottile, e sostanziosa, che in quella d'Ortaglia, la qual non debb'essere grassa, nè totalmente magra, e sfruttata; eccettuasi il solo Giacinto Muscari, o sia Muschio Greco, che la richiede grassissima. E' un ottima industria, metter sotto del bulbo un buon suolo di terra grassa, e poi un altro suolo di terra vergine, o arenosa. e quivi sepellir la cipolla, sopra la quale poi si potrà riporre un altro suolo di terra grassa; perchè in tal maniera le radici profundate nella terra di sotto, vi troveranno buon nutrimento; il bulbo nella terra vergi-
ne

ne , o che non ha del pingue , non starà soggetto a guastarsi , e la terra grassa sovrapposta , col penetrar della pioggia , anderà dolcemente penetrando , per somministrar nuovo alimento . Il Ferrari prescrive , che i bulbi di giusta grandezza si piantino un palmo sotterra , ciò che sembrami pur troppo , ma sarà bene profundarli fino al mezzo palmo , acciocchè le radici mantengansi fresche , ed insieme godano degl' influssi dell'aere , che potrà fin là agevolmente penetrare . Prescrive ancora , che le cipolle , se prima non figliano in gran copia , si lascino in terra fino al quart'anno , senza cavarle ; perchè fuor di terra vanno a rischio di guastarsi , o sfruttarsi : ma noi qui più comunemente usiamo di cavarle ogn' anno ; e conservansi bene , quando vi è la cura , di asciugarle all' ombra per qualche tempo , tenendole in luogo ventilato , e poi riponendole in luogo asciutto , ed aperto , o in casse bucate per ogni parte , o in cesti , e panierì , ove possa l'aria permeare ; giacchè in ogni sorta di cipolle , se tengansi in scatole chiuse , v'è pericolo , che muffino , e si corrompano . Cavanfi da terra i bulbi al più presto , quando già sien aride del tutto le foglie ; e poscia dopochè si faranno bene asciugati all'aria , prima di ripiantarli nell' Autunno , si staccheranno d'attorno i spicchi più grandi ; lasciando i piccoli , mentre ancora non troppo aggravan la madre , ed assai meglio col materno latte potran nutrirsi , che non spoppati immaturamente .

Propagansi co' spicchi , e con la semenza , la qual può seminarfi , o tostochè sarà raccolta , in sito fresco , ed ombroso , o nel principio dell' Autunno ; e staran quivi per due anni a crescere i bulbettini , a' quali ogn'anno aggiugnesh un dito di terra sostanziosa , e poscia trasplantati daranno il fiore nel terz'anno , piccolo sì , e forse semplice per quella prima volta ; ma non per questo è perduta la speranza d'averne i fiori doppi , se

la semenza non era tutta reproba; da que' medesimi bulbi, già più cresciuti, vene saran molti, che daran doppio il fiore, sicchè sarà d'uopo aspettar la seconda fiorita, per accertarsi dell' esito delle sementi. Per averle di buona qualità consulta il Ferrari, che si lascino a semenzire i fiori de' bulbi giovani, e vigorosi, i quali ancora non han prodotta veruna prole, e vuol di più, che si lasci il solo primo stelo, e si tronchino gli altri, che dietro a quello spuntassero; e quindi sul fiorire del primo stelo, vuol, che si tronchi la cima del grappolo fiorito colla maggior parte de' suoi fiori, lasciandone soli tre, o quattro da piedi, a' quali vada il vigor tutto della pianta. Al contrario il Clarici vuol, che si lascino tre, o quattro bocciuoli de' primi a fiorire, con staccare gli altri, nel che concorda col Ferrari, ma proibisce, di troncar la cima del gambo, ciò che sembra più conveniente; perchè il taglio della cima non è una leggier ferita ad una pianta così gentile, e nuoce alle piante in fiore ogni leggiero incomodo, come alle Donne gravide, che può farle abortire. Son buone coteste industrie, ma pure per aver da' semi sicuramente i fiori doppi, si dia mano all'applicazion delle polveri seminali de' doppi sopra de' scempi, o semidoppi; e come ho provato ancora con replicata sperienza, se ne otterranno de' nuovi, e capricciosi, e doppi in tanta gran quantità, da non più desiderar nè quei, che vengon di Fiandra, nè quei, che un tempo vennero dal Levante,

Jacca, vel Viola tricolor, Flos Trinitatis.

Tab. 27.

Giacca, o Viola Martia di tre colori, Fior della Trinità. Franz. de la Penfee. Ingl. Hartissnase Jove idle pames, Panfyes, Germ. Flocten Blume, Scabiosen.

Fig. 1 di due colori, purpureo, e ceruleo smorto;
ed

ed altra ven' è bianca, e cinericia.

2 Di tre colori, purpureo, e turchino, ambidue oscuri, e giallo chiaro.

3 Di tre colori, purpureo scarico, purpureo carico, e turchino.

4 Di tre colori, purpureo, turchino, e bianco.

5 Montana gialla di gran fiore odorosa; ed'altra del tutto simile, e sol poco diversa nella foglia della pianta. Son fiori bellini, e simili alle Viole Mammole; fioriscono allo stesso tempo, ed amano la medesima coltura, e propagansi col seme, che ne cade in terra, dal quale ogn' anno spontaneamente risorgono, Alcune vivono per più anni, e son quelle di gambo eretto: le Montane gialle di gran fiore non muojono al primo anno, ma durano due, o tre anni: si semina il lor seme nella Primavera, o anche nell' Autunno ne' climi temperati. Le vere Giacèe propriamente non son queste, ma molto diverse, e molto simili al Ciano, anzi sono spezie dello stesso genere de' Ciani, delle quali Giacèe ne ammette Clarici quattro spezie all' onor del Giardino, ma non è paruto a me, che lo meritino. Queste Giacèe di tre colori più tosto son Viole Martie, e così son chiamate più comunemente, e sotto tal titolo ne tratta Clarici, e ne conta da undici spezie differenti, cioè la Montana di tre colori odoratissima, la Montana cerulea con due altri colori; la Montana di tre colori variegata, la bianca Ortense, l' Ortense di fior bianco, purpureo, e giallo, l' Ortense di fior bianco, pallido, ceruleo, e giallo, l' Ortense col fior purpureo, ceruleo, e giallo, l' Ortense col fior violaceo, come di seta, purpureo, ed aureo, l' Ortense col fior nero porporino, come di seta con poco di ceruleo, e giallo, ed altra Ortense con fior grande a color d' oro, bianco, pallido, purpureo, che risplende, come di seta.

Jacobea Tab. 27.

Giacobea, Erba di S. Giacomo. Franz. Jacobée. Ingl. Raguvort. Germ. Jacobs Blum.

Fig. 6 Africano di fior ampio purpureo col disco giallo.

Clarici ne raccoglie da diciotto spezie degne di giardino, le quali son quasi tutte di fiori gialli, e noi dopo d'aver esposta qui la spezie, che par più degna, lascerem coltivar tutte le altre, a chi avesse penuria d'altri fiori più nobili. Fioriscono nell' Està circa la festa di S. Giacomo, onde par, che abbiano tratto il nome: moltiplicansi col seme, il qual vien portato dal vento, se presto non si raccoglie, e dal vento bisogna difenderle con qualche appoggio, acciocchè non vengano maltrattate, e son contente di qualunque coltura.

Jalappa V. Mirabilis Peruana.

Jasminum Tab. 27.

Gelsomino. Franz. Jossemin, Jasmin. Ingl. Jasmine. Germ. Jasmin.

Fig: 7 Di Spagna, o di Catalogna, bianco, ed ha il suo doppio, con altre due, o tre foglie di più, le quali fogliono star fra se raccolte come una palla, ed un altro simile, detto umile, ambidue di fior grande, a distinzione del salvatico di fior piccolo, e tutti son odoratissimi.

8 Giallo odoroso, ed un altro giallo di fior più piccolo, detto Trifogliato, ed altro trifogliato di fior bianco, però entrambi senza odore.

9 Gelsomino d' Arabia, detto Gimè, o Sambar Arabo, semplice bianco, pallido, il quale ha il suo doppio, ambidue di soavissima fragranza.

10 Gelsomino Mogari, o Mogarino doppio, odoratissimo.

ratissimo, bianco, come anche il suo scempio; e non avendone noi potuto vedere, o l'originale in se stesso, o alcuna copia in istampa, l'abbiam così delineato, secondo la descrizione, che ne rapporta Clarici. Le foglie della pianta sono un poco più acuminate di quelle del Gimè, ed i fiori dello scempio a guisa di quelli del Gelsomino volgare, ma assai più grandi, quasi bianchissima stella, divisi in sette, otto, ed al più nove foglie acuminate. Nel doppio congregò la Natura le doti de' Gelsomini in bellezza, grandezza, e odor gratissimo. Il gambo della pianta è pelosetto, ed i rami stende a guisa di Convolvolo: le foglie son piane, lisce, crasse, e vanno a finire in ottuso. I fiori son di molte foglie, più odorosi, e più grati de' scempi, ed arrivano nella grandezza ad emular le Rose: son stimatissimi eziandio nella lor patria, ch'è il Malabar nell'India Orientale, d'onde son venuti nell'Europa, ove son rarissimi, e nell'Italia trovavansi solamente ne' Giardini del Serenissimo Gran Duca di Toscana al tempo del Clarici.

Molte son le spezie de' Gelsomini, e noi dell'Indiano, detto Bignonia Americana, ne abbiám parlato alla parola *Gelsimum*: così di un altro Americano, detto Quamoclit, alla parola *Convolvulus*: degli altri, che lasciam di riferire, ne fa distinta nota l'istesso Autore; però non son essi o più degni degli annoverati, o facili ad averli dal nuovo Mondo, d'onde aver si potrebbero.

La coltura è quasi la medesima per tutti; crescono in qualunque terreno sostanzioso, e ne vasi in terra d'Ortaglia; amano l'adacquamento, e 'l Sole, giacchè in sito a bacio crescono in ramo, e non rendon molti fiori. Propagansi facilmente o con le margotte, o con le semplici propaggini, chinando nell'Inverno i rami più vicini a terra in piccoli fossi; oppure molto meglio in fosso più grande chinando, e fortterando intero il tronco con tutt'i rami suoi nella guisa medesima, come fanno

noſi le propaggini delle viti: poſſon anche piantarſi itami ſtaccati, i quali ſieno i più liſci, ed i più ſani, e verdi, lunghi almeno un palmo, e caccianſi in terra graſſa, e macera alla profondità di ſei dita, e tengonſi in luogo freſco coperti dal Sole, ſempre umidi, e ben adacquati, ed a capo di un anno tutti quanti troverannoſi abbarbicati. Però le buone razze meglio propaganſi coll'inneſto, fatto nel Marzo, Aprile, e Maggio, o anche ne' tre meſi dell'Eſtate, come vuol Clarici, ſopra il ſalvatico, e rieſcon più durevoli: il ſalvatico ſia groſſo un dito, e tagliando ſopra uno de' nodi più baſſi vi ſ'inferiſce la calmella, e coll'impiaſtro di cera, &c. vi ſi medica la ferita: coll'incalmo rieſcon più agevolmente gl'inneſti de' Gelfomini, che ad occhio, e le più elette calmelle ſon quelle, che levanſi vicino al tronco, le più liſce, e le più ſine: del ſalvatico ſi van ſtrappando di mano in mano i germogli, che ne pululano; ed i germogli del diameſtico dopo che ſaran creſciuti, ed avran cinque occhi, o gemme, dovranno ſpuntarſi; ciò che giova a fare maggior copia di fiori, dacchè ſono impediti, a produrre una maggior copia di rami.

Il Gelfomino di ſpagna ogn'anno ſull'entrar della Primavera potaſi a tondo, raſante il capo dell'inneſto; perocchè, dice il Ferrari „ Se ſi laſciano le ver, „ ghe con un occhio, o due, verranno i germogli radi, „ e di fiori men fecondi: per lo contratio dal capo, „ o nodo, potato baſſo, uſcirà quaſi una folta chioma „ di gormogli, e farà più feconda, e durevole „ Ma l'Arabico del Gimè vuol, „ che 'l primo, e 'l ſecondo „ anno, poichè ſi è fatto l'inneſto, ſi pori baſſo fino „ al primo occhio; che coſì quello più ſ'ingroſſa, e mette „ più ſpeſſi rami, e più vigorosi, i quali creſciuti, che „ ſieno da quattro dita, a foggia de' Gelfomini di Spagna, ſi ſpuntano, perchè e deſſi, e l'occhio più ingroſſi-

ingrossino. Il terzo anno gli si lasciano i ramicelli di un palmo a guisa di un arbuscello: così ogni anno di mano in mano fino a tre palmi per altezza, e larghezza si lascerà la pianta divenire come un arbore; ed in grandezza, e statura tale si manterrà; togliendovi insieme i ramicelli più sottili, o rivolti all'in giù, o biftorti, o secchi, o per altro inutili, diradando in tal guisa la spessezza dell'arbuscello, e lasciando i rami più vigorosi, più dritti, e più lisci, e spuntandogli sovente alla misura già detta. In tal modo si provvederà alla salvezza, e vaghezza di questa pianta, con allevarvi ramoscelli, o marze per altri nerti,.

Il Gimè, ed il Mugarino, di cui non è differente la coltura, patiscono dal caldo eccessivo, ma molto più dal freddo; onde bisogna ripararli dal gelo, colla gelosia medesima, con cui gli Agrumi vengon in paesi freddi premurosamente custoditi. Alle singolari doti del Mugarino sopra tutti gli altri Gessomini accoppiasi la virtù di sanare il morso del Cane rabbioso, applicandovi sopra le foglie trite, e fritte con olio; e la sua radice, cotta con Calamo Aromatico nell'acqua d'Orzo, è contraveleno al morso de' Serpenti, come si riferisce nell'Orto Malabarico. T. 6. 89.

Iris Tab. 28.

Iride, Irios, Giglio Celeste, o Azzurro. Frank. Flamme, Glayeul. Spag. Lirio Cardeno. Ingh. Flours de luce, Germ. Veiel, Vurtzel.

Fig. 1 Color di Lacca nelle foglie inferiori, e nelle superiori di campo bianco con striscie rosse, e colle foglie della pianta larghe.

2. Ispanica bulbosa, doppia, cerulea con strati azzurci nel mezzo delle foglie esterne.

3. Persiana bulbosa di color celestino, e bianco, e nell'

nell' estremità delle foglie inferiori orlo bianco, macchia cremisina, e poi giallo macchiato di Cremisi.

4 Bianca con striscie purpuree di larga foglia nella pianta.

5 Suffianna di color grigio, o Calcedonica maggiore, ed altra di fiore elegantemente variegato.

Le Iridi superano forse ogni altro genere nella varietà; e prima dividonsi in Iridi di foglia larga, dette Latifoglie, ed in Came--Iridi di foglia stretta, dette perciò Angustifoglie, minori delle prime, e di gambo, e di fiore, come nella figura 3; e poi suddividonsi in Tuberose, che vengon da radice, o tubero, ed in Bulbose, che vengon da cipolla. Altre son odorose, ed altre no, e l' odor n'è assai grato, e soave, e fin odorosa n'è la radice di odor gentile di Viola Mammola: son varie eziandio nello stesso odore, qualche specie odorando di Coriandro, e qualche altra di Tiglia. Più varie son nella forma, ma soprammodo varie nel colorito; nessun colore vi manca, se non il vero nero, ed in un sol fiore ammiratisi sovente quattro, e più differenti tinte, distribuire con stupenda corrispondenza, ordine, e simmetria. Hanno ancor varietà nel tempo del fiorire dal Dicembre susseguentemente fino al Maggio; e conchiudendo con le parole del Clarici,, son di sì fatta varietà, di sì peregrini colori, e di sì rara, e soave fragranza, che fan maraviglia all' occhio, e all' odorato,,. Le più stimate son le bulbose, le odorose, e le doppie, nè può notarsi in esse altro difetto, che la corruttilità del fiore, che poco dura per la sua estrema delicatezza: la sola Ortense pallidamente cerulea, e soavemente odorosa conservasi qualche tempo, succedendosi i fiori l' uno all' altro, e posta in ordine fa di se bella mostra. In ogni paese ne nascon delle buone per la campagna, ed io mi ricordo di aver veduta la Suffianna, ch'è una delle più capricciose nella Campagna della mia Patria

Patria, della forma, e color medesimo, qui espresso.

Non haffi a faticar niente per la lor coltura, perocchè nascono in ogni luogo; ma pure terren magro, ed asciutto assegnati alla maggior parte delle Tuberosi, ed alle Bulbose terren d'Ortaglia. Propagansi colle semenze, e di là ne viene una varietà mirabile con nuovi, e rari colori, e forme le più degne, e capricciose: il seme compiuto già nel mese di Luglio, può allora seminarli in sito fresco a bacio; ovvero nel Settembre, ed al terz' anno se ne potrà avere il fiore; e propagansi in gran copia colla separazion de' tuberi, e de' bulbetti di nuova prole, la qual fassi, quando cavanli ogni tre anni, ed allora rinnovando loro la terra subito ripiantansi.

Keiri V. Leucojum fruticosum.

Ketmia V. Rosa Chinenfis.

Laurus rosea V. Nerium Indicum.

Leonurus Tab. 29.

Leonuro, e **Cardiaca Africana**. Franz. Queve de Lion. Germ. Leodvven-Schvveiff.

Fig. 1. Minore di color Feniceo chiaro, o sia color d'Aurora.

2. Maggiore, detto altrimenti Siderite, di color feniceo più carico. Vi è il terzo Canadense, chiamato ancora Origano Canadense, ma non è gran cosa bello il fiore; rosso cremisino piccolo.

I primi due Leonuri son venuti in Europa dal Capo di buona Speranza; son frutici, ed il secondo cresce alto come arboscello; in ciascun nodo spiegano un folto corimbo di fiori assai belli, e capricciosi, come fatti di fili di seta, e di odore aromatico, ma la foglia della pianta è di cattivo odore. Stanno in concerto delle più rare, e belle piante della Natura; facilmente multipli-

canfi o col seme, o con ramoscelli piantati, i quali per alcuni giorni preservati dal Sole facilmente porran radici. Il freddo ne' paesi rigidi in pochi giorni li fa perire, eccettuato il Canadese, che vien dal gelato Clima del Canadà; e però in tali luoghi, a conservarli per più anni, fa duopo, di tenerli al coperto nell' Inverno; il proprio lor sito è quello del Mezzo giorno; esigon buona terra, e sostanziosa, e quindi fioriscono per tutta l' Estate, e continuano sino all' intero Novembre. I fiori del Leonuro servon di cibo, al riferire del Reine, ad un augellino assai rinomato, ed insigne per la soavità del canto, per lo vago colorito delle piume, e per la rara sua piccolezza, che è quella di un Moscone, o di uno Scarifaggio; l' augelletto vien chiamato Aurisia dal Clusio, e Paxaro Mosquito dall' Acosta, e dall' Oyiedo, ma il suo nome proprio nel Brasile è Ganambuc.

Leucojum bulbosum, seu Narcisso.
—Leucojum Tab. 29.

Leucojo Bulbofo, Narcisso-Leucojo. Franz. Campanes Blancs, Perceneige. Ingl. Bulbed violet. Germ. Schnee-Tröpflein.

Fig. 3 Il maggiore di color bianco. Tre spezie vene son del maggiore, quasi del tutto simili, e sol differenti, o nella foglia della pianta, or tenue, or larga, o nella quantità de' fiori; poichè una spezie detta Polyanthos, mette fuori da uno stelo più d' uno, o due fiori. Due altre spezie sono i minori, di pianta, e di fiori più piccoli, ed una di esse ha lo scempio, e 'l doppio. Quella spezie del maggiore, che ha le foglie tenui, fiorisce nell' Autunno, e le altre nella Primavera: non è grato il lor odore, e non son gran cosa da stimarsi. Dacchè sono una spezie di Narcissi piuttosto, che altro, e però sieguon la coltura medesima de' Narcissi.

Leuco-

Leucojum Fruticosum, seu *Viola Arborescens* Tab. 29. & 30.

Leucojo , Viola a ciocca . Sicil. Barcu . Spagn. Violettas blanquas . Franz. Violettes Giroflie , Violet. Ingl. Wall Flowver , Stock , Gillo Flowver , Germ. Welsche Ucieln , Winter-Veieln , Stock--Veieln .

Fig. 4. Maggiore cremifino semplice di foglia lanuginosa , e canuta .

5. Maggiore doppio , variegato di bianco , ed incarnato :

6. Maggiore , variegato di purpureo , e cilestro .

Tab. 30.

Fig. v. Massimo detto Cheiri , di gran fiore giallo con tintura di rosso gialligno .

2. Il suddetto fiore , nella sua natural grandezza espresso , trovasi nel Weinmanno miniato di finissimo rosso col centro giallo , ma esso non fa parola veruna di tal altra sorta di Leucojo Massimo rosso ; e però sembra , che sia stato error del Pittore , che dovea colorirlo di giallo intenso , variegato d' aureo , e purpureo .

3. Lo stesso Massimo doppio variegato di giallo , ed aureo , che trabocca nel rosso .

4. Altro Cheiri doppio giallo di fiore ben ritondato .

5. Minore giallo odoratissimo , ed ha il suo doppio di fior più grande .

De' Minori vi sono i fruticosi , bianchi , rossi , e purpurei , graziosamente rabescati di vene per tutta la foglia del fiore , e nascono nelle Montagne della Sicilia , come nota il Volcamero .

Il Leucojo , o sia la Viola a ciocca è uno de' generi più nobili per la bellezza , odore , copia , e varietà

tà de' fiori, che produce, ed è uno de' più vaghi ornamenti del giardino; la varietà scorre per molte spezie, e per tutt' i principali colori, rosso, giallo, turchino, e bianco, or per se soli, ed or combinati variamente insieme sullo stesso fiore: ma sopra tutte le Viole spiccano quelle tre del fior grande nella fig. 1., 2., e 4. rappresentate: a queste abbiám dato con altri Botanici, come per Autonomasia, il nome di Cheiri, col quale chiaman gli Arabi le Viole d' ogni spezie, e s' interpreta fior perfetto, quali spezialmente son queste tre forti degnissime.

Fioriscono le Viole per lo più nella Primavera, e parte durano nell' Està, o anche sino all' Autunno, e qualche spezie fiorisce pur nell' Inverno: debbon piantarsi in terren grasso, forte, e solatio, e senza gran coltura si fan bell'e grandi le piante, purchè stieno larghe, ed abbiano un mediocre umido, onde nutrirsi. Propagansi per ordinario col seme delle scempie, seminato nel Settembre, o nel seguente Marzo; e la maniera da tenersi, per farne riuscir doppie le piante, potrà leggersi nel C. 15. par. 2. n. 217. ove l' abbiám particolarmente insegnata. Ma le buone razze, che vorrem perenni, possono rinnovarsi, prima che periscano, ed anche moltiplicarsi, o per mezzo di Margotte, fatte immediatamente dopo la fioritura, le quali poi in Settembre si troveran con le radici, atte a piantarsi, o per via di rami staccati dalla madre, e piantati in terra forte, ben macera, e crivellata, con isceglhier, per ciò fare, i rami più vigorosi, eseguendo tutte le regole, già prescritte per le Margotte, e per lo piantar di ramo, le quali si son replicate non ha guari nel parlar de' Garofani.

*Lilac V. Syringa.**Liliumstrum.***Gigliastro . Franz. Lis de Saint Bruno .**

Si è lasciato di delineare , per non avere onde ritrarlo : è chiamato anche Falangio di gran fiore , o Afodelo con gran fiore di Giglio , e s' intitola Alpino dalle Alpi , ove nasce . Sorge la pianta da gran radici bozzolute , e tuberose , di foglie strette , prolisse , ed acuminate , di alto gambo , ed ornato di circa dieci fiori Giglacei bianchissimi di grato odore : è di due sorti , Maggiore uno , l' altro Minore . Fiorisce con gli altri Gigli , e la coltura è la medesima del Giglio volgare .

Lilium Tab. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Giglio ; Franz. Lis , Lilie , Spagn. Lirio , Azuzena .
Ingl. Lilles , Germ. Lielie .

Fig. 1. Bianco volgare di forte odore , ed un altro ven'è bianco detto Maggiore , il qual però dubito , che sia il predetto Gigliastro .

2 Bianco doppio senza odore , e vi è lo scempio , detto Giglio del Canada .

3 Bianco doppio spicato ,

4 Bianco Peregrino Costantinopolitano odoroso , detto Sultan Zambach dagli Arabi .

5 Bulbifero maggiore , vagamente tinto d'aureo , e di rosso al di dentro , e pallido al di fuori , di foglia larga ; ven'è altro di foglia stretta col fior colorato di un bel rosso : vi è il terzo , alto appena un cubito , con fiori di un rosso pallido , ed il quarto di fior simile , con foglie verdi negreggianti , e coperte di canuta lanugine . Diconsi Bulbiferi , perchè non solamente producon la nuova prole de' bulbi sotto la terra , ma pur ne producon

ducon dal pedicello delle foglie per tutto il tronco della pianta, come qui vedesi nella figura; ed è notabile di codeffi bulbettini, che se talora restino attaccati al tronco, di là mandan fuora le radici, e le prolungan tanto verso la terra, finchè possano afferrarla, per trarne alimento: tanto è innato ancor nelle insensate piante l'amor di vivere, e conservarsi.

Tab. 32.

Fig. 1. Purpureo, e giallo all' esterno, e nell' interno Cruento, cioè straziato di vermiglio, e giallo, e puntato.

- 2 Cruento doppio
- 3 Bianco, striato di purpureo, e vi è il macchiato di giallo, ed un altro gialleggiante nel margine.
- 4 Cruento minore puntato di purpureo.

Tab. 33.

Fig. 1. Giglio Narcisso Indiano, detto volgarmente Giacobeo, a color rosso finissimo, e soave sì, che sembra fatto di felpa. Un altro ne descrive Clarici simile nella figura del fiore, le di cui foglie tre superiori, e tre inferiori rivolte all' ingiù, disposte son della stessa maniera, come nel precedente, che rappresentano una certa somiglianza della spada rossa, che portan per lor divisa i Cavalieri di S. Giacomo, e però furon detti tai Gigli Giacobei: son due spezie differenti; perchè quello produce da uno stelo un solo fiore, e rare volte due, e fiorisce nel Giugno; ma quest' altro, ne spiega quattro in Agosto, rivolti all'ingiù, come i Gigli Martagoni, ed il suo rosso non è quel carico, ma più chiaro, come rosso di Aurora.

- 2 Giglio Narcisso Virgineo giallo, ed altro ven' è bian-

bianco, e alquanto rubicondo all'estremità delle foglie.

3 Giglio Narcisso Indiano gentilissimamente colorito di bianco, ed incarnatino: Sicil: Giglio Bella Dama.

4 Altro simile di nome, e di fattezze, o ancor più bello, ma di gambo più alto, e grosso, e di un maggior numero di fiori, eziandio sino a venti, e ciascuno grande, quanto i sopradetti; sebbene qui, per rappresentarne tutta la figura, sienti in piccolo delineati. Più altre spezie sino a ventidue di Gigli Narcissi, non men belli de' qui delineati, potranno leggerfi nel Clarici, i quali, per evitar la confusione in tanta varietà di questo sì numeroso genere, lasciam di riferire.

5 Giglio Convallio, o delle Convalli, detto anche Mughetto, bianco rosseggiante; vi è il bianco, il variegato doppio di foglia larga, il semplice, quel di foglia stretta, quel di più ordini di fiori ornato, quel di un sol fiore basso vicino alla radice, e vi è il minore Unifoglio, che fa un grappoletto di piccolissimi fiorellini bianchi. Questo gener di fiori tien la sua stima per lo merito della soavissima fragranza.

6 Boccuole de' semi del Giglio Convallio, colorite di rosso, le quali, caduto il fiore, suppliscono a quel, che mancavagli di bellezza.

Tab. 34.

Fig. 1 Giglio Asfodelo, di color rosso feniceo.

2 Giglio Asfodelo giallo.

3 Giglio Martagone, detto Pomponeo, miniato di finissimo rosso, e odoroso.

4 Martagone di angusta foglia, rosso feniceo puntato, detto in Italia, Riccio della Signora, il qual è per ordinario di un sol fiore, ma tal volta di due, o tre. Vene ha di una sorte consimile, che porta più di tre fiori di color purpureo, e sanguigno.

Tom. II.

O

5 Mar-

9 Martagone giallo, misto di sanguigno, più piccolo, di angusta foglia.

6 Martagone giallo Bizantino, detto Ermocalli, di più fiori, a color vermiglio finissimo.

Tab. 35.

Fig. 1 Giglio Asfodelo, detto Asfodelo Liliaceo, di giallo rossigno a lunghe striscie colorato.

2 Giglio Narcisso di color bianco, il qual nasce in queste nostre spiagge marittime, ed ha tanto del Giglio, e del Narcisso, che nessun altro merita un tal nome più propriamente, che questo; e però lo chiamo così, non sapendo con qual nome lo dicano i Botanici, seppure ne parlino. Spiacemi di non averlo avuto presente nel delinearlo, eccetto che nella memoria; fiorisce nell'està, è di gentile comparsa, e di grato odore.

3 Martagone, o Montano il più degno, che abbia io mai veduto, e l'ho delineato sul naturale, ma pure non v'è arte, ne' colore, che ne possa esprimere la bellezza. Il delineato costava di nove Gigli, che formavano una volta convessa, e piegata di lato in buona prospettiva, senza che uno coprisse l'altro; il riccio delle foglie, tutte ancora scanalate, ed i lunghi, e ritti Stami, e Tuba, gli fanno un vizzo, che rapisce l'occhio; ma incanta il vivacissimo color cirieggiuolo così delle foglie, come degli Stami, e Tuba, e vi aggiugon grazia i soli Apici nericanti. Nel mezzo della foglia scorre una linguetta, o fiammella di rosso più carico cremisino; ma, chi l'avea, diceami, che l'anno avanti sul colore di Ciriegia stendeanfi molte linee splendenti, come d'oro, e d'argento. Il solo male di questa nobil pianta è, che in paese temperato; come questo, quasi mai fiorisce. Ne ho allevati per più anni, venutimi da Napoli, e dalla mia patria, ove fioriscon bene, e non ne ho colto un
fol

sol fiore, ed ora ne ho portate in campagna le cipolle in terra falvatica, e secca, come dirò, ch' esigono i Martagoni, per tentar di farli fiorire.

Tab. 36.

Fig. 1 Montano puntato, di molti fiori purpurei con mistura di bianco, ed ha consimili altri due Martagoni puntati, uno in cui abbonda meno il purpureo sul bianco, e l'altro bianco puntato di purpureo, e nel rovescio delle foglie tinto di purpureo dilavato.

2 Montano non puntato misto di purpureo, e bianco, a cui è simile il tutto bianco.

3 Marragone Imperiale Moscato, bianco, che odora di muschio, detto altramente Giglio Montano maggiore, o massimo. Piramidale Moscato, Ermocalli Moscato, Sultano Zambac &c. Merita tanti titoli per la sua magnifica grandezza, la qual non si è qui potuta esprimere, altro che in iscorcio; perocchè quando la pianta è in terreno proporzionato, produce una sì magnifica Piramide di grandi Gigli, poco differenti ciascuno dal volgare, ed in tanto gran numero, che riferisce il Clusio, averne veduta una di sessanta Gigli, ed il Lobelio è pur testimonio di vista di un'altra, il di cui gambo un palmo grosso, ed alto a statura d'uomo, sosteneva duecento, e più candidissimi Gigli.

I Martagoni, ed i Montani son di molti altri vaghi, e varj colori, e forme, ne' par che vi manchi altro, che il turchino. Emmanuele Sverzio *Florileg.* ne' apporta alcuni gialli, ed uno tra questi singolarissimo, che fa una magnifica spiga di molti, e gran Gigli attorcigliati, e simili alla Fig. 6. Tab. 34. assicurando l'Autore, che questo supera tutt' i Martagoni. *Multis, & magnis floribus luteis alios superans.* pag. 51. Altri son odorosi, ed altri nò; nè vi mancano i doppi, de'

quali ne numera otto il Clarici, ed in tutto conta ventotto forti diverse di Martagoni, e dodici altri di Montagna, tutti degnissimi.

Tab. 37.

Fig. 1 Giglio, Corona Imperiale, di fiori gialli; e vi è la bianca, la fenicea, la rossa, la Cinese; variegata di rosso, e giallo, altra di verde, e di bianco Argenteo, altra a color d'oro, e d'Arancio, e più altre differenti, tra le quali vi si contan le doppie, una rossa, ed una gialla.

2, Coronata di due ordini di fiori, tinti di rosso, e giallo: ven'è anche qualch'una con tre ordini di fiori; ma credesi, che non sien queste d'altra specie, da quelle, che ne producono un sol ordine; perchè osservasi, che la medesima pianta, or lussureggia in più corone, ed or in una si contiene.

E' fuor di questione, che il gener de' Gigli sia de' più nobili; e sol può dubitarsi, se alcun altro genere lo superi, o lo pareggi per la sì varia diversità delle sue specie, tutte belle, e capricciose, pella grandezza, e molteplicità de' fiori, pella lor fragranza, pella finezza, e varietà de' colori, la vivacità de' quali non può di certo esprimersi con la miniatura, ma con tutto ciò a sol vederli miniati condegnamente, incantan l'occhio: però veduti in natura fanno ammirarsi più gai, e pomposi, che non fu ammirato Salomone nelle sue gloriose comparse, come ne parlò l'Incarnata Verità, a cui devesi la lode, di averli creati di sì rara bellezza. *Luc: 12.*

Vengo partitamente alla coltura delle diverse specie, ov'ella sia differente. Il Giglio bianco volgare con altre sei spezie, che gli son congeneri, (cioè che cavasi dal color bianco, che hanno, ancorchè variegato d'altro colore, e dalla figura, e forma consimile del fiore, della

la Cipolla, della pianta, e del tempo medesimo del fiorire) sta bene in ogni sorta di terreno, ed in qualsivisia esposizione: sol richiede, che ad ogni tre anni nell' Autunno sgravisi della numerosa sua prole, e rinovata la terra, si ripiantan le Cipolle. E' rara, ed insolita la maniera di moltiplicarlo col seme; dacchè il Giglio, vero simbolo, della purezza, non suol mai concepire il seme; ma pure il Gesnero ha il merito di avere insegnato il modo, come sollecitarne la fecondità. Quando è già compiuto il fiore, staccasi dalla pianta con tutto lo stelo intero, e tenendolo appeso all' ombra, compie senz' altro la sua semenza: n'è strana la maniera, ma pur è vera per testimonianza del Turnefort, che ne fece pruova in Parigi. *Inst.* 371. Vopo è dire, che gli nuoca il troppo umor, che tira dalla pianta; e che basti alla concezion de' semi quel solo, che contienfi nello stelo, da se sugoso.

Il Giglio Giacobeo suddetto ha la massima imperfezione, di non compier semenza, ed ho tentato in vano di fargliela compiere in simil maniera, per poterlo forse ridurre a doppio per via di seme. Però i Dilettanti potranno far essi quel, che io per altri impicci non ho potuto provare, di far venire dal seme del Giglio volgare i bastardi, coll' applicazione delle polveri seminali del Giacobeo, de' Martagoni, de' Bulbiferi, e di quegli altri, che fioriscono insieme tra Maggio, e Giugno, coll' avvertenza, di troncar gli Apici al volgare, prima che mettan fuori le polveri &c. così potrà sperarsi di ridurli a doppi, e d' introdurre delle nuove spezie miste, capricciose, non mai vedute.

I Gigli Bulbiferi posson anche moltiplicarsi col seme lor cartilaginoso, il qual è maturo nell' Agosto, e seminasi nel Settembre, quando pure piantansi, e traspiantansi i bulbi; aman terreno d' ortaglia, e luogo freddo, qual è il lor paese, ove nascono sulle Montagne

Il Clarici ne raccoglie sette altre spezie, che coltivansi, uno rossigiannte, uno a color di carne, uno bianco con linee verdi, l'Africano umbellato porporeggiannte, il giallo di foglia larga, e 'l piccolo di gran fiore a color di Rosa. Però quasi tutte puzzan d' Aglio: il delineato moltiplicasi cogli Spicchi, cavati in Agosto, e piantati in Settembre; stanno essi attaccati alla sua gran Cipolla, la qual produce il gambo del fiore, grosso, ed alto più che cubitale, e fra il gambo, e le foglie, elevasi una come foglia, in cima di cui producesi un bulbetto simile all' Aglio, il qual maturato, e piantato in terra, germoglia, e produce la sua pianta, la qual pure matura il suo seme, con cui potrebbe ancora propagarsi. Fioriscono parte in Febrajo, e Marzo, parte in Aprile, e Maggio, nè avvi per loro altra coltura, che quella dell' Aglio, di cui imitano le fattezze. Una di coteste spezie di Moli pare a me, che sia quella, che chiamiamo Agliola, di pianta, di foglia, e di fior più piccolo, ma similissimo al delineato, e sebbene sia fior di bassa condizione, si vuol però per la sua bianchezza di neve, colla quale fa il suo spicco, e fa meglio spiccar gli altri fiori nelle caraffe.

Narcissus Tab. 40. 41. 42. & 64.

Narcisso, Narciso, e Giunchiglia. Franz. Narcisse.
Germ. Narcissen-Roslein.

Fig. 4. Giallo, doppio, ed ha il compagno bianco.

5. Moltiplice giallo.

6. Pallido scempio con calice ampio nel mezzo.

7. Semidoppio bianco con calice pallido, frangiato.

8. Settentrionale pallido con calice alto, e tagliuzzato in foglioline, che formano come un altro fiore.

9. Il medesimo raddoppiato.

Tab.

Tab. 41.

Fig. 1. Orientale pallido, ed aureo rosseggiante in mezzo, doppio di gran fiore.

2. Giallo scempio con alto calice fimbriato, che qui chiamiam Trombone.

3. Pallido di calice giallo, grosso, e dentellato, scempio.

4. Bianco di neve con nappo rosso.

5. Orientale bianco con calice stellato pallido.

6. Portoghese Polyanthos, cioè di molti fiori gialli.

7. Altro Polyanthos Orientale massimo con nappo pallido, scanalato: ed altri ve-ne son di più fiori, ma più piccioli con nappo or bianco, or pallido, ed or giallo, volgarmente detti Tazzette.

8. Narcisso con foglia di giunco, volgarmente Giunchiglia minore gialla.

9. Giunchiglia maggiore pallida, ed altra primaticcia poco più gialla.

10. Giunchiglia maggiore gialla.

11. Giunchiglia doppia gialla. Debb' aggiugnerfi la Giunchiglia dal fior giallo variegato, altra di fior rotondo, disposto a guisa di Rosa, altre due bianche di Primavera, e due di Autunno, una bianca, ed una verde, venuta dalle coste d' Africa, bagnate dal Mediterraneo, di gratissimo odore.

Tab. 42.

Fig. 1: Narcisso Indiano Gigliato sferico, da alcuni chiamato Ornitogalo sferico, oppure Moli massimo Indiano, di molti fiori, colorati di vivo chermis, molto più grande del qui delineato.

2. Uno de' suoi molti fiori nella sua giusta forma, e grandezza espresso.

spiegasi in giro la nobil corona de' Gigli, più grandi, che non son qui delineati, e più numerosi, arrivando ne' climi più freddi dell' Italiano, a coronarsi di quaranta; fino a sessanta fiori; e sopra la corona tornano in cima le toglie, e vi formano come un gentil pennacchio, che assai vistosa la rende. Sene piantano le cipolle nell' Autunno in terren da erbaggi, più tosto magro ne' climi caldi, come il nostro, ma ne' freddi vuol esser ajutata con terreno assai sostanzioso: un bulbo dall' altro si mette lontano circa due piedi, nè vi sien altre piante vicine, perchè esigendo molto nutrimento, patiranno scambievolmente queste, e quelle: il buco d' onde il fiore suol nascere, deve turarsi con una foglia, acciocchè non vi cada dentro la terra, che impedimento, e danno gli recherebbe. Ama il sito mediocrementemente so-
lato. Propagasi con la prole de' bulbi, che produce, i quali cavati subito ripiantansi in alcuni climi, ma in altri, come dice Clarici del suo della Lombardia, si perderebbono, o mal fiorirebbono, se non si cavasser da terra nel mese di Luglio, tenendoli in luogo asciutto, involti dentro carta, per poi ripiantarli nel Settembre. Posson anche propagarsi col seme, il qual matura in Luglio, dopo la lor fioritura in Aprile, e Maggio; ma uopo è aspettare ott' anni, finchè ingrossate le Cipolle dieno il primo fiore.

Linaria Tab. 37.

Linaria, Franz. Linaire, Lin Sauvage. Spagn. Linaria. Ingl. Toad Flax. Germ. Lein--Kraut.

Fig. 3 Purpurea maggiore odorosa; ed altra purpurea odorosa di foglie più anguste: consimili sono due bianche maggiori, odorose, una delle quali ha le foglie capillari, e così altre di varj colori: e vi son le minori per la picciolezza della pianta, alcune delle quali han-

no del pari picciolo il fiore; e vi è la massima Americana di fior purpureo con due altre Americane, una trifogliata di fior purpureo, e l'altra di fior ceruleo, e bianco; ma il fior più grande, purpureo, lo fa la Dalmatica.

4 Con foglie di Bellide, e fiorellini purpurei odorosi.

5 Austrica maggiore di fior aureo, ed altra, detta aurea, molto simile.

Fioriscono nel Luglio, ed Agosto, e n'è maturo il seme nell'Autunno, quando pur si semina, per moltiplicarle: vanno poste in terra d'Ortaglia, e per ordinario reggono al crudo Inverno; ma quando mancassero, possono riseminarsi nella Primavera. Crescon alte, e son piante simili al Belvedere; e per la pianta, e per lo fiore, ch'è bonino, e odoroso, hanno il suo merito, per entrar fra le piante di coltura.

Lycnis Tab. 38.

Lichnide. Franz, Oeillets. Germ. Margen--oder Marien--Röslein.

Fig. 1 Calcedonica di fiore scempio, miniato di vivace rosso, ed ha la consimile incarnatina col gambo ispido di peluzzi.

2 Calcedonica doppia miniata.

3 Saponaria doppia bianchiccia, dilavata d'incarnato con la sua scempia bianchiccia.

4 Viscosa di fior rosso doppio, e vi è la bianca di fior poco più piccolo, ma prolifera, portando tal'ora un fiore dentro dell'altro,

5 Viscosa rossa scempia; e ven'è bianca, purpurea ed incarnatina.

6 Pratenfe di fior laciniato rosso, ed altra di fior bianco verdiccio.

7 Coronaria di fior doppio rosso; e le scempie son altre rosse, ed altre bianche.

3 Lichnide, detta Ocimoide, bianca doppia.

4 Ortese purpurea, detta Ocimaastro.

Le Lichnidi son fiori estivi, e degni di stima per la lor bellezza: si mantengono in terra sostanziosa, e grassa, ed amano di star esposte al mezzodi per lo calor del Sole, eccettuata la Coronaria, che non l' ama molto, e son contente di poco umido, dandosi loro acqua, quando dien segno di languidezza; ma in tempo del lor fiorire adacquansi con fazieta: reggono mediocrementemente al freddo, ma non totalmente ne' climi troppo gelati. Propagansi col seme, seminato nell' Autunno, o nella Primavera, ed altresì co' ramicelli, svelti, o tagliati dalla pianta, e piantati, medicando prima con cera il taglio della parte, che mettesi sotterra; ma la più accertata maniera è quella dello smembramento di tutta la pianta nell' Autunno, dividendola in più parti, e lasciando ad ogn' una la sua parte della radice, come detto è de' Garofani.

Malva Tab. 39.

Malva. Franz. Mauve. Spagn. Malvas. Ingl. Mallovv. Germ. Pappeln.

Fig. 1 Rosea doppia di color rosso oscuro.

2 Rosea doppia col disco incarnato, e'l mantello Solferino.

3 Arborea scempia bianca.

Le Malve, che coltiviam ne' Giardini, a distinzione delle altre, son dette Rosee per la simiglianza, che han con le Rose: son uno de' più belli ornamenti tra i fiori estivi, se le piante sien disposte con ordine intorno a' viali, e adornano coll' alta statura dello stelo, colla grandezza, e moltitudine de' fiori, di cui vestesi lo stelo, e colla bellezza loro, varietà, e mistura de' più fini colori. Vi si è aggiunta l' Arborea scempia, apportata dal

Weinmanno, se pur ella sia diversa dalla Malva Arborescente Cinese, la qual noi rapportiamo fra le Rose. Riescon vegete, piantate in terra grassa, e ben adacquata. Si seminano nell' Autunno, e poi si trapiantano, prima che la pianta sia molto cresciuta. Quand' è maturo il seme, troncafi lo stelo, senza disturbarne la radice, la qual dura, e torna a dar fiori per tre, o quattro anni, ma devesi ogn' anno levarle intorno la terra sfruttata, e ricambiarla con nuova, e sostanziosa.

Malva Arborea Rosea, Indica V. Rosa Sinensis.

Malus Persica Tab. 39.

Perfico, Pesco dal fior doppio. Franz. Porcher. Spag. Pexego. Ingl. Peach-tree. Germ. Pfirsich-Baum. Fig. 4 Perfico dal fior doppio, incarnato; ed un altro ven' è Africano, nano, di fior medesimamente pieno, ed incarnato.

Il Perfico, il Granato, il Ciriegio, e qualche altro albero da noi lasciato, mostran, che ancor le piante arboree, posson riuscire di fior doppio, quando fosse in uso di propagarle per via de' loro semi, da' quali tenghiam per certo, che sien venuti cotesti alberi; nè i lor fiori hanno punto, che invidiare alla bellezza de' fiori delle piante umili. E' un bel vedere nella Primavera un albero di Perfico tutto adorno, e pieno zeppo di Rose incarnate della grandezza appunto di una doppia Rosa Damaschina. Acciocchè faccian quest' alberi una più vaga comparsa, al principio della Primavera: se gli taglian le cime de' ramoscelli di tal maniera, che si mantengano in forma rotonda, e ben proporzionata. Propagansi per via d' innesto sopr' altro Perfico, o per via di ramoscelli piantati in terra umida nell' Inverno, e tal, quale, come a Persichi, gli si dà la coltura. L' Africano però, come

come nato in clima caldo, acciocchè non perisca ne' climi troppo freddi, non solo ha bisogno di stare al coperto nell' Inverno, ma pure di un calor moderato nelle notti più rigide.

Matricaria, seu Parthenium Tab. 39.

Matricaria, Partenio, Amarella. Franz. Matricaire, Marone. Spag. Madricaria. Ingl. Feverfew. Germ. Mèter--Kraut.

Fig. 5 Scempia volgare, bianca con disco giallo, altra bianca odorata, ed altra con le foglie de' fiori triplicatamente raggiati.

6 Doppia bianca, e tal' è quell' altra dell' Isola di Ceilan, ed una terza Indiana con foglia larga; ma la Giapponese doppia è a color di Rosa bellissima, siccome altra Giapponese col fior doppio minore.

7 Tubulata doppia, bianca, ed ha la sua scempia, con altra fistulosa di foglia crespa nella pianta.

Staranno bene in terra grassa, e macera, e propagansi col seme nell' Autunno, e messe quindi le radici, si trapiantano alla novella stagione. Fioriscono nell' Està, e le doppie replicano alle volte qualche fiore anche nell' Autunno, quando sien potate di forma, che si lascino que' soli rami, che veggonsi per tal tempo disposti a fiorire. Chiamasi Matricaria, per esser un efficacissimo rimedio alle male affezioni dell' utero.

Meleagris V. Fritillaria.

*Mirabilis Peruviana, seu Julappa,
aut Solanum Mexicanum. Tab. 40.*

Maraviglia del Perù, Fior di notte, Sciarappa. Franz. Mervillos, Belle de nuit. Spagn. Maravillas del Perù, Arre-

Arrevoleras. Ingl. The Marvel of the World. Germ. Schu-
veitzer--Hofen.

Fig. 1 Maggiore screziata di giallo, e vermiglio,
e più altre simili di varj, e bei colori.

2 Minore rossa, la qual non è in istima per la pic-
ciolezza del fiore.

Meritosi di Mirabile il nome per la vaghezza, e
varietà singolare de' suoi colori, variando eziandio ne'
fiori di una medesima pianta, trovandocene altri bian-
chi, altri rossi, altri gialli, altri mischj, e picchiettati,
ed uno stesso fiore la metà di un colore, e la metà
di un altro. Dicesi fior di notte, perchè spiegasi verso
la sera, e poi chiudesi, ed appassisce col nuovo Sole, seb-
bene al mattino adornasi tutta la pianta di un pari gran
numero d' altri fiori, e così continua sempre fiorita dal
Luglio fino alla metà di Novembre, e negl' ultimi me-
si, e ne' giorni freschi, e nuvolosi i fiori conservansi
ancor di giorno. Alligna ella in ogni terreno, e clima,
e cresce alta, e folta, e conservasi la sua radice eziandio
fuor di terra in luogo asciutto, ma molto più in ter-
ra per più anni: questa fiorisce circa due settimane pri-
ma di quelle, venute da semenza, da seminarli nel prin-
cipio di Marzo, assai larga, e poi cresciuta sei dita si
trapianta con buona ordinanza, e lontano l'un piede
dall'altro, per dar campo alla sua grandezza, ed eleva-
tura, colla quale, e col suo bel verde, tempestato di
tanti fiori, e sì gai, tira a sé gli occhi de' riguardanti,
o la meraviglia.

Matrisylva V. Periclymenum.

Menyanthes V. Trifolium.

Moly Tab. 40.

Moli. Germ. Molg.

Fig. 3. Gigliato bianco, di larga foglia, e soave
odore.

una porzione di quella nera sabbia, e sottile, che depingono i fiumi, altrove da noi descritta; ma io stimo, che in terreno incolto, e salvatico, come ho detto di questi miei Gigli, ancorchè niente grasso, fioriscano eccellentemente, purchè stieno in sito caldo ed asciutto.

I Giacobei però non hanno le imperfezioni degli altri Gigli Narcissi; rendono ogn' anno i fiori, e moltiplicansi con le cipolle, senza marcirsi quasi mai, e son contenti di terra d' Ortaglia. Questo bel fiore arrivato nuovo nel nostro Regno, e introdotto da me, che l'ebbi la prima volta da Malta, si è tanto moltiplicato, e sparso per molte Città, che ora più non si desidera. Può tenersi egualmente in vasi grandi; o nel terreno, ma quivi sta più a pericolo di venir corroso dalle Formiche; dacchè vanno esse per lo mele, il quale scorre ad intiere goccie dalle stamigne, e adescate dall'unto, addentano poi lo stesso fiore: bisogna pure guardarlo dal vento, perch' essendo un fiore delicatissimo, il solo urto colle foglie della pianta lo ferisce sì, che perde quasi tutto il suo bello. Pareami, che questa pianta non temesse il gelo; ma pure in Viterbo gli corrippe talmente le foglie, che mi fe temer della perdita delle cipolle, e patiron anch'esse tanto, che quell'anno non poteron produrre il fiore Mantengonsi le foglie per tutto l'anno, e sol in Genajo, e Febrajo le antiche marciscono, e van rinalcendo le nuove; ed in tal tempo, io uso, dopo due, o tre anni di sgravarlo dal moltiplico delle cipolle, e di rimutargli la terra, colla cautela, di non molestarli le radici. Degli altri Gigli Narcissi tal operazione fassi nella Primavera, se sieno Autunnali, e nell'Autunno, se fioriscano nella Primavera.

I Martagoni, ed i Montani son anch' essi al fiorire difficili in questo clima temperato, però ne' paesi più

3. Boccia, o calice, ove contengono i fiori, tinta di Cinabro ben carico, larga tre dita, e cinque lunga, il di cui stelo sollevasi fino a due palmi, e 'l diametro è di due dita, di color verde rosseggiante.

4. Suo bulbo, maggiore assai della Squilla,* di color ferrigno, e foglie larghe un palmo, lunghe due palmi, e grosse un mezzo dito, di forma rintuzzata, di color verde vivo, e di fosco rosso orlate.

I Narcissi occupano degno luogo tra fiori nobili, ed è sì ricco di spezie varie questo genere, che il P. Barilier ne apporta settanta differenti figure nel suo copioso volume, il qual libro spiace di non aver potuto avere alle mani, per arricchir le mie carte di altri generi di fiori, che si troveranno per avventura espressi nella di lui lodatissima opera, e non son da me conosciuti. A buon conto però non mancano nelle spezie de' Narcissi, da me descritte, le più degne, o almeno le più note.

Tab. 64.

Fig. 3 B' da aggregarsi a' Narcissi, (e si è posto fuor d'ordine in questa Tav. 64. per dimenticanza) il Pancrazio Marino, detto Narcisso Maggiore, o Emorocale Valentina, così detta, perchè nasce ne' luoghi maritimi del Regno di Valenza, ma è pur frequente nella Dalmazia, e ne' monti della Sardegna. Dalla cima del suo gambo spuntano tre, o quattro fiori, emuli de' Narcissi, quali ancor son le foglie della pianta, ma un poco più dure. Fiorisce nel Maggio, ed è di tre forti, due bianchi, uno rosso, ed uno Americano, il qual fiorisce prima: matura il seme in Agosto, ma prima, che dia fiori il grosso bulbo, passano quindici anni.

Sono i Narcissi quasi tutti odorosi di odor gagliardo, ed in molti soavissimo, qual'è particolarmente quel delle Giunchiglie: un Narcisso doppio Americano odo-

Tom. II.

Q

ra di

ra di Balsamo del Perù, ed un altro dal fior minore bianco ha la fragranza del Gelsomino.

I colori ristringonfi a due; il giallo, e 'l bianco, e 'l misto di ambidue; ven' è solamente uno bianco doppio con foglie purpuree nel mezzo, uno semplice massimo, che nel mezzo è or purpureo, ed or ceruleo, v' è la suddetta Giunchiglia Africana verde, e 'l Pancrazio rosso. Propagansi con i bulbetti, che producono, e col seme loro, dal quale, non è difficile, ad aver doppie le Giunchiglie, e quando si usi l' arte nostra, si avranno facilmente i doppi da tutte le specie, ed i misti di due colori, e sperar si possono le terze spezie miste, del Pancrazio rosso, e del Narcisso. Piantansi nel mese di Ottobre in terren sabbionoso, acciocchè i bulbi meglio si conservino, ma che sia di quella sabbia sostanziosa, cavata dalle sponde de' fiumi, o portata ne' solchi dalle piogge; ella è ancor buona la terra d' ortaglia non troppo grassa, o la salvatica più volte da noi lodata. Debbe lor darfi la situazione solaria più tosto, che ombrosa, e s' innaffiano con abbondanza, posson cavarfi ogni anno da terra, massime in certi climi umidi, e freddi, ove mostri l' esperienza, che i bulbi s' imputridiscano; ma più comunemente giova il lasciarli in terra, e cavarveli ogni tre anni. Resta, a notare, che la Giunchiglia verde, come pianta molto gentile, teme il gran caldo, e il freddo, ed in tali tempi vopo è ripararnela con un mucchio di terra, che vi si sovraponga.

Finalmente del Narcisso Indiano sferico dice il P. Ferrar, il qual lo vidde in Roma, che ama la coltura medesima de' Gigli Narcissi Indiani già prescritta, ma sopra tutto dee guardarsi dal soverchio umido; perchè il caldo, di cui gode, non si spenga, o raffreddi. Se mai decider si dovesse, qual sia il più bel fiore da Dio creato, cred' io, che questo incomparabil Narcisso troverebbe per sé non pochi partigiani, che gli darebbero sopra tutti la pre-

la preferenza, la qual par, che meriti per la finezza del color chermisi, per la vaga forma del fiore, simile a' Gigli Martagoni, per la moltitudine di tanti fiori, più di trenta, e quaranta con steli, lunghi un palmo, grossi un dito mignolo, tinti dello stesso bel colore, e situati tutt' insieme, come tanti raggi, che formano una sfera, o globo del diametro di due palmi, sostenuti da un tronco sì bello, alto, e grosso, e proporzionato. Ci fiam dimenticati, di delineare sulla cima del tronco la nobil chioma, che porta, di certi grossi, e luaghi capellamenti pur chermisini, i quali nascon da tutto il capo del tronco fra gli interstizj di un gambo, e l' altro, onde nascono i fiori, e giù rovesciati pendono come tanti sanguigni Serpentelli, qual fingesi 'l capo di Medusa; nè vi manca il decoro delle foglie della pianta già sopra descritta, e sol par, che gli manchi la dote dell' odore, il qual non trovo notato. Sta fiorito per tutto il mese di Settembre, mentre i fiori van sbucciando di mano in mano, e dopo averli tutti compiuti, va poi successivamente sfiorendo: sotto il Ciel Romano non compieva perfettamente il suo seme; senza dubbio, perchè prevenivalo il freddo del clima, e n' impediva la maturazione; ma in clima più temperato, come 'l nostro, potrebbe moltiplicarsi come merita, per via di semenza, oltre all' ordinaria via de' nuovi bulbi, che produce.

Narcissus Indicus Serpentarius V. Hemanthus.

Narcisso-Leucojum V. Leucojum bulbosum.

*Nasturtium Indicum, seu Acriscola,
vel Cardamindum Tab. 43.*

Nasturzio, Nasturcio Indiano, o Cardamindo. Fran. Capicine. Spagn. Nastuerco de las Indas. Ingl. Indianans Kressl. Germ. Capucinen, Indianische Kresse.

Fig. 1 Indiano massimo di color sulfureo; ed altro giallo, che trabocca nel rosso, con un terzo variegato
 2 Doppio del color medesimo, e son quattro, i doppi, o gialli, ed aurei, o misti ancor di rosso.

3 Minore di color erbaceo, e vi è il solferino, e giallo.

Son odorosi, ma non è molto accetto il lor odore; ricrean l'occhio colla vivezza del colorito, ed hanno il sapor medesimo del Nasturzio volgare, e posson mescolarsi nelle inalate. Serve questa pianta a vestir piccole spalliere, dacchè si aggrappa, ed inarpica, e col suo verde, e colla moltitudine de' fiori, e lor bellezza fa vaga comparsa per tutta l'Estate fino all'Autunno. Vi si zappa intorno la terra, e vi s'ingrassa, e tengonsi abbondantemente adacquati: propagansi con ramucelli, piantati in buona terra nell'Autunno (nè vi è altro mezzo per i doppi, che non semenziscono) e vengon ancor facilmente dalla semenza, seminata nel mese di Marzo a grano, a grano, sei dita l'un dall'altro lontani.

Nerium Indicum, seu Oleander, vel Laurus Rosea.

Tab. 43.

Oleandro, Rosalauro. Franz. Laurier rose, Oleandre. Spagn. Adelphé, Eleandro. Ingl. Rose-tree, Oleander. Germ. Oleander, Unholden=Kraut, Rosen=Blumen.

Fig. 4. Di fiore incarnato odoroso colle foglie della pianta variegata di bianchiccio: v'è il rosso, il bianco, e'l carneo sbiancato di gratissimo odore.

5. Doppio à forma, e a color di rosa odoroso.

6. Alpino, perchè nasce nelle Alpi, incarnato, e di grato odore: altri due ve ne sono del Malabar di gioconda fragranza, uno di fioretti biancheggianti con mistura di verde, a grandezza di un uña, ed un altro

altro colle foglie della pianta, simili a quelle del Melarancio, rugose. Tre Americani sono Alborei; uno, poco più alto del nostrano, è di foglia ottusa, e fior giallo, assai odoroso, molto stimato per la rarità del colore; il secondo cresce assai più alto con foglie grandissime, ottuse, e fiore incarnato, ed ha il consimile di un elegantissimo color di Lacca, i quali spirano odor di Gelsomino: il terzo altissimo con foglie anguste, e fior bianco odoratissimo.

Crescono prosperi in terra fort' e sostanziosa, ed in sito umido, e fresco, mentre qui nel nostro Regno li vediam sempre nascere spontaneamente ne' letti abbandonati de' fiumi: possono propagarsi col seme, ma per ordinario sene piantano i rami giovani nell'Autunno, o principio dell'Inverno, o più sicuramente sene fan Margotte nel mese di Luglio, nella maniera medesima, come si è detto de' Garofani, e se il ramo è restio a piegarsi, squarciasi alquanto dal tronco, senza totalmente staccarlo; e quando s'abbiano polloni nati dalla radice, con tutta la radice staccassì, e si piantan con maggior sicurezza; ma in qualunque maniera si piantino, devon tenersi in luogo fresco, e copiosamente innaffiati: pigliano nuova lena, mutando loro la terra, se sieno in vasi grandi, ed ingrassandola, e zappandola, se sieno in terreno, dov'è proprio, che stien, ove il gelo del clima non sia gagliardo. Fioriscono nell'Estate, e 'l doppio nell'Autunno; ed è forse la pianta più propria, per formar spalliera in un giardino destinato a fiori, concorrendo anch'essi per adornarlo non solo col lor perpetuo verde, ma pur colla gran copia de' fiori, di cui fan vaga pompa.

*Noctuosens V. Geranium**Oleander V. Nerjum**Orchis, Satyrium Tab. 44.*

Orchide, Satirione, Testicoli di Cane. Franz. Satyrion, Covillon. Spagn. Coyon. Ingl. The Lezard flav-ver. Germ. Knaben--Wurtz.

Fig. 1. Orchide maggiore, che suol nascere ne' spineti, i di cui fiori di color purpureo, e puntati la Figura di un Uomo rappresentano, e vi è la compagna, i dicui fiori una donna esprimono.

2. Altra maggiore detta Ginosorchide, di foglia larga, e fior rosso, puntato, di figura simile alla precedente.

3 Ginosorchide maggiore, di fior pallido, e purpureo, di simil foglia, e figura.

4 Palmata, detta pure Palma Christi, o Satirione, che nasce ne' prati, macchiata di purpureo scuro nelle foglie, di fior rosso carico.

5 Palmata, di foglia stretta, odoratissima, di colore incarnato: più altre son di gratissimo odore, come la Montana purpurea, l'oscura purpurea, la bianca minore, la Massima col fior rossetto: la minore con le foglie anguste, altra purpurea, che tira al nero, il Satirione, e due altre, che odorano di fior di Sambuco.

6 Orchide di color parte giallo, e parte ferrugineo, ne' di cui fiori vedesi effigiato un Fuco, o più tosto un uccellino: Sicil. Apuzza, e Cardiddu.

7 Orchide de' Spineti rappresentante un Ape, o altro simile Insetto, o Pulcino.

8 Orchide, detta Testicolo di Morione per la Forma del bulbo, qual suol essere ancora nelle altre Orchidi, di fior bianco con mistura di verde, e d'incarnato.

9. Mo-

9. Morione femina, i di cui fiori incarnati, par, che rappresentino una donna.

10. Cretica massima, i di cui fiori a color di Rosa, vergati di verde nel dorso; son simili ad un Aquila con scudo in petto; ovvero (come descriveli il Turnefort, che li vidde in Crèta, e gli ammirò,) han certa forma di Piccione con un cartoccio sulla pancia, e la foglia inferiore è a maniera di un Pallio Vescovile.

Son tante, e si varie le specie delle Orchidi, e Sattirioni, che i Botanici non fanno numerale: le poche da noi qui annoverate hanno ciascuna le sue consimili di molti differenti colori. Nel nostro Regno ne ho vedute molte per la Campagna incolta, e quasi tutte le qui delineate son belline a vedersi, ma sopra tutto meritano l'onor della coltura per le stupende figure, e vive somiglianze, in cui veggonsi effigiati i lor fioretti, in Api, Fuchi, Mosche, Ragni, Pargaglioni, Uccellini, Galline, Gusi, Pulcini, Piccioni, Lucertole, Scimie, Tartarughe, Rannocchie, in uomini, e donne, in manine, ed in altre varie sembianze, tanto sorprendenti, che taluno vi è andato sopra filosofando, per indagarne la causa fisica, e con errore, intollerabile in questo Secolo più illuminato, ne ha derivata l'origine da tutt' altro seme, che dal proprio della pianta, in terra sparso.

Propagansi col seme lor sottilissimo, come polveri, seminato nell'Autunno superficialmente, e tenuto umido, ed in luogo fresco, e remoto dal Sole; ovvero con piantarne i tuberì in sito umido, e ombroso, in terra forte, e sostanziosa, o in terra selvatica nello stesso Autunno; ma se amano l'umido, patiscono pure quando sia eccessivo, nè altra coltura richieggono, che di mutar loro la terra, o il sito, quando passati alcuni anni cavansi da terra i tuberì, per isgravarli della molta prole. Fioriscono di Maggio, e Giugno, e ve ne son pure Autunnali.

Orni-

Ornithogalum Tab. 44.

Ornitogalo, Giacinto Stellare, o del Perù, Erioforo. Franz. Charles. Ingl. Star of Bethlehem. Germ. Feld-Zwiebel.

Fig. 11. Volgare bianco, e nella parte deretana del fiore in ogni foglia ha una striscia verde contornata di bianco, come sogliono averla quasi tutti gli Ornitogali, e vi è il giallo minore.

12. Spicato massimo bianco, il qual fa una spiga di un palmo con moltissimi fiori. Di non minor bellezza è un altro d'odor soave, ed aromatico, di foglie simili a quelle de' Narcissi, detto da alcuni Giacinto del Pater noster, o lagrime della Madonna, per un globetto verde oscuro, che forge nel centro del fiore, nominato da' Turchi Giacinto d' Arabia.

13. Spicato maggiore Pannonico, ed altro Napolitano, i di cui fioretti al di fuori son di color cinericcio: aggiunganfi l' Umbellato maggiore con la foglia stretta, l' Indiano del Capo di buona speranza, lo spicato massimo con la foglia angusta, il giallo d' Alcmaer, Città d' Olanda, con gran fiore, e l' Africano di fior verde, uno nell' altro.

Agli Ornitogali aggregano i Botanici alcune altre specie, che gli son molto congeneri; cioè i Giacinti Stellari, alcuni de' quali abbiain noi rapportato fra i Giacinti, ma son di molte specie, altri fioriscono nella Primavera, altri nell' Està, ed altri nell' Autunno, e son di colore per lo più cerulei, violacei, purpurei, e qualch' uno bianco: cinque altre specie son chiamate Giacinti di Portogallo, o del Perù, ed oltre il Ceruleo, e bianco, v'è il color di carne, il violetto, e il bianco, che rosfuggia, due de' quali abbiaino delineati fuor d'ordine nella Tav. 64. sotto il titolo *Hyacinthus Peruanus*.

Aggregano in secondo luogo i due Eriofori venuti

ti dalle Indie: i quali producono una spiga sferica, o più tosto conica, che poi ergesi in Piramide, tempestata di fiori stellati, o bianchi di latte, o pavonazzi, o pallidi, o incarnati.

Finalmente vi aggregano la Scilla, detta da Franzesi Oygnon marin, cioè Cipolla marina, perchè nasce nelle sabbie delle marine di Spagna, e Portogallo, siccome ancora nel nostro Regno; il cui fiore non è guari diverso dall'Ornitogalo spicato massimo della fig. 12. E di tre forti, a riguardo non tanto del fiore, quanto della diversità, che hanno le Cipolle: cioè una di bulbo bianco, nominata Maschio di Spagna, o Cipolla marina, un'altra di bulbo rosso, nominata Femina, e la terza di bulbo bianco, e dolce, e buona a mangiarsi, la qual da taluno vien chiamata Scilla vera, e legittima.

Godon gli Ornitogali del Sole, e di terra da erbaggio, o Salvatica; ma la Scilla ama di più le aride arene: gli Eriofori al contrario la passano meglio lontani dal Sole a prospecto di Tramontana in terren forte, non molto grasso. Possono propagarsi col seme, ma bisogna aspettare per alcuni anni, finchè cresca il bulbo, per poter dare il fiore: moltiplicansi facilmente, con levar loro dopo tre anni la prole de' bulbi, che producono, ciò che si fa in principio d'Autunno, quando veggansi secche le foglie, le quali in questo genere soglion nascere dopo compiuto il fiore nel mese di Maggio, e di Giugno.

Peonia, Pœonium Tab. 45.

Peonia. Franz. Pivoine. Pivoine, Penoesne Spagn. Rosa albandiera, Rosa del monte. Ingl. Pœonie, Peanie. Germ. Paonien = Rosen, oder Fingst = Rosen.

Tom. II.

R

Fig.

Fig. 1. Peonia maggiore doppia, lineata di bianco, ed incarnato.

2. Minore semplice incarnata.

3. Maggiore doppia di color rosso carico, e vivacissimo.

4. Incarnata doppia.

5. Bizantina minore, semplice incarnata.

Deve aggiugnersi la sesta, ch'è bianca doppia colla sua semplice.

Le Peonie contenderebbono del primato con i più nobili fiori, se alla grandezza, e bellezza loro, si accoppiasse un odor grato, ed una maggior durata, la qual è di pochi giorni. Per averle buone, e potersene conservar le radici, mettanli in piena terra, e non in vasi, seppur non sieno grandi, ed in terra grassa, e sito ombroso, ed umido. Senè cavan le radici dopo tre anni, per dividerle nel fine di Novembre, tagliandole in più parti, ciascuna delle quali abbia due, o tre occhi, e se qualche nodo se ne rompa, può ancor questo dare il suo fiore, quando s'ia cresciuto. Piantansi in maniera, che l'occhio ne resti sotterra tre dita, e lontane una dall'altra un buon braccio, in terra morbida, e immediatamente s'innaffia, acciocchè la terra se le unisca. Fioriscono nel Maggio, ed alla fine di Luglio le semplici rendono maturo il seme, il qual non maturan mai le doppie, ancorchè fornite di Ricettacolo, con dentro i suoi embrioni; perchè mancan loro gli Apici, e le polveri seminali; ma par che potrebbero ben compiere la semenza, applicando loro le polveri delle scempie; ciò che io avrei voluto provare, e non ne ho avuta mai l'opportunità, per farne sortir qualche pianta doppia. Semidoppia non ne ho mai veduta alcuna, nè gli Autori, che ho letto, ne fan menzione, ma forse vi saranno, e dal seme, e polveri di queste potran cavarli coll'

coll' arte solita le doppie, e semidoppie di varj colori, e di nuove sembianze; o altrimenti in mancanza delle semidoppie, non resta altro, che applicar le polveri delle scempie alle doppie, per costringerle a semenzire, oppure dar le polveri di una scempia all'altra, e faziarnela. Sogliono nascere spontaneamente nelle alte montagne, e ne son molte nel nostro Regno, ancor doppie, seppure non m'ingannò un Erbuario, che me lo assicurava, come m'ingannò, vendendomi le radici per doppie, ed eran semplici.

Papaver Porcinus V. Cyclamen
Papaver Tab. 46.

Papavero. Franz. Pavot. Spagn. Dormidera, Cascall. Ingl. Chesboule Poppy. Germ. Magsaamen = Mohn.

Fig. 1. Papavero maggiore cristato, e doppio, a color di rosa.

2. Ortense doppio, bianco, con orlo rosso.

3. Cristato doppio bianco, orlato, e vergato di purpureo.

4. Erratico maggiore doppio chermisino con orlo bianco.

5. Erratico semidoppio listato di bianco, e rosso.

I Papaveri son di grande ornamento al giardino, disposti con ordine intorno à viali, e se non fosser puzzolenti, e di breve durata, sarebbono da preferirsi à Ranuncoli, e ad altri nobili fiori per la magnifica lor grandezza, e straordinaria bellezza, e mirabile varietà di forme, di colori, e di capricci: i colori aggiransi principalmente tra il bianco, e rosso di tutt' i gradi, ma v'è il Pavonazzo, e qualche altro colore, atro, ed oscuro: turchino non ne ho mai vedato, nè lo trovo nominato da' Fioristi: trovo bensì il Pirenaico semplice giallo, che per l'insolito suo colore viene ammesso nè giardini,

dini, e con l'applicazione delle polveri femminali può sperarsi, di ridurlo a doppio, e a misto di giallo con qualche altro colore. Una sola specie vene ha, dotata di gratissimo odore, ed è l'Alpino con foglie di Coriandro, il qual nasce ne monti alpestri, e pur conservasi per qualche anno nel colto de' giardini, ma ne climi freddi lo colpisce il gelo, se non si ritiri al coperto nell'Inverno. Fioriscono nel Maggio, Giugno, e Luglio, secondo il tempo più, o men tardi, quando furono feminati o nel Settembre, ed Ottobre i primaticci, o nel Febrajo, e Marzo i tardivi, avvertendo di seminarli radi, o di allargarli già nati, quando sien tanto stretti, che non abbian luogo competente, per alimentarsi.

Parthenium V. Matricaria.

Periclymenum, vel Matrisylvia, Caprifolium Tab. 47.

Vincibosco, Legabosco, Madreselva, Caprifoglio. Franz. Cheure feville. Spag. Madreselva. Ingl. Woad bind. Germ. Specklilgen, oder Geißblat.

Fig. 1 Perfogliato bianco, con tintura di porpureo, o giallognolo; ed un altro vene ha non Perfogliato, tutto candido co' soli Apici gialligni.

2 Ortese di fior rosso, e di forma gentilissima.

3 Altro di fiori rossi a maniera di trombe.

4 Frutto coccineo della stessa pianta.

Il Clarici ne apporta dieci specie, e benchè non sieno altro, che piante salvatiche di bosco, e di siepe, ove nascono volentieri, pur meritano l'onor del giardino, per farne spalliere, o gabinetti, e coprirne viali; e però hanno bisogno d'appoggio, per salire in alto; nè solamente son di ornamento col verde delle lor foglie, ma colla vaghezza de' fiori, de' quali si caricano in molto numero, ed anche poi col bel rosso delle lo-

ro frutta, nè manca ai fiori il suo grato odore. Quello venuto dall' America Settentrionale, è senza odore, ma è sempre verde, e sempre florido, e sarà forse questo, qui della Fig. 3. per lo qual motivo par che meriti sopra gli altri la preferenza. Vi è il Chinesè variegato, di fior grande sanguigno, ma non cresce molto. L' Indiano Malabarico non ha il fior molto bello, ma stimasi per la rarità del color giallo, e per lo grato odore, che spirano le foglie della pianta, stropicciate con le dita: malagevolmente alberga in terra, amando di nascere sulle cortecce degli alberi, e per averlo, dee sù quelle spargersi la semenza, e servirà per fare agli alberi ornamento. Fioriscono nell' Està, ed il seme n'è maturo sulla fine di Agosto, da seminarli nella fine dell' Autunno, o nel principio dell' Inverno. E facile altresì moltiplicarli con piegarne i rami sotterra in forma di Margotta, o se ne trasportano dalle siepi, e da' boschi le piante tenerelle con tutta la radice: si è notato, che trapiantati nel colto, non conservan tutto quell' odore, che spirano nelle boscaglie.

Phaseolus Indicus Tab. 47.

Fagiolo Indiano, Brasiliano, o Turchesco. Franz. Fevrolle. Feves de mer, Feves peintes. Ingl. French. Ridney beans. Germ. Fасcolen, oder Wische Bohnen.

Fig. 5. Di fior vermiglio con qualche mistura di bianco.

6. Americano detto pure *Caracalla*, Caracolo, o Caracò, di color turchino, e bianchiccio.

Queste due spezie di Fagioli ammettonsi nel giardino per la bellezza del fiore, e per l'ornato della verdura. L' una, e l'altra caricasi di molti fiori, ma il fior della prima, che avanza quel della seconda nella vivezza del colore, e forse anche nella molteplicità de' fiori non

non ha quel grato odore, ch' esala il fior del Caracò, il qual vince pure il primo nella capricciosa forma, che ha, per la rara foggia di sua struttura intorcigliata a Lumaca. Entrambe son piante perenni, che duran per più anni, e servono per spalliere; ma la prima non sale tant' alto sull' appoggio, di cui han bisogno, quanto il Caracò, di cui se ne possono formare gabinetti, e pergolati ben alti, e spaziosi. Il primo Fagiuolo fiorisce in Luglio, ed Agosto, e l' altro nell' Autunno: propagansi col seme, macerato per due, o tre giorni nell' acqua con un poco di nitro, e seminato nel mese di Marzo; o facilmente ancora con piantarne i ramicelli più verdi, e sinceri, secondo la maniera prescritta nel piantar di ramo, e sene hanno i fiori quell' anno medesimo. Voglion terreno grasso, e leggero, e l' esposizione calda del mezzodì, ed il primo debb' essere abbondantemente innaffiato, ma il Caracò si lascia a secco per tutto l' Inverno, perchè la sua radice, essendo da se molto succosa, potrebbe putrefarsi; anzi si è fatta prova, che tenuta fuor di terra per tutta l' Invernata, rinverdisce poi piantata in Primavera.

Primula Veris Tab. 48.

- Primavera. Franz. Primèvere. Ingl. Primtoosen.
 Germ. Schlussetblum, Oder St. Peters Schlusset.
 1. Fig. 1. Ortense di larga foglia, e fior rosso.
 2. Constantinopolitana maggiore, doppia con un fiore sopra dell' altro, uno verde, e l' altro rosso.
 3. Gialletta, chiamata pure Verbascolo salvatico.
 4. Prolifera, doppia con un fiore rosso dentro dell' altro.
 5. Constantinopolitana, prolifera doppia di color giallo, misto con rosso.
 6. Alpina di color purpureo.

Se ne sono aggiunte altre cinque di varj colori, di varia forma, e grandezza, per avere un saggio della loro mirabile varietà di ogni sorta di colori, per la qual, è per la loro gentilezza, ed alcune spezie ancor per l'odore, vengono assai stimate, e se non sono il miglior onore di Primavera, ne sono il primo, per esser le prime a fiorire, onde tratto hanno il lor nome. Amano sito umido, e fresco, e bisogna tenerle adacquate nell'Està, se non si vuol, che periscano. Propagansi col seme, e con le radici, che son perenni, e si dividono; il seme può seminarli tosto che sarà maturo sulla fine di Giugno, o poscia in Settembre, purchè almeno sino alla nascita si tenga in luogo fresco, e coperto dal Sole, quindi rinfrescata già la stagione, e competentemente cresciute le piccole piante, si trapiantano a filo, per formarne cordoni tutt'intorno a' viali del giardino, ed al suo tempo avrassi il piacere, di goder una bell'e fiorita Primavera,

Populago, V. Caltha, Palustris

Parmica Tabl. 48.

Parmica, Olivella, Perpetuino, Perpetuella. Franz. Herbe à eternuer. Ingl. Sneese Wort. Germ. Weisser-Rheinarn, oder Wilder Pettram.

Fig. 7. Di fior doppio, bianco prima, e poi cangiati in color ceruleo, che trabocca nel purpureo.

8 Volgare semplice di fioretti bianchi con gialla corona intorno al centro.

I fioretti di questa pianta, oltrechè son bellini, hanno la dote di mantenersi per più anni incorrotti collo stesso nativo, e grato lor colore, quando tengansi ben conservati. La medesima pianta tien qualche virtù di muovere a starnuto, ed è in uso pure di mescolarla nell'Insalata, di cui modera la frigidità. Multipli-

tiplicasi col seme nell'Autunno, o anche seminato nella Primavera; va coltivata, come tutte le altr' erbe d'ortaggio, e fiorisce nell' Està fino a mezzo Autunno. Per la Ptarmica Austriaca veggasi il Seranemo.

Pulsatilla Tab. 49.

Pulsatilla. Franz. *Passe fleur*, *Coque lourde*. Spagn. *Amopollas de flor*. Chiquita. Ingl. *Pasque Flour*, *Purple passe flower*. Germ. *Schottblum*, oder *Oster-Blum*.

Fig. 1. Di fior doppio con due ordini di foglie a color di Lacca, carico nell' ordine inferiore, e scarico nel superiore con qualche tratto di color celeste.

2. Bianca semplice, ma di dietro bianca, e rossa, ed avvi la Pirenaica bianca doppia.

3. Erbacea di colore, con girello rosso intorno alle foglie.

4. Purpurea.

5. Rossa con stella verde nel mezzo.

La *Pulsatilla* è stimata una *Spezie* di *Anemone* da' Botanici, e par, che debba egualmente stimarsi, quanto l'*Anemone*, da' Fioristi per la sua bellezza, e varietà di capricci, massime nel colore di ogni sorte, bianco, rosso, giallo, verde, turchino, paonazzo, e di molti altri colori, e chiari, e scuri, e misti. Fioriscono quasi tutte con gli *Anemoni* nella Primavera, fuorchè una in Ottobre, detta per ciò Autunnale. Nascono spontaneamente sù i monti alpestri, ed una bianca è sì salvatica, che sdegnar il colto de' giardini. Amano stare in luogo solatio, ed in terren sostanzioso, sabbioso, ed asciutto. Propagansi con la division delle radici, e col seme come gli *Anemoni*, de' quali sieguono l'indole, e la coltura, eccetto che le radiche non si cavan da terra, e bisogna adacquarele nell'Està.

Qua-

Quamoclit, *V. Convolvulus*.*Ranunculus* Tab. 49. 50. 51.

Ranuncolo. Franz. Renoncule, Bassinet, Grenoville. Spagn. Hierva belida. Ingl. Grovvoort. Germ. Hahnen-Fus, oder BrannKraut.

Fig. 6. Ranuncolo acquatico, giallo semplice, e vi è il bianco, ed il doppio giallo, vernicato, e lustro.

7. Silvestre giallo, e vi è il rosso, e 'l bianco.

8. Eretto giallo, e doppio, e vi è il bianco doppio.

9. Maggiore doppio giallo con le foglie della pianta simili a quelle dell' Orecchia d' Orfo.

10. Doppio del sudetto silvestre rosso, soprannominato Anemone silvestre.

11. Asiatico semplice, gialligno dalla faccia superiore e screziato di rosso dalla inferiore; ed Asiatici detti sono comunemente i seguenti.

Tab. 50.

Fig. 1. Cangiante, giallo dalla parte superiore, e dalla inferiore rosso nericcio, che volge al turchino.

2. Cerchiato di tre zone, altrove descritto; cioè con un cerchio intorno alla periferia di vivo rosso, poi con altro cerchio concentrico di bianco latte, e poi nel mezzo con cerchio verde.

3. Stampato di rosso sopra campo bianco,

4. Massimo globoso, rosso carico, il quale qui chiamiamo per Antonomasia Ranuncolo, per esser certamente di specie diversa dagli altri Ranuncoli, che qui chiamiam Roselle. Di questa specie ne ho avuto un altro vergato di giallo, e rosso, assai bello, e raro.

5. Giallone massimo della specie medesima dell'anzidetto, a color d'oro finissimo, e grandemente stimato.

Tem. II.

S

6. Massi-

6. Massimo globoso della specie medesima con foglie strette, ed impuntite, tratteggiato di giallo, e rosso, molto vago, e raro, del quale mi par, che n'ebbi un tempo uno simile, listato di bianco, e rosso, ma ben non mene rammento; ven'è un altro più frequente tutto rosso.

Tab. 51.

Fig. 1. Doppio sulfureo, notato di piccole macchie sanguigne sull'estremità delle foglie.

2 Doppio vermiglio ardente.

3 Semidoppio bianco, tratteggiato di rosso.

4. Doppio, tratteggiato di giallo, con fiocco verde nel mezzo.

5 Doppio giallo, tratteggiato d'incarnato, e nel mezzo giallo, e verde.

6 Misto di bianco, e purpureo semidoppio.

7. Cangiante, purpureo nericante da una faccia, e dall'altra cinericio, lineato di purpureo, semidoppio.

8. Doppio con stampa rossa, e girello giallo, e fiocco verde nel mezzo.

9 Doppio bianco con fiammelle rosse nel mezzo della foglia.

10. Simile a Rosa doppia incarnata.

11. Semidoppio bianco con merletto incarnatino.

12 Mostruoso rosso, di due fiori composto.

I tre primi Ranuncoli della Tav. 50 son degli Asiatici, e sono imagini de' nostri, nati dal seme, per dare un saggio delle tante nobili razze, che ci son venute, portentosi, almeno ne' primi anni, ancor per la grandezza. I tre ultimi massimi differiscono dagli Asiatici in molti accidenti, ne' quali convengono i Massimi fra di loro: la radice de' Massimi è più tonda, siccome i granelli, o radicette, che la compongono son rotonde, grosse, e corte; e di quelli

quelli così la radice , come i granelli soglion essere oblungi ; e de' Massimi la radice suol essere più feconda di molte nuove radicette , che non quella degli Asiatici : il fiore ancora del Massimo suol venire primaticcio , e quello degli altri più tardivo , ed ha un poco di lustro ; inoltre ha maggior sodezza , ed ampiezza nelle foglie , ed è globoso , e ferrato , nè fa pompa della magnifica sua grandezza , se non sia esposto a raggi solari , mentre gli altri all'ombra mantengonsi mediocrementemente aperti . La pianta poi de' Massimi tien le foglie macchiate di bianco , meno intaccate , e sparte , che non sogliono averle gli Asiatici ; benchè a dir vero , sene trovano più volte di questi , che appena niente differiscono da quelli ne' predetti , ed in altri minuti accidenti , che sol può discernere un occhio pratico , per differenziarli . Conferma , che sieno di specie differente , il non esserci mai nato dalle semenze un sol Ranuncolo Massimo dopo tanti anni , che seminiamo quelle degli Asiatici . Quindi per poter moltiplicare i Massimi , e mutarli in più nuove specie , abbiám desiderato , e cercato sempre in vano , d'avere i loro scempi , o semidoppi , ma non abbiám saputo , ove trovarli .

Anticamente i Ranuncoli doppi non eran conosciuti , e al tempo del P. Ferrari non ne conosceva egli altri , che quattro , o cinque , da lui descritti , cioè uno Asiatico dal fior rosso doppio , e par , che sia il nostro Massimo rosso , un altro giallo a foglie di Ruta , ed un altro giallo poco differente , e forse sarà stato il Massimo giallo , il quarto era dal fior bianco , di minute foglie composto , e ristretto in globo a guisa di Margàritina . Parla egli poscia di due Ranuncoli , uno chiamato globoso , e Tuberoso l'altro , quali io non ho mai veduti . „ Il Globoso ha la radice , dic'egli , con gran capelliera di barbe , seconda per la molta prole , che le nasce appresso confimigliante capellamento . e riconoscesi da molti germogli .

Ha larghe, e tonde le foglie, fatte a stella, ed intaccate intorno, nervose, e di color verde pallido, del quale anch'è il gambo, sottile, e tenero, nè più alto di un palmo. Il fiore è di color d'oro con foglie raddoppiate, che cresciute alla grandezza dell' Anemone, fanno il fiore raccolto in globo, in sembianza di star sempre sul nascere; fiorisce due volte, all' Aprile, e all' Ottobre. Dopo il fiore spuntano molte guainette, piene di un seme nero, e minuto, al tutto simile a quello, che viene dal fiore, detto Sperone di Cavaliere. Il Tuberoso, che con voce greca da Apuleio è detto Batrachio, ha il Tuber, o radice di un color cenerognolo scuro, scabrosa di forma simile ad un fusajuolo, e grossa, quanto una buona Avellana. Da' Tuberi, che a modo di bozzoli le nascono attorno, sparge in lungo sottili, e pallide barbucce, produce foglie in buon numero, fatte a canti a modo di stella, di color verde chiaro, sparse di macchie di color tanè scuro, da certi nervetti tramezzate, e attraversate, ed attaccate a picciuoli mezzanamente lunghi. Alza il gambo sino a tre palmi, diviso in rami, ciascun de' quali ha in cima il suo fiore di color giallo, assai simile al Ranuncolo, che detto abbiamo, somigliar colle foglie la Ruta, ma non sì grande, e che viene al Maggio . .

Oggidì coll'uso delle semenze la varietà de' Ranuncoli doppi, e semidoppi è cresciuta tanto dentro la stessa spezie, che son venuti meno i speciosi nomi, che lor prima davansi da' Fioristi, per distinguerne la diversità delle razze. La lor bellezza, e gentilezza estrema, accoppiata a sì gran varietà di colori, e forme rare, e capricciose, ha fatto salire i Ranuncoli al primo grado di stima sopra ogn' altro gener di fiori. De' colori vi manca il solo turchino propriamente tale, ma pur mene son venuti dal seme con qualche tintura di turchino scuro, e nericcio: lor manca pure l'odore, ma

ma non a tutti; l'anno frequentemente que' di color giallo carico, e qualche rara volta alcuno di color rosso; per ordinario è un odor tenue, che si fa desiderare, ma si rende ben sensibile, quando son molti insieme; però in alcuni è sì forte, che si fa sentire in lontananza di alcuni passi, ed ha un non so che di simile all'odor della Viola mammola, ma soave forse ancor più di quello.

Con tuttochè nella coltura generale, ho avuta sempre la mira alla coltura particolare di questo nobil gener di fiori, e più volte, ho fatta espressa menzione de' Ranuncoli, pur ora ne ristringo in brieve i più importanti precetti. Propagansi con le radicezze, attaccate per ordinario alla radice madre negli Asiatici; e ne' Massimi, oltre alle attaccate, sene trovano molte, e piccoline lì intorno, staccate, o ancor lontane, le quali per ciò son da cercarsi diligentemente. Per non rompere i granelli, che spesso vi si trovano intrigati, si distaccano dalla madre, quando sono ancor umide, e sflosce, non già quando son secche, che si fan dure, e frangibili.

Molto più propagansi colle semenze, preparate nella maniera insegnata, e sene hanno i fiori anche quell'anno medesimo, quando si seminano nel mese di Settembre, tenendole in luogo fresco, e niente scoperto dal Sole ne climi caldi: la terra per le semenze debb'esser sottile, morbida, ben sostanziosa, e ben crivellata. Ma è da avvertire grandemente, di seminarle rade, e a pel di terra, quanto basti a semplicemente coprirle, altrimenti v'è il pericolo, che non nascano: posson tenerli prima infusi nell'acqua per qualche giorno, e poi sempre dovrà tenerli umida quella tenue superficie di terra, che la ricopre, spruzzandola leggermente d'acqua coll'innaffiatojo, o con la mano, e non mai con impeto, per non isfinoverla, e non s turbare i grani dal suo sito. Nati che saranno, potrà andarli

darli spargendo sopra di loro un pochino di terra , che ne rinforzi il piede , e non gli opprima , con andarli sempre nettando dell' erbetto , che vi cresceranno : allora potrà lor farsi veder il Sole , come a tutti gli altri Ranuncoli , a' quali è contraria l' ombra , ed è propizio il Sole , per una metà del giorno ne' climi caldi , alquanto più ne' temperati , e ne' freddi per tutto il giorno ; ed in questi è da avvertire , che le semenze più facilmente corromponfi col gelo , che le piante provette , come ho provato in Viterbo : e però bisogna tenerle almeno al prospetto meridionale , o anche al coperto la notte ne' paesi più rigidi .

Bisogna lor rinnovare ogni anno la terra , perchè grandemente la sfruttano , e piantarli soli fra di loro , perchè uccidono le altre piante , specialmente gli Anemoni . Riescon bene in terra da erbaggi , mediocrementegrassa , e la troppo grassa è lor nociva ; ma meglio vengono in terra selvatica , conciaa con grasso ben macero , e distrutto ; ed il P. Ferrari soggiugne . „ Non v'ha terreno , che più gli si confaccia , e meglio li nutrisca , di quello , che è fatto di letame d'uomini ben macero , e disfatto , e mantenuto ben umido „ . Convien loro parimente quella terra , altre volte ladata , che i fiumi , le piogge , o il corso dell' acqua negli orti va diponendo nelle rive , e nelle bassure , mescolata con terra forte , e feconda . Lascio di riferir le varie composizioni di terra , che hanno dello squisito , apportate dagli Autori , a meglio promover la riuscita de' Ranuncoli , alcune delle quali potranno leggerfi presso il P. d' Ardenes ; perchè son laboriose , e forse non son più proficue di una buona terra nuova , e riposata , che uno vada a sceglierfi senza tanta pena negli orti . Potrebbe sol farsi ciò , che alcuni praticano , di metter sotto le radici un letto di terra grassa , e ben macera , che non fermenti , e poi poste le radici in terra ordinaria , vi si può ag-
giu-

giugner di sopra la stessa terra grassa. Piantansi con ordine due dita sotterra, il più presto in Settembre, ed il più tardi ne' primi di Novembre, e cinque dita almeno fra se distanti. Amano il freddo, e la ventilazione, ma molto più la neve, e sol devono ritirarsi al coperto in paesi, ove si renda loro nocevole il gelo, per essere troppo rigido, e continuato.

Tengonsi sempre netti dall'erbe straniere, ed almeno due volte lor si smova la terra intorno colla zap-petta, delineata nella fig. 13, Tav. 2, una volta nell' Inverno, ed un'altra poco prima della fioritura: lor si levino le foglie vizzate, ed ingiallite, non già mai le verdi; e se alcuna pianta s'infermi, sene scuopre cautelatamente la radice, ove sta il male, e procurasi di riseccar tutto quel, che vi si trova di putrido. Il maggior male però lo patiscono dagl'insetti, da quali bisogna con molta cura guardarli, specialmente da' Gorgogli, che li sciattano, e fanno intisichire, e dalle Ruche, o verdi, che abitano sulla pianta, o cinericie, che abitano sotterra al piè della pianta, la qual tutta divorano, se non si cerchino diligentemente, e non si uccidano, come già diffusamente sen'è parlato a suo luogo, dove si son dati i segnali, e la maniera, per trovarle sotterra, più delle verdi perniziose a' Ranuncoli.

Adacquansi moderatamente ne' vasi, quando siavi di bisogno, ma in terreno, ove riescon più vigorosi, appena mai ven'è necessità, seppur non tardi per un intero mese a venir la pioggia, massime in tempo della fioritura, quando esigon, d'esser più largamente saziati. Dopo la fioritura, o si leva lor l'acqua del tutto, finchè vadan seccando da se, o più tosto, come io pratico, vo lor somministrando l'umido, finchè si mantengon verdi, e quando poi le foglie si fan quasi tutte gialle, levo mano, a dar loro più acqua, perchè allo-

ra

ra è segno, che la radice non piglia più alimento, per ingrossare. Allora posson anche cavarli di terra; ma sarà meglio, lasciarli seccar del tutto; e se ancor non saran secchi, si lasciano a seccar prima in luogo coperto sì, ma ventilato, e poi strappansi le radici dal tronco. Se verrà pioggia in quel mentre, che si van seccando dentro la terra, v'è pericolo, che comincino a germogliare con danno del nuovo germoglio, che sarà poi costretto a morire; e però costumasi di tenere in tal tempo i vasi tanto inclinati, che venendo la pioggia, sene scorra fuori, e la terra non se ne inzuppi, o altrimenti sarà duopo, di cavarli da terra, subito che sarà spiovuto. Le radiche, se non faranno ben bene asciutte, (e per l'ultima volta potranno anche esporli al Sole), non si conservino nelle scatole, e sarà più sicuro che non sieno per contrarre muffa, se le scatole, o altro, ove tengansi, sieno bucate. Finalmente torno ad avvertir ciò, che altrove ho detto, che queste piante si perdono, massime le novelle, se si caricano di molti fiori; perchè la molta prole spossa, e debilita la radice, ed uopo è di scaricarnele, strappandovi molti de' fiori laterali, per conservarne, e moltiplicarne la razza.

Rapuntium, seu Flos Cardinalis, vel Trachelium

Americanum. Tab. 52.

Rapontio, Cardinalitia, Fior Cardinale, Trachelio Americano. Franz. Cardinale. Germ. Cardinals Blume.

Fig. 1. A color fiammeggiante di porpora, onde ha il nome di Cardinalitia, e nella sua fommità, simile a rostro curvo di uccello, tiene alcune fogliette violacee.

2. Violaceo, o dilutamente ceruleo.

V'è

V'è pure il bianchissimo, ed un altro porporino vagamente ornato di linee bianche.

Fioriscono nel fine di Primavera fino a qualche mese dell' *Eftà* : piantansi ne' vasi in terra arenosa, e sostanziosa, ma non troppo grassa, nè molto umida: propagansi per ordinario colla division delle molte radici, che producono, le quali acciocchè, non diano molta prole, e consumino la pianta, debbon cavarfi ogni anno nel Febrajo, o come altri vogliono, in Agosto, e Settembre, o anche in Aprile, e piantansi altrove, coprendole bene di terra fino al verde delle foglie. Non temono il freddo, come nati, e venuti dalle regioni settentrionali dell'America, ed amano il Sole, dal quale si ritirano alquanto nel tempo, che fioriscono, per goder più lungo tempo de' lor gentilissimi fiori. Son piante assai delicate, e bisogna guardarle dagl'Insetti, che ne fan pasto delicatissimo, e le rovinano. Propagansi anche col seme, messo a terra, eziandio subito che si raccoglie circa Luglio, ed Agosto: ma non si suol seminare per lo copioso multiplico, che ottiensì colle radici, essendosi anche osservato, dice il Clarici, che per la via de' semi non se ne ha variazione migliore; ma io dico, che dovrà seminarfi, ora che sappiamo l'arte, di far fare a' semi la variazione, e sene potranno ottenere i fiori d' altro colore, e semidoppi, e di qualche altra forma più bella, e capricciosa.

Rosa Tab. 52.

Rosa. Franz. Rose. Spagn. Rosas. Ingl. Rosier, Roosé. Germ. Rosen.

Fig. 3. Rosa doppia di Olanda, incarnata, detta Centifoglia per la sua gran doppiezza.

4. Regina delle Rose con due altre rose, che
Tom. II. T nas-

nascon dal cuore, una sopra dell' altra: questa non è spezie particolare, che sempre produca così le Rose, ma è un mostro accidentale, che rare volte succede. Una simile di due sole Rose doppie bellissime, mostruosa pure per lo tempo, cioè nel mese di Febrajo, in cui fu trovata in campagna nella mia Patria, come doppiamente maravigliosa, mi fu mandata in regalo.

5. Italiana, ovvero Rosa d' ogni mese, di color rosso soave, ed un'altra è bianca doppia pallidetta, che dell' incarnato ha una mezza tinta.

6. Gialla.

7. Preneftina variegata di strisce rosse, e bianche: altra vene ha variegata d'atro, e pallido rosso, grand', e doppia, ed altra di rosso pallido, e bianco, ed un'altra elegantemente variegata con foglie di Pimpinella.

8. Damascena, o Zuccherina, di color rosso, la qual suole adoperarsi per gli sciroppi, e conserve.

9. Milefia doppia di un rosso carico, che tira un poco al violetto.

Più altre son le spezie delle Rose rosse di vario grado, scempie, doppie, e differenti ancor negli accidenti della pianta, tra le quali vene son due senza spine, una è di rosso languido, e l'altra di atro rosso; colorita, la qual' è molto minore della prima: quasi tutte godon di un soave odore, chi più, chi meno, ed una sola scempia l'ha cattivo. Vi son anche le bianche, di molte forti, tra le quali una è assai piena di foglie, detta in Sicilia Rosa Alessandrina a cento foglie, di forte, e soave fragranza, e vi son le gialle scempie, e doppie, ma senza odore: una delle gialle è molto bella, di fior grande, pieno, e tutto aperto, ma l'altra porta il fior mezzo chiuso, e conglobato, la qual, perchè si carica di molti fiori, e frondi, spesso avvien, che non li porti a maturità, se non ne venga preventivamente sgravata,

ma

ma i maturati apronfi, e son di bella comparsa, ed io ho provato, che seccate le Rose gialle, hanno il pregio dell'immortalità, non perdendo quasi niente della lor forma, e bellezza. A gran ragione concedesi comunemente alle Rose il primato sopra tutt'i fiori, perchè par, che adunino in se quasi tutte le doti, di cui può andare adorno un fiore; si trova in esse la varietà delle spezie, e son fino a quindici nel nostro Regno per detto del Barone Nicotia; però incluse le scempie, la qual varietà potrebbe assai più aumentarfi, e farne sortire delle nuove coll' applicazione delle polveri seminali di una spezie all'altra, per ritrarne i semi, e seminarli; ed io ne ho avuta sempre l'inclinazione di farlo, ma fin ora non ne ho avuta la comodità: godono poi di un odor soavissimo, di un colore il più gajo; e grato, che possa darfi, di una grandezza competente, e di una forma ben composta. Hanno il solo difetto, che son poco durevoli, e si appassiscono da un giorno all'altro, ma lo compensano colla molteplicità de' fiori, che van successivamente somministrando.

Piantansi in terra forte, umida, e sostanziosa, però le bianche van meglio in terra magra, secca, e forte, o sia nel tofo, e la maggior parte amano stare in luogo solatio, eccettuata la gialla, che più facilmente si sconda, se non sia in sito ombroso, e se non si sgravi, come ho accennato, di molti bottoni di fiori su 'l primo loro spuntare: sito fresco ama la Centofoglia, e la Rosa di color rosso soave, e odor di Cannella. La maggior parte non si potano, ma si leva lor semplicemente il seccume, o al più le cime si mozzano: le Rose incarnate comuni, e qualche altra, che si suol potare, dicefi, che producan più fiori, potate al fine di Giugno, che in altro tempo. Le Rose di ogni mese devon potarsi ogni volta, che han prodott' i fiori, per disporle, a produrne un'altra mano: alcuni sol ne spunta-

no le cime, ma dicesi, che così vive poco la pianta; e per ciò altri, dice il Barone Nicotia, la potano vicino terra ad Ottobre, e cresciuti i rami, di nuovo li tagliano, con lasciar due, o tre occhi per ramo; e per aver più vigore di far fiori nell' Està, e nell' Autunno, vi levano la maggior parte de' bottoni, che produce. Non è però, che realmente rendano il fiore ogni mese, ma dal tempo, quando fioriscono le altre Rose, per tutta quasi l' Està, e poi nell' Autunno dopo le prime piogge, non già per ordinario nel forte Inverno. Amano queste il grasso, e l' acqua, e però van piantate in terreno fresco, ed umido, o debbonfi abbondantemente irrigare, e tutte zappare almanco due volte all' anno. Trascurasi comunemente la lor propagazione dal seme, la quale inculchiamo, che d' ora innanzi si adoperi, per ricavarne le nuove spezie, che si potranno per sicuro avere dalla combinazione de' tre diversi colori, bianco, giallo, e rosso di molti gradi. Sogliono propagarsi col piantoncelli, staccati dalla pianta con tutta la barbicola, o ancora con piantarne i rami novelli dal principio dell' Inverno, sino al principio della Primavera.

Rosa Sinensis, seu Ketmia, Alcea, & Alcea Sinensis, Malva Rosæ, Arborea, Indica. Tab. 53.

Rosa Cinese, Indiana, &c.

Fig. 1. Semidoppia incarnata.

2. Doppia porporina.

3. Semplìce bianca con tintura incarnatina.

Il P. Ferrari, ch' ebbe dall' Asia orientale i semi di questa Rosa, fu il primo, che la feminò in Roma, e quindi fu propagata per ogni parte: n' ebbe i fiori nel terzo anno, da che era stata feminata; benchè suole ancora darlo nel secondo anno. E' un sì bel fiore, specialmente la doppia, che a commendar la bellezza di un
vol-

volto, dicon gl' Indiani, che sia più bello della Rosa Cinese. Ma è dote sua singolare, che l' istesso fiore nell' istesso giorno fa tre vaghe differenti comparse, mutandosi da se solo in tre varj colori, ancorchè reciso dalla pianta: al primo sbucciare è tutto bianco latteo, e d' ora in ora va rosseggiando dal contorno estremo delle foglie, finchè a mezza giornata farà tutto incarnatino, e sino alla sera contratto avrà il color più fino della porpora: così fosse odoroso, e durevole, com' è leggiadro; ma non si conserva vivo più di due, o tre giorni; sebbene la pianta supplisca la caducità de' fiori colla lor moltitudine, che giornalmente va maturando.

Ella è arbutto, che vuol piantarsi in terreno, e non nè vasi; ed in terra fresca d' ortaggio vi cresce quasi ad altezza d' albero, e vi fiorisce prosperamente, massime in clima temperato, come il nostro, e nel freddo bisogna piantarla a prospetto meridionale, riparato da Tramontana, o anche metterla in vaso spazioso, per poterla ritirare al coperto nè gran geli; altrimenti non potrà maturare i fiori, i quali provengono nell' Autunno, ed ove li colga il freddo, non han più vigore da compiersi. Vi si tagliano i rami secchi, e falsi rami, che nascono dal tronco; ma vi si lascino i germogli, che sorgon di sotterra dal piede; i quali avendo messa radice, si staccan dalla madre, e piantansi altrove. Propagasi anche di ramo reciso, e si pone in terra nè primi di Marzo; ma quando si vorrà, potranno averse ne molte piante dal seme, seminato largo in terra grassa nello stesso mese.

Sambucus Roſea Tab. 54.

Sambuco roſeo. Franz. Surau, Roſe de gueldres. Germ. Schneeball.

Fig. 1. Il fiore di queſto arbutto è un gentil corimbo di fioretti bianchi, che formano una palla ben con-

contornata; non ve ne ha d'altra spezie fuor di questa, e sol qualche rara volta, di bianco si è fatto purpureo per mero accidente. Fiorisce nel Maggio, e fa vaga vista carico di molti fiori: ama terreno umido, e ombroso, e però chiamasi anche Sambuco acquatico. Può moltiplicarsi col propaginar le sue verghelle, e con piantarne i rami nell'Autunno, o nella Primavera.

Sanicula V. Aricula Urfs,
Satyrion V. Orchis

Scabiosa Tab. 54.

Scabiosa. Franz. Scabious. Spagn. Scabicusf. In-
 gl. Scabiose. Germ. Apoffemtraut: Grindtraut. Sca-
 biosen.

Fig. 7. Peregrina di color atro purpureo, e di più altri colori.

3. Montana di larga foglia, rossa, e vi è la gialliccia, e la violata.

4. Rossa globosa, detta *Morsus Diaboli*, della quale vi è la cerulea.

Clarici apporta la peregrina Indiana rossa, la incarnata, la variegata di più colori, la peregrina roseggiante odorosa, detta fior della vedova, la minore odorosa assai bella, quella del fior doppio, la cerulea fistulosa con le foglie, e seme di Centaurio maggiore, l'Africana massima arborea, l'arborea con gran fiore di color d'Argento, l'Alpina con gran fiore purpureggiante, l'Africana con foglie lucide, e rigide, e fior biancheggiante, e l'orientale argentea maggiore.

Amano terra leggiera, e sito ombroso, però nella nostra campagna ne nascono in ogni luogo dell'atropurpuree di odor tenue, ma grato: si seminano nell'

Au-

Autunno , e poi si traspuntano in Marzo . Posson anche propagarsi colla division delle radici , e le ultime fei del Clarici hanno a ripararsi dal freddo ne' paesi rigidi : fioriscono nel fine di Primavera, e nell'Està, e compiono il seme nell'Autunno .

Scolymocephalus Africanus Tab. 54.

Scolimocefalo .

Fig. 5. La parte interna del fiore costa di fili bianchissimi , coperti al di fuori da un calice squamoso , costante tal volta di 14. ordini di squame , colorite di rosso finissimo verso l'estremità superiore , il quale va mutandosi in giallo verso la parte inferiore . Oltre la rara bellezza di questo fiore , esso è pieno di un liquore melato , e salubre , che per la copia , e dolcezza viene assorbito avidamente . Vene ha simile , e non men bella un'altra spezie , di foglie lunghe , e sottili .

6. Di squame purpuree , e gialle , che contengono un gran fiocco di fili avrei , e rossi .

7. Di fior giallo , e squame rossegianti con foglie oblunghe , che finiscono a tre punte rosse .

Scolymocephalus Tab. 55.

Fig. 1. Le squame di questo vago fiore , disposte in giro ad ott' ordini , son rabescate a bel disegno di più colori , fosco , rosso , e giallo con gli orli tutt' intorno frangiati di lanugine di seta bianca lucente , come argento : il disco di mezzo contiene Stami , e Stili , a foggia di piume , le quali ergonfi superbamente in più creste , imbellettate d' argento , e porpora , ove chiara , ed ove fosca ; e 'l verde delle foglie , oblunghe sotto al calice , è contornato da un girello purpureo . Vien descritto

to del Weinmanno qual fiore di molta bellezza, sebbene la dipintura de' colori non corrisponda all' idea, che ne dà la descrizione.

2, Di foglia larga, rotonda, crassa, macchiata di nero, ed orlata di rosso, e fior massimo, che spandesi sopra nove ordini di squame in foglie colorate di ammassimo rosso, le quali comprendono un gran disco di fiorelli, Stami, e Stili, ben lunghi di color verdeggiante, e purpurascete, ove chiaro, ed ove oscuro, i quali tutt' insieme intrigati formano un globo, ed uno de' più vaghi fiori da vedersi.

Non so, se la premura de' moderni Botanici abbia trasportate in Europa queste piante, che lo meriterebbono, come molte altre, trasferite dal nuovo Mondo. Nascono spontaneamente nelle vicinanze del Promontorio di Buonasperanza, e son alberi, o arbusti di molte varie spezie, delle quali ne ho esposte qui cinque di fior più bello, e fra lor più differenti, senza fare sfregio ai rimanenti, di bellezza chi uguale, e chi poco inferiore, e degni ancora per lo capriccio, e rarità della lor forma; siccome ancor di molti n'è bella, e capricciosa la stessa pianta. Propagansi molto collo stendersi, che fanno sotterra le radici, e colla produzion de' Stoloni; nè altro sappiamo della lor coltura, che crescon da se in quel clima Africano non lungi dal mare.

Scorzonera Tab. 56.

Scorzonera. Franz. Cercifi d' Espagne. Spagn. Scorfionera. Germ. Schlangen--Mord.

Fig. 1. Scorzonera di Spagna di fior grande, doppio di sua natura, e di grato giallo colorito, tanto che l' ho giudicato degno di aggregarlo fra i fiori, meritevoli di entrar nel giardino. Chiamasi con tal nome per la virtù molto efficace contra le morficature de' Scorzoni, che

che ha il suo fugo. Contentasi di qualunque coltura, e fiorisce nel Giugno, e nell' Autunno: la sua radice è molto buona a mangiarsi giulebbata.

Sedum Tab. 56.

Semprevivo. Franz. Joubarbe. Spagn. Jerva puntera. Germ. Haus--Wurco, Donnerbart.

Fig. 2. Semprevivo montano, bambagiofo, di color rosso, il qual fra gli altri, che costumansi ne' giardini, sembra il più degno, nè ha bisogno di coltura particolare.

Serpentaria Tab. 56.

Serpentaria. Franz. Sidereon, Viperine. Germ. Schlangen--Blat.

Fig. 3. Mirabile montana, la qual porta espressi in ciascuna delle sue quattro foglie, pulite, e splendenti, la figura di un Serpe, e nel mezzo una vaga stella, distinta di bianco, e verde: non pel fiore, ma per la rarità della pianta, merita luogo nel Giardino. Il Rajo dice, che ama luoghi ombrosi, e caldo clima.

Sesamoides Tab. 56.

Fig. 4. Sesamoide, simile al Ciano, di color ceruleo con in mezzo un fiocco violaceo. di sua natura doppio, e bello ancora per lo pulito lavoro delle squame del calice, intersecate con linee rosseggianti: nasce frequente nelle colline sassose di Narbona, e l'ho giudicata meritevole, di star tra i fiori nobili.

Siliqua rotundifolia, sen Arbor Judæ Tab. 56.

Albero di Giuda. Franz. Gainier. Germ. Jüdas Baum.

Fig. 5. Di fiore incarnatino, coperto di una foglia
V rof-

rossi, simile al fior del faggiuolo incarnato, e vene ha un'altra di fior bianco. E' arbofcello, che prima di metter le foglie, cuopresi tutto di questi fiori, bello a vedersi, onde altri chiamanlo, albero d'amore, per la gaja comparsa, che fa nella sua fioritura, e dopo di quella fa buona comparsa colle foglie ben ritondate, e colorite di un gentil verde dalla parte superiore, di bianco nella inferiore, col tronco pure colorito di atropurpureo. Chiamasi anche Siliquastro, o Carrubo salvatico, perchè da suoi fiori produce lunghe filique. Nasce da suoi propri semi spontaneamente, e come salvatico non esige coltura.

Sisyrinchium Tab. 56.

Sisyrinchio. Spagn. Maçucas. Germ. Spanisch-Schmerdtel.

Fig. 6. Viperato del capo di Buonasperanza, nobilmente strisciato di rosso sopra campo bianco nelle foglie superiori, di forma grata, e pittoresca.

7. Africano di color violaceo scarico, assai gentile.

8. Di tre colori, cioè nelle foglie inferiori ceruleo, bianco, e rosso, e bianco nelle superiori.

Tre altre spezie ne annovera il Clarici, il maggiore con macchia gialla, il maggiore con macchia bianca, ed il medio, detto minore dal Clusio, e di quest' altri dice, che sieno di un bell' aspetto, di color ceruleo variegato, e di un odor soave, e fugitivo. Il Lobellio chiama il Sisyrinchio Giacinto poetico di Spagna, per esser quivi frequente il volgare, di cui il bulbo è esculento, e mangiasi con gusto da' fanciulli: fiorisce in Maggio, e Giugno, e gli si dà la coltura medesima, che alle Iridi, delle quali è come una spezie consimile.

Sola-

Solanum Mexicanum, V. *Mirabilis Peruana*.

Spartium, V. *Genista*.

Stramonium, *Stramonium*, *sive Datura* Tab. 57.

Stramonium, *Datura*, e *Noce Metella*. Germ. *Stechapffel*.

Fig. 1. Egiziaca, fetida per le foglie della pianta, di fiore bianco, e gialligno, doppio, e talvolta triplo, che odora di giglio.

2. *Datura Egiziana* di fior triplo, colorito di porpora esternamente, e biancheggiante al di dentro: ne' giardini sene coltiva una terza specie violacea, pur doppia, e v'è la doppia *Malabarica*, ma forse non è stata dal suo paese a noi trasportata. Si semina nel Marzo in buona terra, ed arrivate le piante ad altezza di quattro dita, si trapiantano larghe, ed in sito, ove abbiano l'appoggio di una spalliera, perchè son di troppa elevatura, e di foglie grandi, massime questa seconda. Si adacquano frequentemente, fioriscano dall' Agosto fino all' Ottobre, quando maturano il seme, il qual è facile a disperdersi in terra, e bisogna coglierne le noci, subito che cominciano da se a spaccarsi.

Syringa, *sive Lilac*. Tab. 57.

Syringa Sicil. Alberu di pacenzia. Franz. *Queve de Renard*. Ingl. *Pipetrée*. Germ. *Syrings-Baum*, Spanisch *Flieder*.

Fig. 3. *Cerulea* doppia con qualche tintura di rosso, e vi ha la simile bianca semplice, e doppia.

4. *Persiana* tra purpurea, e *cerulea*. *Clarici*, che non apporta queste due, ma la sola bianca, ne aggiugne una *Malabarica*, che si trova in Olanda nel giardino del Principe d' Oranges, di foglie lunghe, e strette, di un verde fosco, e lucido, nel dritto, e nel rovescio, più chiaro. I fiori vi nascono a due, a tre, o più, uniti insieme,

candidi, e gradi, quanto una rosa, composti, di dieci foglie, che spirano soavissimo odore.

Sono arbusti, o alberi, che aman terra pingue, e sito ombroso, eccettuata la Malabarica, che ama luogo caldo, e solivo, e bisogna guardarla dal freddo ne' paesi rigidi; a tutte però giova l'umidità, la coltura, e grassezza del terreno. Moltiplicansi col seme, e co' germogli, tratti dal pedale con qualche portione della radice, e piantati sulla fine dell'Autunno. Fioriscono le nostrane nel Giugno, e quella del Malabar nel Luglio, ed Agosto, vestendosi tutto l'albero di fiori folti a gran dovizia, soavemente odorosi,

Tagetes, seu Caryophyllus Mexicanus Tab. 58.

Tagete, e Garofano Messicano, Africano, Turchesco, o d'India, Fior di Morto. Franz. Oeillet d'Indie, Fleur de Rome. Germ. Indianisch--Nagelein, oder Studenten--Rose.

Fig. 1. Citrino rosseggiante, pieno.

2. Massimo doppio giallo, ed ha il compagno Massimo Pallido.

3. Medio, e semidoppio, giallo, che trabocca al rosso.

4. Minore doppio con fiocco in mezzo, aureo rosseggiante con girello giallo intorno alle foglie.

5. Semplice, aureo rosseggiante con girello giallo.

6. Maggiore semplice pallido, ed ha il simile citrino, e l'Aureo rosseggiante.

7. Medio doppio con due Macchie d'aureo rosseggiante in ciascuna foglia.

8. Doppio massimo fistuloso, o sia tubulato, aureo.

9. Maggiore fistuloso scempio.

10. Scempio del settimo.

11. Medio, scempio, giallo.

12. Semidoppio giallo con due macchie d'aureo rosseggiante.

13. Au-

13. Aureo rosseggiante, maggiore, e doppio.

Son fiori di gran comparsa, e odorosi, ma l'odore nuoce alla testa: fioriscono i maggiori nell' Autunno sino al principio dell' Inverno, ed i minori da Maggio, e Giugno, per tutta l' Estate: van seminati nel mese di Marzo, e poi trapiantansi larghi in terra macera, e grassa; gli si dà dell' acqua, e del Sole competentemente, e vi si applica qualche appoggio, per que', che crescon alti.

Tamarindus Tab. 59.

Tamarindo. Franz. Tamarin. Ingl. The Tamarind Tree. Germ. Tamarinden-Baum.

Fig. 1. Di fior rosso vivace, ed avvi l' altro di fior bianco, e odoroso, il di cui frutto ha dell' uso presso i Speciali: la forma del fiore è differente dal primo, simile più tosto al fior d' Arancio, di molte foglie, quattro delle quali interiori son sode, e polpose, e quattro esteriori son sottili, e tramezzate elegantemente, da un nero, che si dirama in raggi con quattro fili ritorti, che son le Silique del frutto.

L' uno, e l' altro Tamarindo son alberi grandi dell' Arabia, e delle Indie, e non so, se allignino nella nostra Europa; ma son desiderabili per la bellezza de' fiori, specialmente il primo, di cui dice Weinmanno: *Floris mira, & elegantia, & pulcritudo est*, e per l' utilità del frutto, di grande uso nella medicina, e per la bellezza medesima dell' Albero.

Thlaspi. Tab. 59.

Millefiori, Tlaspidio, Tlaspio. Franz. Moutarde. Spag. Paniqueso de flor blanquo. Ingl. Treacle Mustard. Germ. Bavern-Senff.

Fig. 2. Cretico di fior purpureo: Cretici ne sono altri

altri quattro, il Ceruleo che purpureggia, l'atropurpureo, il bianco maggiore, ed il minore odoroso secondo Clarici, il qual ne apporta due di Portogallo, il purpureo, e l'bianco colle foglie di Gramigna. Ed aggiugne la Rosa di Gerico, ch'è una specie di Tlaspi, la qual coltivasi ne' giardini, ma dall' imagine del fiore non apparisce troppo degna.

3. Fruticoso, che sempre sta verde, e fiorisce, per tutto l' anno, particolarmente l' Inverno, detto Tlaspidio, di odore aromatico.

Fioriscono i primi nell' Està: fanno un bell' ornamento, disposti a cordone in piena terra, o ne' vasi; dacchè la pianta copresi tutta di fiori, e ne forma un bel globo. Propagansi col seme, da feminarsi, subito che sarà compiuto in Settembre, o anche di buon' ora nella Primavera, in qualunque terra; e sito, dondogli acqua a discrezione giusta il bisogno. Il Fruticoso oltre del seme può propagarsi di ramo ne' predetti due tempi, da piantarsi in luogo fresco, e ne' climi assai rigidi bisogna guardarlo dal gelo, al quale alquanto resiste la prima specie.

Trachelium Americanum. V. Rapuntium.

Tragopogon, seu Barbula Hirci. Tab. 59.

Barba di Becco, o Saffica. Franz. Barbe de Bouc. Spagn. Barba de Cabron. Ingl. Goats, o Buches beard. Germ. Bochts-Bart, Dttertraut.

Fig. 4. Purpureo, che ha del ceruleo col cuore un poco giallo.

5. Silvestre, giallo maggiore.

6. Pratense, giallo minore.

Fioriscono in Giugno, e Luglio, e propagansi col seme, contenti di qualsivis coltura. Non li trovo ammessi da altri all' onor del giardino, ma non mi son sembrati dispreggevoli.

Tri-

Trifolium, & *Menyanthes*. Tab. 59.

Trifoglio, Meniante. Franz. Treffle, Triolet. Spagn. Trevol. Ingl. Trefoilie, Germ. Dreyblat, Klee, Kleeblat.

Fig. 7. Pratense rosso, e vi è il Montano bianco.

8. Montano rosso di spiga lunghissima.

Crescono anche, come silvestri, senza coltura. E' da aggiungersi il Trifoglio palustre, detto Meniante; più degno, e lodatissimo; ma l'ho lasciato, perchè il Weinmanno ne sbaglia, o ne lascia l'immagine, ed altra non ne ho avuta, per delinearlo: e però ne rapporto la descrizione, e la coltura, tratta dal P. Ferrari, e dal Clarici. Le foglie della pianta, a tre per ciascun picciolo, son ovate, lisce, e carnose: i fiori son bianchi a simiglianza di Giacinti, con certi candidi, e tenuissimi fili, a guisa de' Cappari, in forma di crespa lanugine, e vi si ammira la più fina maestria della Natura. I fiori son rivoltati in sù, e sorgon quasi da mezzo il gambo, lungo due palmi, e formano una bella spiga di un palmo. Due sono i Menianti, uno di foglia larga nella pianta, e l'altro di foglia stretta: un terzo Americano non è troppo conosciuto ne' nostri paesi. Fioriscono nel principio di Primavera, ed essendo piante acquatiche, come la Ninfea, e la Caltà palustre, amano la medesima coltura. Propagansi col seme, ma per ordinario colla division delle radici nell' Autunno.

Tulipa Tab. 60, 61, 62, 63.

Tulipano. Franz. Tulipe. Spag. Tulipa. Germ. Narcissen-lilie.

Fig. 1. Primaticcio rosso. Sicil. Pavuni, e vi sono anche i gialli, ed i bianchi Primaticci, che fioriscono alcune settimane prima dell' altre razze, che appellansi tardivi, o di mezzano tempo; e questi chiamiam qui
Tuli

Tulipani fini, o di razza, a distinzione de' suddetti d' inferior condizione, perchè meno gentili. I Primitivi hanno pure la distinzione nella Cipolla, la di cui prima spoglia dalla parte interna è fornita di certa bambagia morbida, la qual non trovasi ne' bulbi de' Tardivi.

2. Persiano maggiore, e minore, de' quali non par, che trovissi altra diversità: son vistosi nelle caraffine, con una fiammella di vivo rosso nel mezzo della foglia, e giro bianco. Questi distinguonfi pure dalla cipollina, coperta di nera, e dura spoglia, vellutata di dentro.

3. Tardivo, (e così tutt' i susseguenti) detto Passere Canario, bianco con ramificazione, o rabesco nobilissimo di rosso nericante, nel mezzo della foglia.

4. Mostruoso, variegato di giallo, rosso, e verde. Di tal razza ne ho veduto uno, alquanto più grande, e col verde sì carico, e signoreggiante fra il rosso, e 'l giallo, che sembrava un Papagallo, qual' è 'l suo nome.

5. Odroso, giallo con nervo verdastro nel mezzo della foglia, di due fiori sopra uno stelo, ciò, ch' è raro ne' Tulipani, come ancor l' odore.

6. Prolifero di più Tulipani su d'uno stelo, variegato di bianco, e rosso puniceo.

Tulipa Tab. 61.

Fig. 1. Mostruoso, rosso, con favori gialli, e verdi.

2. Semidoppio, di bianco, giallo e verde vergato.

3. Doppio bianco, vergato intorno di rosso.

4. Vergato di giallo, rosso, e verde.

5. Stellato maggiore, bianco, rosso, e purpureo.

Tulipa Tab. 62.

Fig. 1. Doppio variegato di bianco, e purpureo.

2. Tinto a strisce di bianco, giallo, rosso, e verde.

3. Mag-

3. Maggiore, variegato di bianco, e rosso.
4. Rarissimo, pallido, rosso, e verde.
5. Globoso variegato di rosso, e giallo.
6. Rovesciato, giallo oscuro, e giallo chiaro.
7. Macchiato di rosso oscuro, e strie rosse, e bianche.
8. Verde a strisce, e fascia rossa d'intorno.

Tulipa Tab. 63.

Fig. 1. Macchiato di rosso, con strie gialle, rosse, e verdi.

2. Globoso prolifico, semidoppio, minutamente puntato di rosso con strisce verdegianti, e poi giallo intorno.

3. Tulipifera Virginiana con foglia d' Acero nella pianta: è un albero, che fa fiori, simili a' Tulipani, coloriti nel mezzo delle foglie di un rosso aureo, che va poi a sfumare in giallo.

4. Tulipifera della Virginia con foglia d' Acero, di fiori bianchi con rabesco di rosso chiaro, che forma un angolo a mezza foglia, e poi sotto una linguella di verde, che sfuma in giallo. Vi sarebbe d'aggiugnere il Lauro Tulipifero, ma non ne ho presente l'immagine.

Tanta varietà di Tulipani, e la lor doppiezza è sortita accidentalmente dal seminarne le semenze; ma con l'arte insegnata potremo averne ora in gran numero doppi, semidoppi, e semplici di tutti que' colori, che vorremo. Potrà seminarfi la semenza, subito, che farà compiuta nell' Estate, come vuole il Clusio, e 'l Laurembergio; purchè si metta in sito ombroso, e fresco: il P. Ferrari stima meglio di farlo, dopo cadute le prime piogge di Settembre, e 'l Parkinson sulla fine d'Ottobre. Si seminano in terren grasso, e forte, tenendoli sempre umettati, e quindi si vedran germogliare nel Marzo: i

bulbettini novelli fioriscon poi per ordinario nel quarto, o quinto anno: per le prime producono il fiore di un color crudo, uniforme; ma coll'andar del tempo è facile, che lo cambino in finissimo, e variegato di più tinte, mutando d'anno in anno, e sempre in meglio, le fattezze.

Son fiori di montagna, e se ne trovano nati spontaneamente ne' nostri monti delle Madonie, e però la passano bene assai ne' luoghi montani, e freddi; oveche ne' marittimi, e caldi, come in Palermo, venuti d'altro paese, fioriscono ne' primi anni, e poscia in vece di fiori producono inutili cipolline. Quindi sarà ben fatto, cercar quivi per loro un sito a tramontana. Avverte il P. Ferrari, a non metterli insieme con altri generi, perchè vi patiscono: piantansi due, o tre dita sotterra, e lontani l'uno dall'altro cinque dita. Il soverchio grasso, ed umido della terra, e'l violento caldo del Sole ne può corrompere i bulbi, e'l solo moderato li conserva. E' buona diligenza, di metter sotto del bulbo terra magra, ed arenosa, e sopra aggiugnervi terra un poco grassa; perchè la corona nella base del bulbo, onde nascono le radici, toccando terra grassa, facilmente si guasta.

I Tulipani primaticci, ed i Persianelli producon dal bulbo una lunga radice con in punta il novello bulbettino, il qual talora sen esce fuori dal terreno, e sarà bene di sotterrarlo: ma per lo più la radice se ne varitta sotterra circa un palmo; se si trascura di cavarnela, nell'anno veggente anderà a perdersi ancor più sotto; e però alcuni costumano lor sotto preparare un pavimento di mattoni, per arrestarle, ciò, che condanna il P. Ferrari per la tema, che l'umido non vi ristagni, e corrompa i bulbi: sarà più sicuro, ciò che ho io praticato, che si batta sotto il terreno, tanto che non possa il bulbo penetrar oltre nel sodo.

Cava-

Cavate da terra le cipolle, quando saran secche, o sfosce le foglie; asciughinsi bene all' ombra, e le si lascino attaccate le spoglie, i bulbettini, e le radici, che in tal maniera meglio si conservano; collocate in fuscelle, o scatole bucate, ove l' aria possa permeare, come si è avvertito per altre cipolle, che nel chiuso si corrompono.

Veratrum album V. Helleborus.

Viola Pyramidalis Tab. 54.

Viola Piramidale, o Campanella Piramidale.

Fig. 4. Sorge il fiore in forma di Piramide, molto più alta della qui delineata; costa di moltissimi fiori cerulei, o violacei chiari, i quali vanno aprendosi successivamente per più giorni.

La degna pianta gode dell' ombra più, che del Sole; vuole innaffiarsi con abbondanza, e piantasi in terra forte, e sostanziosa. Propagasi con romperne le radici, che fioriscono poi nell' Autunno; propagasi anche colla semenza, ma pochi sono i fiori, che la compiscono; potrà seminarfene parte nell' Autunno, e parte nella Primavera; perchè dicesi, che rare volte nasce, sebbene non sia raro, a trovarla nata da se, portata quà, e là da' venti per lo giardino; ciò, che indica, che fa vopo seminarla molto superficialmente, con un sol velo di terra, che la cuopra. Il secco tronco tagliasi tutto da piè, senza incomodar niente la radice, la quale a Primavera tornerà a ripullulare.

Viola Martia Tab. 65.

Viola Marzia, o Mammola. Franz. Violette de Mars Spag. Violetta. Ingl. Violet, Germ. Merz-Violen.

Fig. 1. *Purpurea* volgare, vi è la cinericcia, e due bianche, una odorosa, e l'altra nò, con due salvatiche, l'una *Eretta* di color Cilestro, lineata di rosso, l'altra di color violato bianchiccio senz'odore.

2. *Eretta* affine, per qualche similitudine, che ha con la *viola* bianca, con qualche parte incarnata.

3. *Marzia* con tintura incarnata.

4. *Semidoppia*, *purpurea* oscura con fiocchetto incarnato.

5. *Doppia* *purpurea*.

6. *Doppia*, che ha del turchino, ed un fiocco incarnato.

Il *Clarici* ne apporta alcune altre, cioè delle doppie la *purpurea*, la rosseggiante, la candida, la variegata di ceruleo, e bianco, quella del fior massimo, la quale il *Costeo*, ed il *Camerario* asseriscono esser grande, quanto una *Rosa moscata*. Delle semplici ne adduce dieci, la *purpurea* odorosa, la gialla, e la bianca, montane con gran fiore, la gialla montana con foglie tonde, e crenate, la cerulea con gran fiore, la gialla della *Virginia*, l'*Americana* con fior ceruleo, simile alla nostra nel fiore, non già nelle foglie della pianta, la cerulea *Massima* di *Virginia* con foglie di *Cocomero* torfute, e la montana gialla dal fior grande. Aggiugn' egli qui le *Viole Marzie* di tre colori, che son le *Giacee*, delle quali abbiám trattato.

Le viole, comechè piccoli fiori, pure si fan pregiare fra i più riguardevoli per la lor gentilezza, gratissimo odore, ed utilità nella Medicina; moltiplicansi da se, o colla division delle radici; amano terren grasso, umido, e ombroso.

Viola arborefcens V. Leucojum

Viola Matronalis V. Hesperis

Viola tricolor V. Jacea

Virga Aurea Tab. 65.

Verga d'oro. Franz. Virge d' or. Germ. Gulden. Wnd.

Fig. 7. Ornata di molti fioretti a color d'oro, onde trac il nome, con le foglie di *Linaria* nella pianta.

8 Minima, per la piccolezza della pianta rispetto all'altre, che fon alte due, o tre cubiti, ma pur questa è di fior massimo, aureo.

9. Di fiori aurei, disposti ad ombrella, detta *Solidagine Saracenica* per la virtù di consolidar le piaghe.

Clarici ne aggiugne altre, le quali lascio, per non esser delle spezie più degne: fon piante alte, per far buona comparsa nel fine dell' Està, quando fioriscono. Fan bene in terra d'ortaglia con qualunque coltura: propagansi, o col seme nel Marzo, (e bisogna raccorlo, prima che venga dissipato dal vento) o colle radici, divise nello stesso Marzo, o nell' Ottobre.

Umbilicus Veneris V. Cotyledon.

Xeranthemum, seu Ptarmica Austriaca Tab. 65,

Serantemo, o *Ptarmica Austriaca*. Franz. Immortelle: Ingl. Suez Wort. Germ. Stroh-Blume, oder Pappier Blume.

Fig. 10. Di fiori incarnati, tratteggiati di bianco all'esterno, e di dentro biancheggianti, colle foglie inferiori della pianta simili all'*Elicriso*, ma le superiori al Cipresso.

11. Por-

11. Purpureo con circolo verde nel centro.

12. Bianco.

Clarici ne conta qualche altra spezie, uno dal fior maggiore, semplice purpureo, detto Ptarmica Austriaca, frequente nell'Austria, il semplice purpureo minore, il variegato nel capo, ed il semplice dal fior piccolissimo, che dilutamente purpureggia.

Son da stimarsi per la bellezza, e durabilità: non soglion marcire, come l'Elicriso, o sia fior perpetuo: son paghi d'ogni sito, e d'ogni terra da Ortaglia. Si seminano nell'Autunno, e si trapiantano nella Primavera, quando può anche seminarfene il seme, per lo caso, che gl'insetti ne abbiano danneggiate le piante dell'Autunno. Fioriscono nell'Estate fino alla metà dell'Autunno.

Jucca Tab. 63.


Fig. 13. *Jucca* chiamasi in tutte le lingue, e la qui espressa ha il titolo di *Gloriosa*, a differenza delle altre *Jucche Americane*, le quali somministrano il pane a molta parte dell'America, e dell'Etiopia; dacchè le loro radici, espreffone il sugo, ch'è nocevole, tritate, e cotte, fanno una farina, ed un pane, che non ha invidia al nostro di frumento, di cui era priva quella parte di Mondo, preveduta in suo scambio di quest'altro pane, il qual per altro richiede minor fatica nella coltura, e rende il triplo più di quel, che renda il nostro grano; giacchè un pezzo di terreno, che in frumento renda il sufficiente a quattro persone per un anno, l'istesso, piantato di *Jucche*, rende l'alimento bastevole per dodici.

La nostra *Jucca* è da quelle diversissima con foglie di Aloe, e fiori bianchi con poca tintura d'incarnato sull'estremità. L'ho io avuta, ed è pianta che si dilata, e cresce a statura delle *Palme dattilifere*: produce
dalla

dalla cima un gran ramo, pieno di fiori, poco men grandi, che i Gigli. Produce al piede molti figliolini, come l' Aloe, colla separazion de' quali può propagarsi, oppure con staccarne gli occhi, che tiene nella radice, a guisa di canna, ciò, che può farsi nella Primavera, o nell' Autunno, come io una volta praticai. Fiorisce nella Primavera, o alle volte più tardi sino all' Autunno. Piantasi in terreno aprico, forte, e sostanzioso, ma diceasi, che piantata in vasi grandi, cresca, e fiorisca, e si conservi meglio, purchè le sue radici, l' Està specialmente, stieno ben coperte, e stando ne' vasi si tenga in tal tempo riparata dal Sol cocente, e gli si dia poca acqua, della qual non ha bisogno, quando stia in piena terra, come non ne ha bisogno l' Aloe, e come ancor questo, non teme il freddo, eziandio ne' più rigidi paesi.

IL FINE.





INDICE DELLE MATERIE

*Le citazioni sono del Tomo, del Capo, e della Pagina: ove s'è
Cat. vuol dire il Catalogo, che è nella Parte
IV. del Tom. II.*

A

- A** Cacia. Cat. p. 113.
 Acqua putrida piena di piccolissimi animali. T. 2. c. 39. p. 369.
 Acriviola. Cat. p. 12.
 Adacquare. T. 1. c. 3. p. 17. c. 31. p. 357.
 Agrumi inostruosi. T. 2. c. 19. p. 193.
 Ajuole del giardino. T. 2. c. 7. p. 60.
 Albero di Diana. T. 1. c. 40. p. 384. Di Giuda. Cat. p. 153.
 Alcea, Altea. Cat. p. 12.
 Aloe, ivi.
 Alume mirabilmente figurato. T. 1. c. 40. p. 381.
 Amaranto. Cat. p. 13.
 Analogia tra la generazione delle piante, e degli animali. T. 1. c. 5. p. 49. c. 24. p. 225. T. 2. c. 20. p. 212.
 Anemoni. T. 2. c. 15. p. 147. Cat. p. 15.
 Animali, e lor diverse maniere di generare. T. 1. c. 4. p. 30. c. 37. p. 338. c. 40. p. 376.
 Alcuni rifanno le membra troncate, c. 43. p. 411. Nocivi alle piante: e maniera d'im-
 pedirne il danno. T. 2. c. 32. p. 365. c. 33. p. 374.
 Antoliffa. Cat. p. 20.
 Api, la maggior parte son privi di sesso. T. 1. c. 4. p. 32.
 Cavanfa cera dalle lor viscere. c. 7. p. 65. c. 28. p. 258.
 Raccogliono le polveri femminali de' fiori per cibo, e portanle da un fiore all' altro. c. 36. p. 332.
 Apici de' fiori ben cautelati dalla Natura. T. 1. c. 6. p. 61. lor proprio uso, p. 63. c. 7. p. 64. c. 8. p. 72. c. 12. p. 106. c. 14. p. 123. c. 16. p. 137. c. 17. p. 144. c. 3. p. 27.
 Apocimo. Cat. p. 20.
 Aquilegia. Cat. p. 21.
 Arancio di Bizzarria. T. 2. c. 29. p. 196.
 Argemone. T. 2. c. 45. p. 147. Cat. p. 15.
 Aria concorre alla fecondità della terra. T. 2. c. 6. p. 59.
 Catriva nuoce alle piante, c. 2. p. 15.
 Armerio. Cat. p. 22.
 Asfodelo, Asfa Regia. Cat. p. 22.
 Astro, Asteroide. Cat. p. 23.

B.

B Alauſſia . v. Melogranato.
 Balsamina femina . Cat.
 p. 27.
 Barba di Becco . Cat. p. 156.
 Becco di Grù . v. Geranio .
 Bellide . Cat. p. 28.
 Bigonia . v. Gelfomino .
 Boſſo . T. 2. c. 8. p. 69.
 Broccoli . v. Cavoli .

C.

C Aldo , e ſua diſeſa per le
 piante . T. 2. c. 32. p. 361.
 Calendula . Cat. p. 29.
 Calta . i. vi p. 30.
 Campanella . i. vi p. 31.
 Canapa . T. 1. c. 21. p. 183, c.
 25. p. 234.
 Cannacoro , Canna Indiana . Cat.
 p. 32.
 Capriſfico , capriſficazione . T.
 2. c. 30. p. 272. c. 32. p. 283.
 c. 33. p. 306. c. 34. p. 307.
 c. 35. p. 315. T. 2. c. 17. p.
 167.
 Capriſfoglio . v. Periclimeno .
 Catacalla . v. Fagiuolo India-
 no .
 Cardamindo . v. Naſſurzio .
 Cardiaca Africana . v. Ecnuro .
 Carrubo . T. 1. c. 31. p. 24. c.
 30. p. 276. c. 31. p. 284.
 Cayoli . T. 2. c. 11. p. 99.
 Cera . T. 1. c. 7. p. 67.
 Cerro . T. 1. c. 31. p. 287.
 Chermes , ſua generazione . T.
 1. c. 4. p. 34.

Ciano . Cat. p. 66.
 Ciclamine . Cat. p. 68.
 Colchico . T. 1. c. 14. p. 131.
 Cat. p. 61.
 Colori , perchè variano ne' fiori
 di ſemenza . T. 2. c. 9. p. 86.
 c. 12. p. 111. c. 116. c. 22.
 p. 220. c. 13. p. 124. I pri-
 migenj ſon ſolamente tre . T.
 2. c. 13. p. 126. Come poſſan-
 darſi nuovi colori a' fiori . c.
 34. p. 405.

Concime . v. Letame .
 Conſolida reale . Cat. p. 62.
 Convolvolo . i. vi .
 Corona del Sole . Cat. p. 58.
 imperiale p. 108.
 Cotiledone . Cat. p. 64.
 Croco . v. Zafferano .
 Cucubolo . v. Ciclamine .
 D.

D Atura . v. Stramonia .
 Digitale . Cat. p. 73.
 Dittamo . Cat. p. 69.
 E.

E lleborino . Cat. p. 84.
 Elleboro . p. 85.
 Elcriſo p. 81.
 Emanto p. 82.
 Emerocale Valentina p. 121.
 Epatia nobile p. 86.
 Epileſſia , Epilettici , o ſia Lu-
 natichi . T. 2. c. 25. p. 282.
 Erioforo . v. Ornitogalo .
 Ermafroditi animali . C. 1. c.
 4. p. 31.
 Erqdoti . T. 1. c. 30. p. 277.
 Eſa-

Esalazioni terrestri . T. 2. c. 6.
p. 33.

Escrescenze , che nascono sulle piante . T. 1. c. 22. p. 201.
c. 30. p. 271. c. 44. p. 433.

Esperide . Cat. p. 86.

F

Fagiolo indiano . Cat. p. 135.

Fertilità della terra in che consista ? C. 2. c. 5. p. 42. c. 6.
p. 50.

Feto sua formazione . T. 1. c. 39. p. 371. c. 4. p. 376. c. 42.
p. 404.

Ficaja , e fico . T. 1. c. 30. p. 272. c. 32. p. 297.

Fico salvatico . v. Caprifico .

Ficoide . at. p. 71.

Filacciche del fiore . v. Stami .

Fiore è in ogni pianta . T. 1. c.

4. p. 9. Sue parti costitutive . c. 3. p. 25. Sue foglie .

c. 6. p. 56. c. 8. p. 73. Fiori son di tre diversi generi . c. 2. p. 12. c. 3. p. 20. c.

25. p. 133. Fiori maschili . c.

16. p. 137. c. 17. p. 144. c.

17. p. 147. c. 18. p. 157. Perché si numerosi nelle piante ?

c. 17. p. 152. Perché odorosi ? c. 38. p. 358. Maniera ,

per averli , doppi delle semenze . T. 2. c. 10. p. 97. c.

12. p. 108. c. 13. p. 117. E di terza specie mostruosa . c.

27. p. 163. c. 28. p. 175. Per

averli fuor di stagione . c. 34.

p. 390. Per conservarli lungo tempo . p. 387. Per dar loro nuovi colori , ed odori

c. 35. p. 405. 412.

Fior di Passione . v. Granadiglia . Campese . v. Ciano .

Cardinale . Cat. p. 4. p. 144.

Indiano p. 73. Della Trinità . v. Giaceta . Perpetuo . v.

Elicriso .

Foglie del fiore , e della pianta a che servono ? T. 1. c. 6.

p. 56. T. 2. c. 27. p. 310. c.

31. p. 353.

Formento . T. 2. c. 18. p. 178.

Formentone . T. 1. c. 20. p. 175. c. 37. p. 348.

Formiche vanno a' fiori per lo

mele . T. 1. c. 29. p. 261. non

dannegiano i fiori . T. 2. c.

33. p. 374.

Frassinella . v. Dittamo .

Freddo . v. Gelo .

Frittillaria . c. p. 73. Crassa .

v. Apocimo .

Frutti son per la generazione de'

semi . T. 1. c. 6. p. 56. c. 20.

p. 170. c. 24. p. 222. c. 26.

p. 238. c. 37. p. 346. Come

ottengansi buoni , copiosi , e

di nuova razza . T. 2. c. 17. p.

163. c. 18. p. 175. c. 19. B fuor

di stagione c. 34. p. 403.

Fuoco sotterraneo . T. 2. c. 6. p.

54. Feconda la terra . ivi , c.

c. 28. p. 323.

G

G Arofano. T. 2. c. 14. p. 132. Cat. p. 33. Messicano, o Turchesco p. 156.
 Gelo, e suoi ripari per le piante. T. 2. c. 32. p. 361.
 Gelsomino. Cat. p. 94. Indiano p. 76.
 Gemma della pianta, T. 1. c. 41. p. 392.
 Generazione degli animali, e delle piante. T. 1. c. 4. p. 30. c. 37. p. 338.
 Geranio. Cat. p. 77.
 Germe, sua produzione. T. 1. c. 20. p. 179. c. 24. p. 222. c. 26. p. 240. c. 37. p. 338. c. 39. p. 371.
 Giacèa. Cat. p. 92.
 Giacinto. Cat. p. 88. Stellare. v. Ornitogalo.
 Giacobea. Cat. p. 94.
 Giardino de' fiori. T. 2. c. 1. p. 5. c. 7. p. 60. c. 8. p. 68.
 Giglio di varie specie. Cat. p. 103. p. 73. Azzurro. v. Iride.
 Gigliastro. Cat. 103.
 Ginepro. T. 1. c. 25. p. 227.
 Ginestra. Cat. p. 76.
 Girasole. Cat. p. 58.
 Giulianz. v. Esperide.
 Giunchiglia. Cat. p. 120.
 Gladiolo. Cat. p. 80.
 Gorgogli. T. 1. c. 4. p. 33. c. 44. p. 435. T. 2. c. 33. p. 377.
 Granadiglia. T. 1. c. 14. p. 125.

Cat. p. 396

Granchi, e Gamberi. T. 1. c. 43. p. 418. T. 2. c. 25. p. 286.

I

I Nnaffare. v. Adacquare.
 Influsso de' Pianeti sulle piante, e gli animali. T. 2. c. 16. p. 161. c. 25. p. 265.
 Innesso proprio de' fiori. T. 2. c. 12. p. 108. c. 13. p. 121.
 E delle piante c. 26. p. 297.
 Insetti come nascono dentro le frutta? T. 1. c. 13. p. 115.
 Portan le polveri seminali da un fiore all' altro. T. 1. c. 19. p. 155. c. 20. p. 180. c. 21. p. 183. c. 23. p. 208. c. 27. p. 250. c. 28. p. 257. T. 2. c. 11. p. 104. c. 7. p. 65. c. 28. p. 258. c. 29. p. 259.
 Nascon per ciò sopra gli alberi di due sessi. c. 30. p. 271.
 Involuti, lor sistema impugnato. T. 1. c. 38. p. 344. c. 44. p. 427.
 Iride, Irios. Cat. p. 97.
 Jucca. Cat. p. 166.
 L
L Affricato per i viali del giardino. T. 2. c. 8. p. 74.
 Legabosco. v. Vincibosco.
 Lentisco. T. 1. c. 30. p. 276. c. 31. p. 284.
 Leonuro. Cat. p. 99.
 Letame, e letamajo. T. 2. c. 28.

28. p. 318.
 Leucojo bulboso . Cat. p. 100.
 Fruticoso . p. 101.
 Licnide . Cat. p. 114.
 Linaria . Cat. p. 113.
 Loglio nato del frumento . T.
 2. c. 18. p. 178.
 Lumache ermafrodite . T. 1. c.
 4. p. 31.
 Lucerte rifanno l'ascoda tron-
 cata . T. 1. c. 43. p. 412.
 I umbrici rifanno le partimuti,
 late . iv. p. 414. 420.
 Luna . v. Inflato .
 Lupolo . T. 1. c. 25. p. 232.

M

M Adreselva . v. Perielime-
 no .
 Mais . v. Formentone .
 Malva . Cat. p. 115. Rosea . v.
 Rosa Cinese .
 Maraviglia del Perù . Cat. p.
 117. Di Francia . v. Bal-
 minia .
 Margheritina . v. Bellide .
 Margotte . e margottare . T. 2.
 c. 26. p. 294. Cat. p. 46.
 Maschili piante . C. 1. c. 34. p.
 21. c. 23. p. 213. c. 30. p.
 271.
 Matricaria . Cat. p. 117.
 Mele de' fiori . C. 1. c. 7. p. 723.
 c. 28. p. 258.
 Meleagride . v. Fritillaria .
 Melogranato dal fior doppio
 Cat. p. 82.
 Meniante . v. rifoglio C.

Millefiori . Cat. p. 117.
 Minerali ben figurati . C. 1. c.
 40. p. 383.
 Moli . Cat. p. 118.
 Mori . T. 1. c. 24. p. 219.
 Mostri , come si generino ne-
 gli animali . C. 1. c. 43. p.
 421. C. 2. c. 20. p. 212.
 Nelle piante . v. Traligna-
 mento .
 Muscari , Muschio Greco , Cat.
 p. 88.

N

N Arcisso di varie specie .
 Cat. p. 119. Indiano ser-
 pentario . p. 82. Indiano gi-
 gliato . p. 120. v. Leucojo .
 Natturzio Indiano . Cat. 123.
 Natura varia nelle sue opere .
 T. 1. c. 5. p. 49. Industriosas .
 c. 14. p. 123. Liberale , ma
 non prodiga . c. 38. p. 349.
 Neve utile alle piante . C. 2. c.
 32. p. 362.
 Noce metella . v. Stramonia .
 Nodi , ed intermodj nelle pian-
 te , a che servono . C. 1. c. 41.
 p. 377.
 Noctuolens . v. Geranio .
 Nutrizione . C. 1. c. 40. p. 378.
 c. 41. p. 391.

O

O Dore perchè dato a fiori .
 C. 1. c. 38. p. 358. T. 2.
 c. 34. p. 412.
 Oleandro . Cat. p. 124.
 Olivella . v. Psarmica .

Orchide . Cat. p. 126.
Orechia d' Orso . Cat. p. 24.
Organizzazione delle piante, e
degli animali . C. 1. c. 39. p.
364.
Ornicogalo . Cat. p. 128.
Orobanche C. 2. c. 18. p. 184.
Ortica . A. C. c. 21. p. 183.

P

PAlma . C. 1. c. 17. p. 448.
C. 23. p. 207. C. 26. p. 236.
C. 21. p. 187. C. 26. p. 235.
C. 27. p. 243. C. 30. p. 278.
C. 34. p. 307.

Pancrazio marino . Cat. p. 121.
Panporcino . v. Ciclamine .
Pantofola della Madonna . v.
Elleborino .

Papavero . Cat. p. 431.
Partenio . v. Matricaria .
Peonia . Cat. p. 429.
Periclimeno . Cat. p. 432.
Perpetuella . v. Ptarmica .
Persico del fior doppio . Cat. p.
446.

Pesci , come generino? T. 1.
C. 4. p. 32.
Pestello , Tuba , o Stilo del
fiore . T. 1. C. 6. p. 62. C. 10.
p. 89. C. 12. p. 106. C. 13. C.
14.

Piantare . T. 2. C. 28. p. 314.
C. 29. p. 326.

Piante producon tutte il seme .
T. 1. C. 1. p. 7. Son di arc
generi . C. 2. p. 12. C. 5. p. 54.
C. 6. p. 56. C. 18. p. 158. Lor

generazione . C. 37. p. 333.
C. 40. p. 376. C. 44. p. 417.
Simili agli animali . T. 1. C.
5. p. 52. T. 2. C. 3. p. 22. Di-
verse maniere da propagarle .
T. 2. C. 26. p. 288. Lor go-
verno . C. 31. p. 347. Lor
difesa dagli agenti nocivi . C.
32. p. 368. Piante chimiche .
C. 40. p. 385.

Pietre figurate dalla Natura .
T. 1. C. 40. p. 383.

Pioggia . T. 1. C. 19. p. 172. C.
23. p. 207. T. 2. C. 3. p. 19.

Pioppo . T. 1. C. 30. p. 277.

Pistacchi . T. 1. C. 22. p. 195.
C. 23. p. 213. T. 2. C. 17. p.
168. T. 1. C. 30. p. 273. C.
36. p. 329.

Polpi , come si generino . T. 1.
C. 4. p. 32. Tagliati in pezzi,
si redintegrano . p. 33. C. 43.
p. 415.

Polveri seminali de' fiori . T. 1.
C. 7. p. 64. C. 8. p. 73. C. 9. p.
79. C. 10. p. 95. C. 11. 12.
13. & C. T. 2. C. 10. p. 91. C.
11. p. 104. C. 13. p. 111. C.
13. p. 119. C. 14.

Populagine . v. Calta .

Primavera . Cat. p. 434.

Propaggini, come faccianfi . T.
2. C. 26. p. 294.

Ptarmica . Cat. p. 435. Austria-
ca . v. Scranthem .

Pulsatilla . Cat. p. 136. Austria-
ca p. 65.

Qua-

Quamoclio. Cat. p. 63.
R.

Radiche come conservare.
le. T. 2. c. 27. p. 308.
s'innestano. c. 26. p. 390.

Rami, come hanno a piantarsi.
T. 2. c. 26. p. 290.

Ranuncolo. T. 1. c. 44. p. 431.
p. 137.

Rapontio. Cat. p. 144.

Ricettacolo de' semi. T. 1. c.
6. p. 62.

Rosa. Cat. p. 145. Cinese. p. 387.
148. Polonica. T. 1. c. 4. p.

Rosalauro. v. Oleandro.
S.

Sassifica. Cat. p. 156.
Sbramamento della pianta
per moltiplicarla. T. 2. c. 26.
p. 292.

Scabiosa. Cat. p. 150.

Scolimocefalo. Cat. 151.

Sali, mirabilmente figurati. T.
1. c. 40. p. 379.

Salice. T. 1. c. 30. p. 277.

Sambuco rosso. Cat. p. 149.

Sanicola. Cat. p. 24.

Satirione. v. Orchide.

Sciarappa. Cat. p. 117.

Scolopendra. T. 1. c. 47. p. 141.

Scornabecco. v. Terebinto, e
Ristacchio.

Scorzonera. Cat. p. 152.

Seme, secreto per averne fiori
doppi. T. 2. c. 106. p. 97. c.
13. p. 128. e c. 14. 15. Pro-

ducefi da tutte le specie di
piante. T. 1. c. 1. p. 7. c. 6.
p. 56. Se non si compisce il

seme, non si matura il frut-

to. c. 20. p. 179. c. 24. p.

222. Sua formazione. c. 37.

p. 344. T. 2. c. 9. p. 79. Co-

me degenera. ivi p. 83. c. 11.

p. 99. Come farne sortire nuo-

vi mostri di fiori, e frutta. c.

20. p. 203. Come rendersi più

secondo. T. 2. c. 28. p. 322.

Semenzajo, o seminare. T. 2.
c. 16. p. 154. c. 23. p. 242.
e c. 24. e 25.

Semprevivo. Cat. p. 153.

Serantemo. Cat. p. 165.

Serpentaria. Cat. p. 153.

Sesamoides. ivi.

Sessi delle piante. T. 1. c. 2. p.

12. E degli animali. c. 4. p. 30.

Sicomoro. T. 1. c. 34. p. 310.

Siringa. Cat. p. 155.

Sisyrinchio. Cat. 154.

Smilace. T. 1. c. 17. p. 147.

c. 28. p. 253.

Sole seconda la terra colle sue

particole ignee. T. 2. c. 6.

p. 59.

Spalliere del giardino. T. 2. c.

8. p. 37.

Sparto. v. Ginestra.

Sperimenti sulla virulenza

delle polveri de' fiori. T. 1.

c. 19. p. 164. c. 20. p. 180.

T. 2. c. 12. p. 103. c. 13. p.

121. &c.

Specie

Spërma femminile. *T. 1. c. 18.*

p. 156.

Spron di Cavaliere. *Cat. p. 62.*

Stabbio. *v. Letame.*

Stami, o Filaciche del fiore.

T. 1. c. 6. p. 63. c. 44. p. 428.

Stramonia. *Cat. p. 155.*

T.

T Agete. *Cat. p. 156.*

Tamarindo. *Cat. p. 157.*

Terebinto. *T. 1. c. 22. p. 198.*

c. 80. p. 273.

Terra qual convenga a' fiori. *T.*

2. c. 4. p. 27. c. 28. p. 317.

Contrasegni, per conoscer,

qual sia fertile. *ivi p. 31. Co-*

me rendasi feconda. *ivi, c.*

c. 28. p. 324.

Terremoto, e sua cagione. *T.*

2. c. 6. p. 54.

Tettacci marini del Diluvio.

T. 2. c. 6. p. 54.

Testicoli di Cane. *v. Orichide.*

Tlespia, Taspidio. *v. Mille-*

fiori.

Trachelio. *Cat. p. 144.*

Tralignamento, e sua cagione.

T. 2. c. 11. p. 99. c. 17. p. 173.

Trapiantare. *T. 2. c. 30. p. 339.*

Trisoglio. *Cat. p. 159. Aureo.*

v. Epatica.

Trementina de' Pistacchi, e

Terebinti, e suo uso. *T. 1. c.*

23. p. 294.

Tronba, o Tubo del fiore. *v.*

Pestello.

Tulipano. *Cat. p. 159. Tulpi-*

1612. p. 161.

V

Vasi per piantar fiori. *T.*

2. c. 29. p. 329.

Vegetazione, e nutrizione del-

le piante. *T. 1. c. 40. p. 378.*

c. 41. p. 391.

Vento altro nocivo, altro

utile alle piante, e fiori. *T.*

2. c. 29. p. 172. c. 28. p. 252.

T. 2. c. 2. p. 14. c. 32. p. 361.

Veratro bianco. *v. Elleboro.*

Varga d'oro. *Cat. p. 165.*

Vermi. *v. Insetti. Spermatici.*

T. 1. c. 37. p. 342. c. 58. 39.

c. 43. p. 423.

Vilucchio. *v. Convolvolo.*

Vincibosco. *Cat. p. 132.*

Viola arborea, o a ciocca. *T.*

2. c. 15. p. 145. 154. c. 16.

p. 156. Cat. p. 101. Martia,

o mammola. *Cat. p. 163. Ma-*

tronale. *v. Esperide. Pira-*

midale. *ivi. Martia di tre-*

colori. *v. Giacèa.*

Umbilico di Venera. *v. Con-*

ledone.

Vulcani fecondano le vicin-

contrade. *T. 2. c. 6. p. 55.*

Z

Zafferano salvatico. *Cat. p.*

32. Domestico p. 65.

Zappare la terra peachè giovi.

T. 2. c. 28. p. 314. Come, e quan-

do debba farsi. *c. 31. p. 359.*

Zoofiti, o sia Piantanimali. *T.*

1. c. 5. p. 43.

Zucche. *T. 2. c. 17. p. 170.*





